


5^{HIV} BANGKOK 2010

การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ **การติดเชื้อเอชไอวี**

ใน **5** กลุ่มประชากรเป้าหมาย พื้นที่ **กรุงเทพมหานคร** ปี 2553



AIDS
AIHD
Mahidol University



โดย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร



การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ
เอชไอวีใน 5 กลุ่มประชากรเป้าหมาย
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2553

The Behavioral Surveillance Survey of 5 Target Groups in Bangkok, 2010

ผู้เขียน

แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร

ดร. บังอร เทพเทียน

นางสาวปรินดา ตาสี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศ์วาส

Authors

Dr. Supattra Srivanichakorn

Dr. Bang-on Thepthien

Ms. Parinda Tasee

Asst. Prof. Somsak Wongsawass

ข้อมูลบรรณานุกรม:

สุพัตรา ศรีวณิชชากร

การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ใน 5 กลุ่มประชากร
เป้าหมายปี 2553 = The Behavioral Surveillance Survey of 5 Target Groups
in Bangkok, 2010 / สุพัตรา ศรีวณิชชากร, บังอร เทพเทียน, ปรินดา ตาสี, สมศักดิ์
วงศ์วาส. นครปฐม : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.

230 หน้า

1. โรคเอดส์ - - ไทย - - กรุงเทพฯ - - วิจัย 2. โรคเอดส์ - - ปัจจัยเสี่ยง. 3. พฤติกรรม
ทางเพศ 4. การเฝ้าระวังโรค I. บังอร เทพเทียน II. ปรินดา ตาสี III. มหาวิทยาลัยมหิดล.
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน IV. The Behavioral Surveillance Survey of 5 Target
Groups in Bangkok, 2010

WC503.6 ส831ก 2553

ลิขสิทธิ์

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

จัดพิมพ์โดย

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0 2441 9870, 0 2441 9040 ต่อ 45, 54

โทรสาร 0 24419044

www.aihd.mahidol.ac.th

ออกแบบปก

นายชาติรี น้อยต้นวงษ์

จัดรูปเล่ม

นางสาวปรินดา ตาสี

นางสุภัทรา อินทร์ไพบูลย์




การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ
เอชไอวีใน 5 กลุ่มประชากรเป้าหมาย
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2553

The Behavioral Surveillance Survey of 5 Target Groups in Bangkok, 2010

ผู้อำนวยการโครงการ	แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร แพทย์หญิงปิยธิดา สมุทรประภูต
หัวหน้าโครงการ	ดร. บังอร เทพเทียน
นักวิจัยหลัก	นางสาวปรีนดา ตาสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาवास นางสุภัทรา อินทร์ไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม	นางพิชญ์สินี เพ็ชรอนุกุลบุตร นายสมชาย วิริภิมย์กุล นางสาวดุขณี คำมี นางสาวปราณี สุทธิสุคนธ์ นายเกรียงศักดิ์ ชื้อเลื่อม นางสาวกมลวรรณ รักแผน นางสาวศรีไพร ปิ่นบัวทอง นางสาวระวีวรรณ วีระพลชัย นางสาวมนฤดี วงศ์แก้ว นางชนิกานต์ เงินมาก นายจเร ช่มอารมณ์ นายกิตติพงษ์ อรรถพรชัยกุล
ผู้ประสานงานโครงการ	นางพรรณี ชัยโพธิ์ศรี นางสาวอรวิ พึ่งดำรง

คำนำ




การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในครั้งนี้ เป็นรอบที่ 9 ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังในประชากร 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กลุ่มประชากรทั่วไป และกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของประชากรที่เฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรมการใช้สารเสพติด การเฝ้าระวังนี้จึงมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกต ที่จะเป็นประโยชน์ต่อรายงานฉบับนี้ คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับ เพื่อนำมาปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

เมษายน 2554

กิตติกรรมประกาศ



กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆ โรงเรียนที่เป็นพื้นที่ศึกษาที่กรุณาให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มนักเรียนเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่ง

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนที่อำนวยความสะดวก ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลของกลุ่มประชากรทั่วไป และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่การศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลและความร่วมมือเป็นอย่างดี


ขอขอบคุณคุณเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จากสำนักงานเขตต่างๆ ที่อำนวยความสะดวก ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานในสถานประกอบการที่เป็นพื้นที่การศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ และความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บข้อมูลของกลุ่มนี้

และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมให้โครงการนี้ดำเนินการจนได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการวางแผนดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

คณะผู้วิจัย

เมษายน 2554

สารบัญ



คำนำ

กิตติกรรมประกาศ

บทสรุปผู้บริหาร ก

Executive summary A

บทที่ 1 บทนำ 1

บทที่ 2 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 11

บทที่ 3 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 33

บทที่ 4 ประชากรทั่วไป 67


บทที่ 5 พนักงานในสถานประกอบการ 91

บทที่ 6 บทสรุปผลการสำรวจ 115

บทที่ 7 แนวโน้มพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี 135

บรรณานุกรม 195

สารบัญตาราง



บทที่ 1

ตาราง 1.1	จำนวนตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล	4
ตาราง 1.2	ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล	5

บทที่ 2

ตาราง 2.1	อายุและระยะเวลา (ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	13
ตาราง 2.2	ลักษณะของการพักอาศัยและระดับการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	14
ตาราง 2.3	ร้อยละของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง	15
ตาราง 2.4	ร้อยละของจำนวนข้อที่ตอบได้ถูกต้อง	16
ตาราง 2.5	ความถี่ของการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	18
ตาราง 2.6	เวลาที่ใช้ Internet ในแต่ละวันของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	18
ตาราง 2.7	สถานที่ใช้ Internet เป็นประจำในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	19
ตาราง 2.8	การมีคูรั้งหรือแฟนทาง Internet ของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	19
ตาราง 2.9	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และคู่นอนครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	20
ตาราง 2.10	อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	21
ตาราง 2.11	จำนวนคู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ของกลุ่มนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	22
ตาราง 2.12	การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ	23
ตาราง 2.13	เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	24
ตาราง 2.14	เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ	25
ตาราง 2.15	การมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมา	25
ตาราง 2.16	การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ จำแนกตามเพศ	26
ตาราง 2.17	การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	27

บทที่ 2

ตาราง 2.18	ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	28
ตาราง 2.19	ความถี่ของการสูบบุหรี่ของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	29
ตาราง 2.20	การเสพยาเสพติดประเภทผิดกฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา	29
ตาราง 2.21	การสูบบุหรี่และการใช้สารเสพติด	30
ตาราง 2.22	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับการใช้สารเสพติด	30
ตาราง 2.23	เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และหลังการเสพยาเสพติด และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ	31
ตาราง 2.24	วิธีการเสพยาเสพติด จำแนกตามเพศ	32

บทที่ 3

ตาราง 3.1	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษา	39
ตาราง 3.2	อายุเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	39
ตาราง 3.3	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	40
ตาราง 3.4	ลักษณะการพักอาศัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	41
ตาราง 3.5	ระดับการศึกษาของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	42
ตาราง 3.6	การมีคูรักรหรือแฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	42
ตาราง 3.7	การใช้เวลาว่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	43
ตาราง 3.8	ร้อยละการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	45
ตาราง 3.9	การตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด UNGASS ได้ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	46
ตาราง 3.10	พฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	47
ตาราง 3.11	เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	49

บทที่ 3

ตาราง 3.12	ประเภทคู่นอน และการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	53
ตาราง 3.13	การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆ ของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	54
ตาราง 3.14	จำนวนคู่นอน (คน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	55
ตาราง 3.15	เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย และการใช้ถุงยางอนามัยของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	56
ตาราง 3.16	สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	59
ตาราง 3.17	การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	60
ตาราง 3.18	การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	61
ตาราง 3.19	การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	62
ตาราง 3.20	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	63
ตาราง 3.21	พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และความถี่ในการใช้สารเสพติดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	64
ตาราง 3.22	การมีเพศสัมพันธ์หลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ หลังเสพยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	66

บทที่ 4

ตาราง 4.1	พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	68
ตาราง 4.2	อายุของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ	69
ตาราง 4.3	ภูมิลำเนาของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ	69
ตาราง 4.4	ระยะเวลา (ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มประชากรทั่วไป	70
ตาราง 4.5	การศึกษาของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ	70
ตาราง 4.6	สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ	71
ตาราง 4.7	อาชีพของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ	71

บทที่ 4

ตาราง 4.8	รายได้ต่อเดือนของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ	72
ตาราง 4.9	ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ ได้ถูกต้อง	73
ตาราง 4.10	ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ ได้ถูกต้อง จำแนกตามกลุ่มอายุ	73
ตาราง 4.11	ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ	75
ตาราง 4.12	อายุของการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ	76
ตาราง 4.13	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก	77
ตาราง 4.14	สัดส่วนของคนในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา	78
ตาราง 4.15	ประเภทของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	79
ตาราง 4.16	จำนวนของประเภทคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	79
ตาราง 4.17	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ	80
ตาราง 4.18	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ	80
ตาราง 4.19	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด จำแนกตามเพศ	81
ตาราง 4.20	การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนในภาพรวม จำแนกตามเพศ	82
ตาราง 4.21	การมีอาการผิดปกติ และการปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่า จะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ	83
ตาราง 4.22	การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี จำแนกตามเพศ	84
ตาราง 4.23	พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการเสพยาเสพติด จำแนกตามเพศ	85
ตาราง 4.24	ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้ยาเสพติด จำแนกตามเพศ	85
ตาราง 4.25	ลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเสพยาเสพติด จำแนกตามเพศ	86
ตาราง 4.26	พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเสพยาเสพติด	86
ตาราง 4.27	การมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ	87
ตาราง 4.28	การมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ	88
ตาราง 4.29	การเสพยาเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำของกลุ่มประชากรทั่วไป	89

บทที่ 5

ตาราง 5.1	พื้นที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูล	91
ตาราง 5.2	ลักษณะประชากรของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ	93
ตาราง 5.3	ภูมิสำเนาของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ	94
ตาราง 5.4	ระยะเวลา (ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครของกลุ่มพนักงาน ในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ	94
ตาราง 5.5	ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ	95
ตาราง 5.6	สถานภาพสมรสของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ	96
ตาราง 5.7	ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคู่ครองในกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ	96
ตาราง 5.8	ตำแหน่งของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ	97
ตาราง 5.9	ร้อยละของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง จำแนกตามเพศ	98
ตาราง 5.10	ร้อยละของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ จำแนกตามอายุและประสบการณ์ทางเพศ	99
ตาราง 5.11	ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามเพศ	99
ตาราง 5.12	ประเภทของคู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามเพศ	100
ตาราง 5.13	อายุของการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ	101
ตาราง 5.14	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	102
ตาราง 5.15	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามอายุ	102
ตาราง 5.16	จำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ	104
ตาราง 5.17	ประเภทของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	104
ตาราง 5.18	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ	105
ตาราง 5.19	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ	106
ตาราง 5.20	การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย กับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ	107
ตาราง 5.21	เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ	108
ตาราง 5.22	การมีอาการผิดปกติ และการปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็น โรคทางเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ	109
ตาราง 5.23	การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	110
ตาราง 5.24	พฤติกรรมการใช้เข็มฉีดยาที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติด จำแนกตามเพศ	111

บทที่ 5

ตาราง 5.25	ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำแนกตามเพศ	111
ตาราง 5.26	การใช้ถุงยางอนามัยกับการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพติด จำแนกตามเพศ	112
ตาราง 5.27	พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพติด	113

บทที่ 6

ตาราง 6.1	จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ในปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553	115
ตาราง 6.2	จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังในปี พ.ศ. 2553 จำแนกตามเพศ	116
ตาราง 6.3	อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2553	116
ตาราง 6.4	ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง ในภาพรวม จำแนกตามเพศ	117
ตาราง 6.5	ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง	118
ตาราง 6.6	อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในภาพรวม	122
ตาราง 6.7	การมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ	123
ตาราง 6.8	ประเภทของคู่นอนสำหรับเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	125
ตาราง 6.9	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	126
ตาราง 6.10	ประเภทของคู่นอนสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย จำแนกตามเพศ	127
ตาราง 6.11	วิธีการเสพสารเสพติด ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา	133
ตาราง 6.12	การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และหลังเสพสารเสพติด	134

บทที่ 7

ตาราง 7.1.1	แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง	137
ตาราง 7.1.2	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบ 4 ปี	139
ตาราง 7.1.3	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่นอนประเภทต่างๆ	140
ตาราง 7.1.4	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ	140
ตาราง 7.1.5	แนวโน้มเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบ 4 ปี	141
ตาราง 7.2.1	แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง	148
ตาราง 7.2.2	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ในรอบ 6 ปี	150
ตาราง 7.3.1	แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง	160
ตาราง 7.3.2	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก กับบุคคลประเภทต่างๆ	163
ตาราง 7.4.1	อายุของกลุ่มประชากรทั่วไป ในรอบ 3 ปี	172

บทที่ 7

ตาราง 7.4.2	ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ ได้ถูกต้อง	173
ตาราง 7.4.3	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	174
ตาราง 7.4.4	แนวโน้มอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	175
ตาราง 7.4.5	แนวโน้มเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับบุคคลประเภทต่างๆ	176
ตาราง 7.4.6	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อเพศสัมพันธ์ กับบุคคลประเภทต่างๆ	177
ตาราง 7.4.7	แนวโน้มเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย กับคู่นอนประเภทต่างๆ	177
ตาราง 7.5.1	อายุเฉลี่ยของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่สำรวจในแต่ละปี	183
ตาราง 7.5.2	ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่อง โรคเอดส์ได้ถูกต้อง	184
ตาราง 7.5.3	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก กับบุคคลประเภทต่างๆ	185
ตาราง 7.5.4	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่เพศสัมพันธ์ ประเภทต่างๆ	187
ตาราง 7.5.5	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง กับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา	188
ตาราง 7.5.6	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย กับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ	188
ตาราง 7.5.7	แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพติด	194

สารบัญแผนภาพ



บทที่ 1

แผนภาพ 1.1	แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลก	6
แผนภาพ 1.2	สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในประเทศ จำแนกตามเพศ ในปี พ.ศ. 2547 – มีนาคม พ.ศ. 2554	7
แผนภาพ 1.3	สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในประเทศ จำแนกตามอายุ ในปี พ.ศ. 2547 – มีนาคม พ.ศ. 2554	7
แผนภาพ 1.4	ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ในประเทศ จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2554	8
แผนภาพ 1.5	สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จำแนกตามเพศ ในปี พ.ศ. 2527 – ธันวาคม พ.ศ. 2553	8
แผนภาพ 1.6	สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จำแนกตามอายุ ในปี พ.ศ. 2527 – ธันวาคม พ.ศ. 2552	9
แผนภาพ 1.7	ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 – มีนาคม พ.ศ. 2554	9

บทที่ 2

แผนภาพ 2.1	การมีคูรักหรือแฟนของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	14
แผนภาพ 2.2	พฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา	17

บทที่ 3

แผนภาพ 3.1	อายุของนักเรียนเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	50
------------	---	----

บทที่ 6

แผนภาพ 6.1	ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ ในภาพรวม	119
แผนภาพ 6.2	ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ จำแนกตามเพศ	120
แผนภาพ 6.3	ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในภาพรวม	120
แผนภาพ 6.4	ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ	121
แผนภาพ 6.5	การมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี จำแนกตามเพศ	122
แผนภาพ 6.6	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ	124
แผนภาพ 6.7	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย จำแนกตามเพศ	127
แผนภาพ 6.8	สัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน จำแนกตามเพศ	128
แผนภาพ 6.9	สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง จำแนกตามเพศ	129
แผนภาพ 6.10	อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ	130
แผนภาพ 6.11	การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	130
แผนภาพ 6.12	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	131
แผนภาพ 6.13	พฤติกรรมการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	132

บทที่ 7

แผนภาพ 7.1.1	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ Internet และการใช้ Internet เพื่อหา คูรักรหรือแฟน ในรอบปีที่ผ่านมา	136
แผนภาพ 7.1.2	แนวโน้มของการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ ตามเกณฑ์ของ UNGASS ในรอบ 4 ปี	137
แผนภาพ 7.1.3	แนวโน้มประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 4 ปี	138
แผนภาพ 7.1.4	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก โดยความสมัครใจ ในรอบ 4 ปี	138
แผนภาพ 7.1.5	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ในรอบ 4 ปี	139
แผนภาพ 7.1.6	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	141
แผนภาพ 7.1.7	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน	142
แผนภาพ 7.1.8	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับ สิ่งของ หรือเงินตอบแทน	142
แผนภาพ 7.1.9	แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในรอบ 4 ปี	143
แผนภาพ 7.1.10	แนวโน้มของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ในรอบ 4 ปี	143

บทที่ 7

แผนภาพ 7.1.11	แนวโน้มการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา	144
แผนภาพ 7.1.12	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์	144
แผนภาพ 7.1.13	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์	145
แผนภาพ 7.1.14	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมาย ในรอบ 4 ปี	145
แผนภาพ 7.1.15	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา ในรอบ 4 ปี	146
แผนภาพ 7.1.16	แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ในรอบ 7 ปี	146
แผนภาพ 7.1.17	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ในรอบ 4 ปี	146
แผนภาพ 7.2.1	แนวโน้มของความรู้ที่ถูกต้องตามตัวชี้วัดของ UNGASS	147
แผนภาพ 7.2.2	แนวโน้มของความรู้ที่ถูกต้องตามตัวชี้วัดของ UNGASS (ตอบถูกทั้ง 5 ข้อ)	149
แผนภาพ 7.2.3	แนวโน้มของการมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	150
แผนภาพ 7.2.4	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ในรอบ 7 ปี	151
แผนภาพ 7.2.5	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ กับคู่อุปถัมภ์หรือแฟน	151
แผนภาพ 7.2.6	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับ บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	152
แผนภาพ 7.2.7	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับ บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	152
แผนภาพ 7.2.8	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับ บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	153
แผนภาพ 7.2.9	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับ ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	153
แผนภาพ 7.2.10	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	154
แผนภาพ 7.2.11	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	154
แผนภาพ 7.2.12	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	155
แผนภาพ 7.2.13	แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	155
แผนภาพ 7.2.14	แนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา	156
แผนภาพ 7.2.15	แนวโน้มพฤติกรรมการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์	156
แผนภาพ 7.2.16	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในรอบปีที่ผ่านมา	157
แผนภาพ 7.2.17	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์	157


บทที่ 7

แผนภาพ 7.2.18	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	158
แผนภาพ 7.2.19	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	158
แผนภาพ 7.2.20	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	159
แผนภาพ 7.3.1	แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อตามตัวชี้วัด UNGASS	160
แผนภาพ 7.3.2	แนวโน้มของประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 7 ปี	161
แผนภาพ 7.3.3	เพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟน	162
แผนภาพ 7.3.4	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	163
แผนภาพ 7.3.5	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟน	164
แผนภาพ 7.3.6	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	164
แผนภาพ 7.3.7	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	165
แผนภาพ 7.3.8	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกัน	165
แผนภาพ 7.3.9	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการทางเพศ	166
แผนภาพ 7.3.10	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	166
แผนภาพ 7.3.11	แนวโน้มของเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	167
แผนภาพ 7.3.12	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	167
แผนภาพ 7.3.13	แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	168
แผนภาพ 7.3.14	แนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบ 6 ปี	168
แผนภาพ 7.3.15	แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	169
แผนภาพ 7.3.16	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติด	169
แผนภาพ 7.3.17	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	170
แผนภาพ 7.3.18	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	170
แผนภาพ 7.3.19	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	171

บทที่ 7

แผนภาพ 7.3.20	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ หลังเสพยาเสพติด	171
แผนภาพ 7.4.1	ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่อง โรคเอดส์ได้ถูกต้อง	173
แผนภาพ 7.4.2	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	175
แผนภาพ 7.4.3	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	178
แผนภาพ 7.4.4	แนวโน้มของเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	178
แผนภาพ 7.4.5	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	179
แผนภาพ 7.4.6	แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	179
แผนภาพ 7.4.7	แนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา	180
แผนภาพ 7.4.8	แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	180
แผนภาพ 7.4.9	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติด	181
แผนภาพ 7.4.10	แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	181
แผนภาพ 7.4.11	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	182
แผนภาพ 7.4.12	แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	182
แผนภาพ 7.4.13	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์หลัง เสพยาเสพติด	185
แผนภาพ 7.5.1	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก	186
แผนภาพ 7.5.2	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	189
แผนภาพ 7.5.3	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน ในรอบปีที่ผ่านมา	190
แผนภาพ 7.5.4	แนวโน้มอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมา	190
แผนภาพ 7.5.5	แนวโน้มการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา	191
แผนภาพ 7.5.6	แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรอบ 5 ปี	192
แผนภาพ 7.5.7	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในรอบ 4 ปี	192

บทสรุปผู้บริหาร



การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการมาเป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2553 เป็นการสำรวจครั้งที่ 9) กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 39,996 ราย 11 กลุ่มเป้าหมาย

สรุปผลสำรวจในรอบที่ 9

การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในปี พ.ศ. 2553 มี 5 กลุ่มเป้าหมาย จำนวนตัวอย่าง 5,138 ราย เพศหญิงมีจำนวนมากกว่าเพศชายเล็กน้อย และอายุของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มนักเรียน กับกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ พบว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัย เป็นความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสามารถตอบได้ถูกต้องในสัดส่วนที่มากกว่าความรู้ในเรื่องอื่นๆ อย่างชัดเจน รองลงมาคือ ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยการมีคู่นอนที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี (มีคู่นอนคนเดียว) และคนที่ดูว่ามีสุขภาพแข็งแรงอาจมีเชื้อเอชไอวี สำหรับความรู้เกี่ยวกับยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวี กับการติดเชื้อโดยการรับประทานอาหารร่วมกัน ยังมีความรู้ที่

ถูกต้องน้อยโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน สำหรับการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อตามเกณฑ์ของ UNGASS พบว่า กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 ตอบได้ถูกทุกข้อในสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจนรองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป ตามลำดับ โดยภาพรวมสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง อยู่ระหว่างร้อยละ 9-38

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี มีสัดส่วนระหว่างร้อยละ 1-20 เพศชายจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี มากกว่ากลุ่มเพศหญิง อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจะอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี ในทุกกลุ่มเป้าหมาย คู่เพศสัมพันธ์ในครั้งแรกพบว่า

เพศชายมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกกับคูรักรหรือแฟน ในสัดส่วนที่น้อยกว่าเพศหญิงค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตามประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเพศชาย ยังเป็นคูรักรหรือแฟนมากกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขายบริการทางเพศมีสัดส่วนน้อยมาก การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่าเพศหญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยอยู่ระหว่างร้อยละ 36-65 เพศชายอยู่ระหว่างร้อยละ 45-55 กลุ่มนักเรียนมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป

■ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักรหรือแฟน ส่วนคู่นอนคนอื่นๆ มีสัดส่วนที่น้อยมาก รวมทั้งเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับผู้หญิงขายบริการทางเพศมีสัดส่วนที่น้อยมาก กลุ่มนักเรียนมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดมากกว่ากลุ่มพนักงาน/ประชากรทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเจน กลุ่มเพศชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดมากกว่ากลุ่มเพศหญิง

■ อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบในกลุ่มเพศหญิง ร้อยละ 1-7 และในกลุ่ม

เพศชายร้อยละ 1-8 เป็นกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ กับกลุ่มประชากรทั่วไปมากกว่ากลุ่มนักเรียน

■ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่าเพศชายมีสัดส่วนมากกว่าเพศหญิงอย่างชัดเจน กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 และกลุ่มประชากรทั่วไป มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มากกว่ากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และหลังเสพสารเสพติดมีสัดส่วนไม่มากนัก และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งก็มีสัดส่วนไม่สูงมากนักเช่นกัน

■ มีพฤติกรรมการเสพสารเสพติด ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 1-19 กลุ่มเพศชายมีการเสพสารเสพติดมากกว่ากลุ่มเพศหญิง และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 เป็นกลุ่มที่มีการเสพสารเสพติดมากที่สุด การเสพสารเสพติดโดยการฉีดสารเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำมีจำนวนที่น้อยมาก



แนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี

กลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2

- ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย
- ประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียนหญิง ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายลดลงเล็กน้อย คู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรกส่วนใหญ่ยังเป็นคู่รักหรือแฟน แต่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย และเห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศน้อยมาก การใช้ถุงยางอนามัยมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนชาย ส่วนในกลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มลดลง
- เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คู่รัก หรือแฟนมากขึ้น การใช้ถุงยางอนามัยนักเรียนหญิงมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มลดลง การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนที่เป็นคู่รักหรือแฟนน้อยกว่าในคู่นอนประเภทอื่นๆ
- การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดลดลง
- มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาลดลง

- นักเรียนที่มีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลงเล็กน้อย
- นักเรียนชายมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศมากกว่านักเรียนหญิง
- พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิง เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีแนวโน้มลดลงในกลุ่มนักเรียนหญิง ส่วนกลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิง
- พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนนักเรียนหญิงมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย นักเรียนชายมีการเสพยาเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมายมากกว่านักเรียนหญิง ประมาณ 1 เท่าตัว การเสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยาเข้าเส้นโลหิต มีประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น นักเรียนชายมีการเสพยาเสพติดชนิดฉีดมากกว่านักเรียนหญิง เพศสัมพันธ์หลังจากเสพยาเสพติดมีแนวโน้มลดลง นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่านักเรียนชาย

กลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5

- ◆ ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS อยู่ระหว่างร้อยละ 9-20
- ◆ นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่มากกว่านักเรียนชายค่อนข้างชัดเจน การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก มีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนหญิง แต่ลดลงในกลุ่มนักเรียนชาย
- ◆ เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่อีกหรือแฟนมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง สูงขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนชาย ในกลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนกับคู่นอนประเภทอื่นๆ มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่สม่ำเสมอ
- ◆ การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย มีแนวโน้มสูงขึ้น

ในกลุ่มนักเรียนชาย ส่วนนักเรียนหญิงมีแนวโน้มลดลง

- ◆ เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน มีแนวโน้มลดลง การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมีแนวโน้มไม่ชัดเจน
- ◆ อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- ◆ การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มสูงขึ้นนักเรียนชาย มีสัดส่วนการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 7 ปี พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือน มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิง การมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มลดลง

กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

- ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS มีแนวโน้มลดลง
- ประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนหญิงและลดลงเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนชาย มีแนวโน้มการมีประสบการณ์ทางเพศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนหญิงจะ

มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากกว่านักเรียนชาย

- การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนหญิงและลดลงเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนชาย
- การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาสูงขึ้น



■ การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งล่าสุดลดลงเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนชาย ส่วนนักเรียนหญิงมีแนวโน้มสูงขึ้น นักเรียนชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 7 ปี

■ เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียนชาย ส่วนในกลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มลดลง

■ อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย

■ การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ลดลง

■ นักเรียนชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 7 ปี

■ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มีแนวโน้มสูงขึ้น นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิงในรอบ 5 ปี การมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีแนวโน้มลดลง แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้น

■ การใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย นักเรียนชายมีการใช้สารเสพติดมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 6 ปี การมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด มีแนวโน้มลดลงในกลุ่มนักเรียนหญิง ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย

กลุ่มประชากรทั่วไป

+ ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS มีแนวโน้มลดลงในทุกข้อ รวมทั้งแนวโน้มที่ตอบความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องทั้ง 5 ข้อก็ลดลงเช่นกัน

+ เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี มีแนวโน้มลดลง กลุ่มเพศหญิง มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี น้อยกว่ากลุ่มเพศชาย เพศหญิงมีอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรกมากกว่ากลุ่มเพศชาย การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก มีแนวโน้มสูงขึ้น กลุ่มเพศชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่ากลุ่มเพศหญิงเล็กน้อย

+ เพศหญิงมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคูรักรหรือแฟนลดลงเล็กน้อย แต่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ สูงขึ้น เพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศ มีแนวโน้มลดลง การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูนอนที่เป็นคูรักรหรือแฟน มีสัดส่วนน้อยกว่าคูนอนประเภทอื่นๆ

เพศชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่ากลุ่มเพศหญิง

+ เพศชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักรหรือแฟนสูงขึ้นกับคู่นอนประเภทอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง ส่วนเพศหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักรหรือแฟนมากกว่ากลุ่มเพศชายค่อนข้างชัดเจน การใช้ถุงยางอนามัยมีแนวโน้มลดลงในกลุ่มเพศชาย แต่สูงขึ้นในกลุ่มเพศหญิง กลุ่มเพศชายมีการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่ากลุ่มเพศหญิงประมาณ 1 เท่า

+ เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กลุ่มเพศชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนมากกว่ากลุ่มเพศหญิง

+ อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแนวโน้มสูงขึ้น

+ การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพศหญิงมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มเพศชาย

+ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลง กลุ่มเพศชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มเพศหญิงประมาณ 1 เท่าตัว เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีแนวโน้มสูงขึ้น กลุ่มเพศชายมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มเพศหญิงอย่างชัดเจน รวมทั้งกลุ่มเพศชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงกว่ากลุ่มเพศหญิงในรอบ 3 ปี

+ การใช้สารเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมาย มีแนวโน้มลดลง กลุ่มเพศหญิงมีการเสพยาเสพติดน้อยกว่ากลุ่มเพศชายค่อนข้างชัดเจนในรอบ 3 ปี เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย



กลุ่มพนักงาน ในสถานประกอบการ

■ ความรู้เรื่องโรคเอดส์ มีแนวโน้มตอบได้ถูกทุกข้อสูงขึ้นเล็กน้อย

■ พนักงานชายมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่เป็นคูรักรหรือแฟนน้อยกว่ากลุ่มพนักงานหญิง และมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทอื่นๆ มากกว่าพนักงานหญิงในทุกปี เพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศมีสัดส่วนที่น้อยมาก มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักร/แฟนน้อยกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ

■ การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด มีแนวโน้มสูงขึ้น พนักงานชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่ากลุ่มพนักงานหญิงค่อนข้างชัดเจนในรอบ 5 ปี

■ เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนสูงขึ้นในกลุ่มพนักงานชายแต่ลดลงเล็กน้อยในกลุ่มพนักงานหญิง กลุ่มพนักงานชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่าในกลุ่มพนักงานหญิง

■ อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแนวโน้มสูงขึ้น


กลุ่มพนักงานหญิงมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มพนักงานชายในรอบ 5 ปี

■ การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

■ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลง กลุ่มพนักงานชายดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มพนักงานหญิง เพศสัมพันธ์หลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มที่สูงขึ้น การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย

■ เพศหญิงมีการเสพยาเสพติดน้อยกว่าเพศชายค่อนข้างชัดเจน เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดและการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด มีแนวโน้มไม่ชัดเจน เพราะจำนวนผู้ใช้สารเสพติดมีจำนวนไม่มากนัก

Executive summary



The ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University and AIDS Division, Department of Health, Bangkok Metropolitan have been conducting a behavioural surveillance survey since 2002 which it aims to use as baseline surveillance data for different risk groups. Hence, this ninth survey has totalled 39,996 samples across 11 different risk groups.

Overall Findings

Sexual risk behaviour surveillance in 2010 was conducted in 5 target groups with a total of 5,138 participants. In general, the proportion of females was slightly higher than males. Age average of students was slightly younger than other groups.

■ Knowledge of HIV transmission and prevention

Knowledge on HIV prevention was assessed using 7 questions. Condom use can prevent HIV transmission was answered most correctly by all respondents in this survey.

Among student groups, percent ages of those students incorrectly answered some questions such as mosquitoes can transmit the HIV infection, or having meals with HIV infected persons can transmit the disease.

Using UNGASS criteria (only 5 questions), the ninth grade student groups found to be have worse knowledge of HIV transmission and prevention.

■ Early sexual initiation (before age of 15)

Proportions of early sexual initiation ranged from 1-20%. Males were more likely to have early sex initiation than female counterparts in all groups. Average age of having first sexual intercourse was quite similar in all

various groups, which were usually reported as younger than 20 years of age.

■ Type of sexual partner for their first sexual intercourse

Having sex with boyfriend was most mentioned in the survey, particularly among female respondents. The figure generally showed that a higher proportion of females reported having had their first sexual intercourse with their future spouse or boyfriend. However, the percentage of male respondents who had sex with girl friends are mentioned most by male respondents than other types of partners in first sexual intercourse. The findings illustrated that fewer proportions were having sex with commercial sex workers. Condom use in their first sexual intercourse ranged from 36-65% and 45-55% among females and males respectively.

Among 5 groups, condom use by student groups in their first sexual intercourse were reported in higher percentages than factory worker groups and general population groups.

The majority of respondents reported having their latest sexual intercourse with boyfriend / girlfriend than any other types of sexual partners. It is obvious that fewer proportions reported having had sex with commercial sex partners, showing a smaller group in this activity.

■ Perceiving STIs sign or symptom

Reports perceived having had sexual transmitted infections among female respondents ranged from 1-7%. Similarly among male respondents ranged from 1-8%. Higher reported STIs was reported among factory worker groups and general population than among student groups.

■ Alcohol use in the past month

The finding showed that male respondents reported a higher alcohol use than female respondents. Factory worker group, vocational student group, and general population self-reported a higher alcohol use than the ninth secondary school students (9 graders) who seemed

to be of a younger age group than others. There were a few respondents who reported having sexual activities after drinking alcohol. Additionally, condom use was not clearly reported among those who drank alcohol.

■ Illicit substance use in the past year

Percentage of those respondents who used illicit substance in the past year ranged from 1-19%. Percentage of illicit substance use was reported higher among males than females. The highest prevalence was reported by vocational school students. Nevertheless, there were very few respondents who reported injecting substances.

Trend of sexual risk behaviour in studying groups

The 9th year of secondary school students

■ Knowledge of HIV transmission and prevention based on UNGASS indicator was slightly improved.

■ Early sexual initiation (before aged of 15) was found to be slightly increasing among 9th female graders. On the contrary, the male student group was slightly decreasing. Boyfriend or girlfriend was the most cited as their first sexual partners. From this survey, it is clear that male students were less frequently visiting female commercial sex workers compared to past surveys. It was also noted that condom use by male students was reported higher, whereas the female students reported a lower percentage.

■ In assessing their sexual intercourse in the past year, the majority of respondents reported a higher percentage of casual partner type and it has increased from the previous study. Consistency in condom use by female students was improving whereas the male student use was getting worse. Nevertheless, the condom use was decreasing if their sexual partners were their boyfriend or girlfriend.

■ Condom use during latest sexual intercourse was declining.

■ Having sexual intercourse in trading for goods or money in the past year was found to be declining this year.

■ Perceiving STIs sign and symptom was considered to be higher in male groups rather than female groups.

■ Alcohol drinking in the past month showed there was a gender difference. More number of males reported the consumption than females. Percentage of males who reported sexual activities after drinking alcohol was increasing whereas the female students reported a lower percentage.

■ Illicit substance use in the past year was explored. The figure showed a slight increase of illicit substance use among male students. The use by male students was about one fold higher than female students. Injecting substances was reported as less than 1%. Males reported a higher use than female peers. Having sex after illicit substance use was found to be higher among female students than male students.



The 11th year of secondary school students

Knowing HIV prevention by UNGASS indicators, the percentage of those who answered questions correctly ranged from 9-20%.

Higher percentage of female secondary students reported having their first sexual intercourse with their boyfriend than male peers. Condom use of female students had increased whereas the male students reported the lower condom use in their first sexual intercourse.

Consistency in condom use in the past year when students have had sexual intercourse with girlfriend was slightly increasing. On the contrary, female students reported lower condom use. Condom use with other types of partners found to be unstable.

Condom use for the more recent sexual intercourse was reported to be higher among male secondary school

students this year, but female secondary students reported lower condom use.

Having sex as trade for goods or money among student groups was slightly decreased. Trend of condom use was still inconclusive.

Secondary school students reported slightly higher percentage of perceiving STIs than past year survey.

Having had HIV blood test in the past year, the findings showed a slight increase in the secondary student group, particularly among male students.

Reported alcohol drinking in the past month of secondary school students was slightly increased. In general, higher percentages of males reported drinking alcohol than their female peers. Those students who reported having sexual intercourse after drinking alcohol was slightly lower in this survey.

The 2nd year of vocational school student group

Knowledge of HIV prevention by UNGASS indicator, the finding showed an decrease of their knowledge.

Sexual initiation of female students was increasing. Male student group was slightly decreasing. Trend of sexual initiation among students was found to be increasing, particularly among female students.

Nevertheless, the female student group used condoms for their first

sexual intercourse in a higher percentage than the male group. The percentage of condom use in sexual intercourse in the past year tended to be increasing according to this survey.

Self-reported illicit drug use in the past year of vocational school students was found to be slightly increasing. In the past 6 years, the percentage of male vocational school students who reported illicit drug use was higher than their female peers.

General population aged 15 to 49 years old

■ Using UNGASS criteria, the knowledge of HIV prevention was generally decreased in most of the questions. Those who could correctly answer 5 questions decreased as well.

■ Early sexual initiation was slightly decreased. Proportion of early sexual initiation of females was lower than males. Average age of first sexual intercourse of females was higher than males. Condom use at first sexual intercourse of males was higher than females.

■ Perceiving sexually transmitted infection was slight higher than previous surveys in the past.

■ Having had an HIV test in the past year was reported higher among female population than male population.

■ Alcohol consumption in the past month was found to be decreased in this group. Percentage of males consuming alcohol was one-fold higher than female counterparts. In respected to having sexual intercourse after drinking alcohol, it is clear that the male group have had sexual intercourse more than the female group. Compared to the past 3 year's surveys, the male group used condom at a higher rate.

■ Illicit substance use was increasing. It is clear that the use was higher in males than females in the past 3 years. The finding also showed that those vocational school students who have had sexual intercourse after using illicit substances were slightly increased.

Factory worker groups

■ In general, knowledge of HIV transmission and prevention trended to improve slightly in every question.

■ Lesser percentage of male factory workers reported that they had their first sexual intercourse with spouse or girlfriend. Additionally, they reported more type of sexual partners than their female workers. Having sex with commercial sex workers was also reported in a very small percentage. However, it was found that condom use when they have had sex with girlfriend were lesser when comparing to other type of partners.

■ Condom use rates with recent sexual activities have been increasing from 5-year surveys particularly among male factory workers.

■ Having sex in trading for goods or money was found to be increasing among male workers. On the contrary, the percentage of having sex as trade within female groups was slightly decreased. Overall, the percentage among

the male group was still higher than the female group.

■ Perceiving STIs sign and symptom of factory worker groups generally was increasing, particularly among female workers.


■ Percentage of having HIV test in the past year among the factory worker group was slightly increased.

■ Alcohol consumption in the past month was increasing. In general, alcohol use by male factory workers was higher than the female worker group. In addition, having sexual encounters after consuming alcohol was slightly increased. Condom use rate was slightly increased too.

■ Illicit substance use by the female worker group was obviously lower than the male worker group. Having sex after substance use could not be determined as a trend because the number of those workers who used substances was quite low in the survey.

1

บทนำ



ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ที่ประเทศไทยได้พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นรายแรก จึงได้มีความพยายามพัฒนาระบบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ปัญหาเอดส์ได้อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง และทันเวลาดังนั้นการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญชิ้นหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามสถานการณ์ด้านพฤติกรรมในประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานมายกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีกลุ่มประชากรในการเฝ้าระวัง 7 กลุ่มเป้าหมายในครั้งแรก และดำเนินการสำรวจในปี พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 2547 ในประชากรกลุ่มเป้าหมายเดิม

ในปี พ.ศ. 2548 กองควบคุมโรคเอดส์ได้มีการพัฒนากลุ่มเป้าหมายของระบบการเฝ้าระวังออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชากรทั่วไปที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างน้อยกับกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างมาก แล้วทำการ

เฝ้าระวังในแต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมาย 2 ปี ต่อครั้ง โดยกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จะดำเนินการสำรวจพฤติกรรมทุกปี

ในปี พ.ศ. 2548 ได้เริ่มดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากใน 6 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 หญิงบริการทางเพศ ผู้ติดสารเสพติด โดยมีกลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มชายรักชาย เป็นกลุ่มประชากรที่เพิ่มเข้ามาในระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเป็นครั้งแรก ส่วนในปี พ.ศ. 2549 ได้ดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างน้อยใน 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ โดยเพิ่มกลุ่มประชากรทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการเฝ้าระวังพฤติกรรม ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ด้านพฤติกรรมในกลุ่มต่างๆ ได้มากขึ้น และในปี พ.ศ. 2550 ได้พิจารณาเพิ่มกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในระบบการเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น

อีกหนึ่งกลุ่มเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่พบว่าอายุของการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนนั้นมีอายุน้อยลง ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะดำเนินการสำรวจพฤติกรรมเพื่อทราบถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มดังกล่าว

ในปี พ.ศ. 2551 ได้สำรวจประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างน้อยดังเช่นในปี พ.ศ.2549 ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจพฤติกรรมมี 2 ประเภทคือ แบบสอบถาม (paper-based survey) และการสำรวจพฤติกรรมด้วยแบบสอบถามบนหน้าเว็บ (web-based survey) ซึ่งการสำรวจพฤติกรรมบนหน้า web นั้นสามารถดำเนินการสำรวจได้เฉพาะในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 เท่านั้น ส่วนกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป ได้ใช้แบบสอบถาม (paper-based survey) เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรม เช่นเดียวกับการเฝ้าระวังในปีที่ผ่านมา


ในปี พ.ศ. 2552 ได้สำรวจประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ค่อนข้างมาก ซึ่งประกอบด้วย 7 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 กลุ่มหญิงบริการทางเพศ กลุ่มผู้ติดยาเสพติด กลุ่มชายขอบชาย และกลุ่มแรงงานต่างด้าว ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจพฤติกรรมมี 2 ประเภทคือ แบบสอบถาม (paper-based survey) และแบบสอบถามบนหน้าเว็บ (web-based survey) ซึ่งการสำรวจพฤติกรรมบนหน้า web นั้นสามารถดำเนินการสำรวจได้เฉพาะในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 เท่านั้น ส่วนกลุ่มอื่นๆที่เหลือได้ใช้แบบสอบถาม (paper-based survey) เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมเช่นเดียวกับการเฝ้าระวังในปีที่ผ่านมา

สำหรับในปี พ.ศ. 2553 นี้ ได้มีการสำรวจประชากรกลุ่มเดียวกันกับปี พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 พนักงานในสถานประกอบการ และประชากรทั่วไป วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและพื้นที่ ใช้กรอบเดียวกันกับปี พ.ศ. 2551 สำหรับเครื่องมือมีการเปลี่ยนแปลงข้อความบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ รวมทั้งพฤติกรรมของคนในกรุงเทพมหานครด้วย



กรอบแนวคิด



วัตถุประสงค์

เพื่อทราบแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของประชากรที่เฝ้าระวัง

รูปแบบการดำเนินการ

เครื่องมือการวิจัย

1. แบบสอบถามบนหน้าเว็บ (Web-based survey)

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ แบบสอบถามมีจำนวน 5 หน้า คือ

- หน้าที่ 1 ข้อมูลด้านประชากร
- หน้าที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้ Internet
- หน้าที่ 3 ข้อมูลความรู้เรื่องโรคเอดส์
- หน้าที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ

หน้าที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม การใช้สารเสพติด

นักเรียนจะต้องตอบคำถามบนหน้าเว็บให้ครบทุกข้อ แล้วส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

2. แบบสอบถาม (paper-based survey)

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเองอย่างอิสระ ข้อมูลที่ได้มาคณะผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ (ไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ สถานที่) ก่อนที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะลงมือกรอกแบบสอบถาม

คณะผู้วิจัยได้อธิบาย และทำความเข้าใจในแบบสอบถามทุกครั้ง ซึ่งแบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 ส่วนดังต่อไปนี้

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากร
- ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการใช้สารเสพติด

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมทั้ง 2 แบบ ในครั้งนี้จะแยกกลุ่มเพศหญิงและเพศชาย แบบสอบถามในแต่ละเพศจะต่างชุดกัน

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ในการสำรวจครั้งนี้ กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ชาย, หญิง) กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ชาย, หญิง) กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2 (ชาย, หญิง) กลุ่มพนักงาน

ในสถานประกอบการ (ชาย, หญิง) และกลุ่มประชากรทั่วไป (ชาย, หญิง) ทั้งหมดสามารถอ่านออกเขียนได้ กลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น 5,138 ราย ดังรายละเอียดในตาราง 1.1

ตาราง 1.1 จำนวนตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ่มประชากร	จำนวนตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณ	จำนวนตัวอย่างที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ชาย, หญิง)	1,000	1,005
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ชาย, หญิง)	1,000	1,046
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ชาย, หญิง)	1,000	1,012
กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ (ชาย, หญิง)	1,000	1,070
กลุ่มประชากรทั่วไป (ชาย, หญิง)	1,000	1,005
รวม	5,000	5,138



ตาราง 1.2 ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย	ปี พ.ศ. 2553					
	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ชาย, หญิง)	←	→				
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ชาย, หญิง)			←	→	→	
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ชาย, หญิง)			←	→	→	
กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ (ชาย, หญิง)				←	→	
กลุ่มประชากรทั่วไป (ชาย, หญิง)				←	→	

หมายเหตุ: - - - ใช้แบบสอบถามหน้า web
 ———— ใช้แบบสอบถาม

ผลลัพธ์

ได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางและแนวทาง และประเมินผล

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในส่วนของแบบสอบถามที่ใช้กระดาษคำตอบ คณะผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลทุกฉบับเมื่อตรวจสอบความถูกต้องในขั้นต้นก่อนที่จะนำไปลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูลในลำดับต่อไปในส่วนแบบสอบถามบนหน้า web นั้น คณะผู้วิจัยได้ทำการประมวลผลบนหน้า web เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเป็นไปได้ในการทำระบบ Online Survey มาใช้ในระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรม หลังจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว จึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Epi Info,

โปรแกรม Minitab และโปรแกรม SPSS ร่วมกัน โดยสถิติที่ใช้ส่วนใหญ่จะนำเสนอข้อมูลด้วยความถี่ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การนำเสนอภาพรวมของประชากรทั้ง 5 กลุ่มของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ ในปี พ.ศ. 2551 ที่จะนำเสนอเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในประชากรกลุ่มต่างๆ กัน โดยการแยกวิเคราะห์ในกลุ่มเพศหญิง-ชายด้วย (สัดส่วนของเพศหญิง-ชายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไม่มากนัก)


สถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบัน

สถานการณ์โรคเอดส์ในระดับโลก

จากรายงานของ UNAIDS ประจำปี พ.ศ. 2552 ได้รายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และมีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ลดลง เนื่องจากการเข้าถึงยา ARV มากขึ้น ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่จะมีจำนวนลดลง แต่ในภาพรวมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงสูงอยู่ และยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงอยู่เช่นกัน

ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2-6 ล้านคน (2.3-2.8 ล้านคน) ซึ่งจำนวนการคาดการณ์มีน้อยกว่าปี พ.ศ. 2542 (19%) ที่มีจำนวน 3.1 ล้านคน (2.9-3.4 ล้านคน) และปี พ.ศ. 2540 (21%) ที่มีจำนวน 3.2 ล้านคน (3.0-3.5 ล้านคน) ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2552 จะเป็นปีที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูง

แผนภาพ 1.1 แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลก




ที่มา : http://www.unaids.org/documents/20101123_GlobalReport_em.pdf
http://www.unaids.org/documents/20101123_GlobalReport_em.pdf

สืบค้นข้อมูลเมื่อ 25 เมษายน พ.ศ. 2554



สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย


แผนภาพ 1.2 สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในประเทศ จำแนกตามเพศ
ในปี พ.ศ. 2547 – มีนาคม พ.ศ. 2554



เมื่อจำแนกผู้ป่วยเอดส์ตามเพศแล้ว จะเห็นว่าเพศชายยังคงเป็นผู้ป่วยเอดส์ สูงกว่าผู้หญิงประมาณ 2 เท่า แนวโน้ม ผู้ป่วยเอดส์ทั้งกลุ่มเพศชายและเพศหญิง มีลักษณะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จากปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2554

ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


แผนภาพ 1.3 สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในประเทศ จำแนกตามอายุ
ในปี พ.ศ. 2547 – มีนาคม พ.ศ. 2554



จำนวนผู้ป่วยเอดส์เมื่อจำแนกตามอายุ จะพบว่าส่วนใหญ่ หรือ ประมาณสองในสามเป็นกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ที่อายุระหว่าง 30-49 ปี รองลงมาคือ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี อายุมากกว่า 50 ปี และอายุ 0-14 ปี ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม จะเห็นว่าผู้ป่วยเอดส์ในกลุ่มอายุ 0-14 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น

ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


แผนภาพ 1.4 ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ในประเทศ จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง
ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554



สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในประเทศ
จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่เดือน
มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2554 พบว่า
การติดเชื้อเอชไอวีจากการมี
เพศสัมพันธ์ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุด
รองลงมาคือ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง
การฉีดยาเสพติดเข้าสู่
การติดเชื้อจากมารดา และปัจจัยอื่นๆ
ตามลำดับ

สถานการณ์โรคเอดส์ในกรุงเทพมหานคร

แผนภาพ 1.5 สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จำแนกตามเพศ
ในปี พ.ศ. 2527 – ธันวาคม พ.ศ. 2553




ที่มา: กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักงานมาย กรุงเทพมหานคร

ในกรุงเทพฯ มีผู้ป่วยเอดส์เพศ
ชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 2 เท่า
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยเอดส์ในปี
พ.ศ. 2552 แล้วพบว่าเพศชายมี
แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย แต่ลดลงในกลุ่มผู้หญิงในปี
พ.ศ. 2553 มีจำนวนผู้ป่วยเอดส์
จำนวน 1,436 ราย ซึ่งลดลงจากปี
พ.ศ. 2552 (จำนวน 1,531 ราย)
จำนวน 95 ราย



แผนภาพ 1.6 สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จำแนกตามอายุ
ในปี พ.ศ. 2527 – ธันวาคม พ.ศ. 2553




ที่มา: กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนของผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ ในแต่ละกลุ่มอายุเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า มีแนวโน้มคงที่

เมื่อจำแนกผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามอายุ จะพบว่า กลุ่มอายุ 30-49 ปี เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเอดส์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างชัดเจน รองลงมา คือกลุ่มอายุ 15-29 ปี กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี และกลุ่มอายุ 0-14 ปี ตามลำดับ

แผนภาพ 1.7 ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 – ธันวาคม พ.ศ. 2553



ที่มา: กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2527 - ธันวาคม พ.ศ. 2553 จำนวน 1,436 ราย พบว่าการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงการฉีดยาเสพติดเข้าเส้นโลหิต และการติดเชื้อจากมารดาตามลำดับ

2

กลุ่มนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2



การศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปี พ.ศ. 2553 เป็นการดำเนินการสำรวจ รอบที่ 4 ในประชากรกลุ่มนี้ ทำการเฝ้าระวังพฤติกรรมในทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โรงเรียนที่ทำการเฝ้าระวังในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานศึกษา กรุงเทพมหานครทั้งหมด จำนวนโรงเรียนที่สำรวจทั้งหมด 17 โรงเรียนและเป็นโรงเรียนเดิมที่สำรวจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ทั้งหมด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการสำรวจพฤติกรรมในแต่ละปี จำนวน 1,000 คน เป็นเพศหญิงและเพศชายอย่างละเท่าๆ กัน ดังนั้นในแต่ละโรงเรียนจะเฉลี่ยจำนวนตัวอย่างให้เท่ากันทุกโรงเรียน จะมีกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนจำนวน 60 คน เป็นเพศหญิงจำนวน 30 คน และเพศชายจำนวน 30 คน

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) ที่หน่วยข้อมูลจะมีช่วงตัวอย่าง (Sampling interval) คือ

$$k = N/n$$

N = จำนวนประชากร

n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 วิธี คือ

1. วิธี Liner systematic random sampling เมื่อ $k = N/n$ เป็นตัวเลขที่ลงตัว เมื่อได้ค่า k แล้ว ทำการสุ่มตัวเลขที่มีค่าในช่วงค่า k เช่น ถ้า $k = 5$ นักวิจัยสุ่มตัวเลข 1-5 โดยใช้ตารางเลขสุ่ม

2. วิธี Circular systematic sampling เมื่อ $k = N/n$ เป็นตัวเลขที่ไม่ลงตัว (มีเศษ) มีวิธีการดังนี้ คือ $N/n = q$ (จำนวนเต็ม) + R (ตัวเลขของจำนวนเต็ม) หลังจากนั้นนักวิจัยเลือกค่า $k = q$ เมื่อ $R \leq n/2$ และเลือก $k = q + 1$ เมื่อ $R > n/2$ แล้วสุ่ม R โดยใช้ตารางเลขสุ่มจาก 1 ถึง k

การดำเนินการเก็บรวบรวมในปี พ.ศ. 2553 อยู่ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2553 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกโรงเรียน โดยที่แต่ละโรงเรียนจะเตรียมนักเรียนที่ตกเป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับสถานที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นห้องประชุมของโรงเรียนทำให้การตอบแบบสอบถามของนักเรียนทุกคนมีความเป็นส่วนตัวและสามารถตอบคำถามด้วยความเป็นอิสระ นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในห้องเรียนด้วยตัวเองทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีจำนวน 4 หน้า 40 ข้อคำถาม ประกอบด้วย ข้อมูลด้านประชากร ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกาสิโน เสพติด แบบสอบถามจะแยกชุดกันระหว่าง

เพศหญิงและเพศชาย เวลาที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที การตอบแบบสอบถามจะให้นักเรียนตอบคำถามทุกข้อเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาในการตอบคำถามเท่าๆ กัน

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2553 มีจำนวนทั้งหมด 1,005 คน เป็นเพศชาย และเพศหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน จำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีสัดส่วนที่แตกต่างกันบ้าง เนื่องจากบางโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมาก และบางโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 60 คน จะไม่มีการสุ่มตัวอย่าง ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง จึงทำการสุ่มตัวอย่าง (โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 4 โรงเรียน ขนาดกลาง จำนวน 5 โรงเรียน และขนาดเล็ก จำนวน 8 โรงเรียน)

อายุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเฉลี่ยเท่ากับ 13.8 ปี มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.6 อายุของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดเท่ากับ 13 ปี และอายุที่มากที่สุดเท่ากับ 16 ปี ระยะเวลาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 11 ปี นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาก



ตาราง 2.1 อายุและระยะเวลา (ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

ข้อมูลประชากร	เพศ		รวม (n = 1,005)
	หญิง (n = 495)	ชาย (n = 510)	
อายุ			
ค่าเฉลี่ย	13.75	13.80	13.78
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.6	0.6	0.6
อายุน้อยที่สุด	13	13	13
อายุมากที่สุด	16	16	16
ระยะเวลาที่อยู่กรุงเทพมหานคร (ปี)			
ค่าเฉลี่ย (ปี)	11.12	11.11	11.11
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	4.43	4.33	4.38
ระยะเวลาน้อยที่สุด (ปี)	1	0.3	1
ระยะเวลามากที่สุด (ปี)	16	16	16


ลักษณะของการพักอาศัย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 82 ที่พักอาศัยอยู่กับบิดาและ/หรือมารดา ที่เหลือนักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับบิดา และ/หรือมารดา เป็นนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย (ในข้อคำถามนี้จะให้ตอบเพียงข้อเดียว โดยที่ถ้านักเรียนอยู่กับบิดาและ/หรือมารดา ก็ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ด้วยก็ตาม แล้วมีการเรียงลำดับความสำคัญของบุคคลที่อยู่อาศัยด้วย)

ระดับการเรียนรู้ (เป็นการสอบถามเกรดเฉลี่ยของเทอมก่อนหน้านี้คือ เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2553) พบว่านักเรียนเกือบครึ่งมีระดับการเรียนรู้ที่ดีมาก มากกว่า 3.00 ขึ้นไป นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับกลาง (2.01-3.00) ประมาณร้อยละ 41 มีนักเรียนร้อยละ 5 ที่มีผลการเรียนในระดับค่อนข้างต่ำ (น้อยกว่า หรือเท่ากับ 2) เมื่อวิเคราะห์แยกกลุ่มนักเรียนจำแนกตามเพศ แล้วพบว่านักเรียนหญิงมีระดับผลการเรียนที่ดีในสัดส่วนมากกว่ากลุ่มนักเรียนชายอย่างชัดเจน

ตาราง 2.2 ลักษณะของการพักอาศัยและระดับการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

การพักอาศัยและ ระดับการเรียนรู้	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การพักอาศัย						
บิดา และ/หรือมารดา	398	80.4	425	83.3	823	81.9
ผู้ปกครอง (ญาติ)	91	18.4	68	13.3	159	15.8
พี่น้อง	5	1.6	12	2.4	17	1.7
คนรู้จัก	1	0.2	4	0.8	5	0.5
ลำพังคนเดียว	0	0	1	0.2	1	0.1
ระดับการเรียนรู้						
น้อยกว่า 2.00	31	6.3	117	22.9	148	14.7
2.01 – 3.00	166	33.5	242	47.5	408	40.6
มากกว่า 3.00 ขึ้นไป	298	60.2	151	29.6	449	44.7

แผนภาพ 2.1 การมีคูรักรหรือแฟนของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2



การมีคูรักรหรือแฟน ในที่นี้มิได้
เจาะจงว่าเป็นคนต่างเพศ หรือคน
เพศเดียวกัน พบว่ามีนักเรียน
มากกว่า 1 ใน 3 ที่มีคูรักรหรือแฟน
ในจำนวนนักเรียนที่มีคูรักรหรือแฟน
นักเรียนหญิงมีสัดส่วนการมีคูรักร
หรือแฟนมากกว่าในกลุ่มนักเรียน
ชาย



ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ในส่วนนี้เป็นการสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ จำนวน 7 ข้อ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ในประเด็นเกี่ยวกับถุงยางอนามัย (ในข้อที่ 1 และข้อที่ 6) สูงกว่าข้ออื่นๆ ส่วนเรื่องการติดต่อโดยยุง และการรับประทานอาหารร่วมกัน ยังตอบได้ถูกต้องในสัดส่วนที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง รวมทั้งเรื่องของยาต้านไวรัส และคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอาจมีเชื้อเอชไอวี ก็มีสัดส่วนที่ตอบได้ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 เช่นกัน

เมื่อวิเคราะห์ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ ในกลุ่ม

นักเรียนหญิงสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในแต่ละข้อได้ถูกต้องสูงกว่านักเรียนชาย ยกเว้นเรื่องการติดต่อโดยยุงเป็นพาหะ นักเรียนชายตอบได้ถูกต้องในสัดส่วนที่สูงกว่านักเรียนหญิง และเรื่องถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ทั้งนักเรียนหญิง และชายตอบได้ถูกต้องในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เมื่อดูค่าเฉลี่ยของการตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องประมาณ 4 ข้อจากทั้งหมด 7 ข้อ

ตาราง 2.3 ร้อยละของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง

ข้อที่	ความรู้เรื่องเอดส์	หญิง (n = 495)	ชาย (n = 510)	รวม (n = 1,005)
1	ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวี	90.1	90.4	90.2
2	การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพียงคนเดียว และคนนั้นก็ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	68.9	61.6	65.2
3	คนที่มองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคืออาจมีเชื้อเอชไอวี	48.1	36.7	42.3
4	คนสามารถติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากยุงกัดได้	42.4	47.6	45.1
5	คนสามารถติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	41.8	36.3	38.5
6	การร่วมเพศกับแฟน/คนรักที่น่าวางใจโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ติดสามารถติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	78.2	67.6	72.8
7	ในปัจจุบันมียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอชไอวีได้ (ยาต้านไวรัส)	36.6	27.5	31.9
ค่าเฉลี่ยจำนวนข้อที่ตอบถูกต้อง		4.06	3.67	3.86
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.58	1.51	1.56

เมื่อวิเคราะห์ ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ (7 ข้อ) พบว่ามีนักเรียนที่ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทั้ง 7 ข้อ มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น (จำนวน 48 ราย) ซึ่งส่วนใหญ่ นักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง 7 ข้อ เป็นนักเรียนหญิง ในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนชายประมาณ 1 เท่า มีนักเรียนประมาณร้อยละ 2 ที่ไม่สามารถตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องเลยสักข้อเดียว

การวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ในข้อที่ 1-5 ได้ถูกต้องทุกข้อ ร้อยละ 9 หรือจำนวน 88 ราย นักเรียนหญิงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS ในสัดส่วนที่สูงกว่านักเรียนชายประมาณ 1 เท่าเช่นกัน

ตาราง 2.4 ร้อยละของจำนวนข้อที่ตอบได้ถูกต้อง

จำนวนข้อที่ตอบได้ถูกต้อง	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ตอบผิดทุกข้อ	9	1.8	7	1.4	16	1.6
ตอบถูก 1 ข้อ	14	2.8	33	6.5	47	4.7
ตอบถูก 2 ข้อ	55	11.1	77	15.1	132	13.1
ตอบถูก 3 ข้อ	99	20.0	111	21.8	210	20.9
ตอบถูก 4 ข้อ	132	26.7	129	25.3	261	26.0
ตอบถูก 5 ข้อ	90	18.2	97	19.0	187	18.6
ตอบถูก 6 ข้อ	61	12.3	43	8.4	104	10.3
ตอบถูกทุกข้อ	35	7.1	13	2.5	48	4.8
ตอบถูก 5 ข้อ (ตามเกณฑ์ของ UNGASS)	60	12.1	28	5.5	88	8.8




พฤติกรรมการใช้ Internet

พฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 พบว่ามีนักเรียนที่ตอบว่าไม่เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมาประมาณ ร้อยละ 4 หรือจำนวน 40 ราย นักเรียนหญิง มีสัดส่วนของการเคยใช้ Internet ในรอบ ปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกันกับนักเรียนชาย

เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่ม นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่แล้ว มีการใช้ Internet 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ รองลงมา มีการใช้ Internet ในทุกวัน เมื่อมีโอกาสหรือนานๆ ครั้ง และมีการใช้ Internet สัปดาห์ละครั้งตามลำดับ

แผนภาพ 2.2 พฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา



เมื่อวิเคราะห์ความถี่ของการใช้ Internet ในกลุ่มนักเรียนหญิง-ชาย เฉพาะในกลุ่มที่เคยใช้ Internet ในรอบ

1 ปีที่ผ่านมา ในกลุ่มนักเรียนชาย มีความถี่ในการใช้ Internet มากกว่า นักเรียนหญิง

ตาราง 2.5 ความถี่ของการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

ความถี่ของการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา	เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา (n= 965)			
	หญิง (n = 477)		ชาย (n = 488)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทุกวัน	90	18.9	161	33.0
2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์	170	35.6	159	32.6
สัปดาห์ละครั้ง	81	17.0	75	15.4
นานๆ ครั้ง/แล้วแต่โอกาส	136	28.5	93	19.1

จากการวิเคราะห์ในกลุ่มนักเรียนที่ใช้ Internet เป็นประจำทุกวัน (n = 251) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ 2 ใน 3 มีการใช้เวลากับ Internet วันละประมาณ 1-2 ชั่วโมง ประมาณร้อยละ 15 ที่ใช้เวลากับ Internet มากกว่า วันละ 3 ชั่วโมงขึ้นไป และ

ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน นักเรียนใช้เวลา กับ Internet ประมาณวันละ 3 ชั่วโมง นักเรียนหญิงมีการใช้เวลากับ Internet ในแต่ละวันในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ นักเรียนชาย

ตาราง 2.6 เวลาที่ใช้ Internet ในแต่ละวันของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

เวลาที่ใช้ Internet ในแต่ละวัน	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1 ชั่วโมง	32	35.6	71	44.1	103	41.0
2 ชั่วโมง	34	37.8	45	28.0	79	31.5
3 ชั่วโมง	13	14.4	24	14.9	37	14.7
มากกว่า 3 ชั่วโมง	11	12.2	21	13.0	32	12.7

ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อ วิเคราะห์สถานที่ที่ใช้ Internet เป็นประจำ แล้ว พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มากกว่า ครึ่งหนึ่งใช้ Internet เป็นประจำที่บ้าน Internet นักเรียนประมาณ 2 ใน 3 ใช้

Internet เป็นประจำที่บ้านของตนเอง ประมาณร้อยละ 11 ใช้ Internet เป็น ประจำที่โรงเรียน ส่วนนักเรียนที่ใช้ Internet เป็นประจำที่หอพัก ตามศูนย์- การค้าและที่บ้านเพื่อนมีสัดส่วนไม่มากนัก



เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนในแต่ละสถานที่ที่นักเรียนใช้ Internet เป็นประจำ จำแนกตามเพศ พบว่านักเรียนชายเกือบร้อยละ 60 ใช้ Internet เป็นประจำที่ร้าน Internet

ในขณะที่นักเรียนหญิงมีสัดส่วนร้อยละ 48 ส่วนการใช้ Internet ที่โรงเรียน นักเรียนหญิงมีสัดส่วนมากกว่านักเรียนชาย

ตาราง 2.7 สถานที่ใช้ Internet เป็นประจำในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

สถานที่ *	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ที่บ้าน	149	31.2	156	32.0	305	31.6
ร้าน Internet	227	47.6	285	58.4	512	53.1
โรงเรียน	78	16.4	32	6.6	110	11.4
หอพัก	1	0.2	-	-	1	0.1
ศูนย์การค้า	7	1.5	3	0.6	10	1.0
บ้านเพื่อน	14	2.9	12	2.5	20	2.7
ที่ทำงานมารดา	1	0.2	-	-	1	0.1

หมายเหตุ: * ตอบได้เพียงข้อเดียว

การสอบถามเกี่ยวกับการมีคู่รักหรือแฟนที่ติดต่อกันทาง Internet ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีนักเรียนประมาณ 1 ใน 4 เคยมีการหา

คู่รักหรือแฟนทาง Internet นักเรียนหญิงในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย

ตาราง 2.8 การมีคู่รักหรือแฟนทาง Internet ของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

การมีคู่รัก/ แฟนทาง Internet *	หญิง (n = 477)		ชาย (n = 488)		รวม (n = 965)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
เคย	134	28.1	130	26.6	264	27.4
ไม่เคย	343	71.9	358	73.4	701	72.6

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ประสพการณ์การมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีนักเรียนที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศสัมพันธ์แล้ว ประมาณ ร้อยละ 9 นักเรียนชาย และนักเรียนหญิง มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าในกลุ่มนักเรียนที่มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกด้วยความยินยอมพร้อมใจของตนเองเสียเป็นส่วนใหญ่ มีประมาณร้อยละ 11 ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยถูกบังคับ นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกด้วยการถูกบังคับเป็น

นักเรียนหญิงในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนชายอย่างชัดเจน

คู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟนของตนเอง รองลงมาคือ คนที่มีเพศเดียวกัน คนที่รู้จักกันคุ้นเคย คนที่รู้จักกันผิวเผิน ตามลำดับ ส่วนการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ขายบริการทางเพศมีเพียงอย่างละ 1 รายเท่านั้น นักเรียนชายมีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่คูรักหรือแฟนในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนหญิง

ตาราง 2.9 การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และคู่นอนครั้งแรก ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ *	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมีเพศสัมพันธ์	44	8.9	46	9.0	90	9.0
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก						
• สมัครใจ	36	81.8	44	95.7	80	88.9
• ถูกบังคับ	8	18.2	2	4.3	10	11.1
คู่นอนครั้งแรก						
• คูรักหรือแฟน	35	79.5	40	87.0	75	83.3
• คนที่รู้จักกันคุ้นเคย	2	4.5	1	2.2	3	3.3
• คนที่ขายบริการทางเพศ	-	-	1	2.2	1	1.1
• เพศเดียวกัน	7	15.9	4	8.7	11	12.2
ใช้ถุงยางอนามัย	25	56.8	24	52.2	49	54.4

หมายเหตุ: * คัดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์



อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าโดยเฉลี่ยมีอายุประมาณ 13 ปี อายุนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยที่สุดคือ 10 ปี ซึ่ง

เป็นนักเรียนชาย และอายุมากที่สุดเท่ากับ 15 ปี ในกลุ่มนักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกเท่ากัน

ตาราง 2.10 อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เพศ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	อายุน้อยที่สุด	อายุมากที่สุด
หญิง (n = 44)	13.07	0.89	11	15
ชาย (n = 46)	13.07	1.21	10	15
รวม (n = 90)	13.07	1.06	10	15

การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่านักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54) มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก นักเรียนหญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย (ร้อยละ 56.8 และร้อยละ 52.2) ในกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยครั้งแรก (ประมาณร้อยละ 45.6) มีเหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัย ดังต่อไปนี้ เพศเดียวกัน

แฟนไม่ยากใส่/แฟนไม่ยอมใส่/ไม่ยากใช้/ไม่คิด/มันกระทันหัน/ไม่คิดจริงจังจึงนึกว่าเล่นๆ/ลืม/ซื้อไม่ทัน/ไม่ได้ซื้อ/ซื้อเกียจซื้อไม่กล้าไปซื้อ/ไม่มีตังค์ซื้อ/เป็นเวลาฉุกเฉินไม่คิดว่าจะมี Sex/อยากลอง/แน่ใจว่าไม่มีอะไรเพราะผมยังเด็ก/เขายังไม่เคยกับใคร/แน่ใจว่าไม่มีเชื้อ/ครั้งแรกของชีวิต/คู่รักยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์/เป็นเด็กน่าจะไม่มีโรค/ไม่มี/มันไม่มัน/มันไม่สนุก/ใช้แล้วไม่มันไม่ทราบ/ใช้ไม่เป็น/ไม่รู้/จริงใจ/ไว้ใจ

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มนักเรียนที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศสัมพันธ์มาก่อน แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 11 ราย หรือประมาณร้อยละ 12 ซึ่งนักเรียนในกลุ่มนี้จะ ไม่คิดสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้นจำนวนนักเรียนที่นำมาคิดสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งหมด 79 ราย จากนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว จำนวน 90 ราย

จำนวนคู่นอนของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีจำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมาไม่แตกต่างกันมากนัก นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ 2 ใน 3 มีจำนวนคู่นอนเพียงคนเดียว เมื่อคิดสัดส่วนในกลุ่มนักเรียนหญิง-ชายแล้วจะเห็นว่า นักเรียนชายมีจำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่า 1 คน ในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิง

ตาราง 2.11 จำนวนคู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา
ของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

จำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา	หญิง (n = 40)		ชาย (n = 39)		รวม (n = 79)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1 ราย	29	72.5	23	59.0	52	65.8
2 ราย	5	12.5	11	28.2	16	20.3
3-11 ราย	6	15.0	5	12.8	11	13.9
ค่าเฉลี่ย	1.75		1.95		1.85	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.84		2.01		1.92	
จำนวนน้อยที่สุด	1		1		1	
จำนวนมากที่สุด	11		11		11	



เพศสัมพันธ์ของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาจะมีเพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟน รองลงมาคือ บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย บุคคลที่มีเพศเดียวกัน บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน และคนที่ขายบริการทางเพศ ตามลำดับ นักเรียน

หญิงมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมากับบุคคลที่เป็นคูรักหรือแฟน ในสัดส่วนที่น้อยกว่านักเรียนชาย

การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ พบว่า คู่นอนที่เป็นคูรักหรือแฟน มีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง น้อยกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ

ตาราง 2.12 การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ในรอบปี	เพศสัมพันธ์				ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง			
	หญิง (n = 40)		ชาย (n = 39)		หญิง (n = 40)		ชาย (n = 39)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คูรัก/แฟน	25	62.5	28	71.8	11	44.0	7	25.0
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	5	12.5	8	20.5	3	60.0	3	37.5
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	1	2.5	6	15.4	1	100.0	1	16.7
ผู้ขายบริการทางเพศ	-	-	3	7.7	-	-	2	66.7
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	6	15.0	7	17.9	-	-	3	42.9

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดพบว่าส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟน คู่นอนที่มีลำดับรองลงมาคือ คนที่มีเพศเดียวกัน คนที่รู้จักกันคุ้นเคย และคนที่รู้จักกันผิวเผิน ตามลำดับ มีนักเรียนเพียง 1 คนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้ง

ล่าสุดกับผู้ขายบริการทางเพศ สำหรับการใช้อย่างอนามัย พบว่านักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ใช้อย่างอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด นักเรียนหญิงมีสัดส่วนการใช้อย่างอนามัยน้อยกว่ากลุ่มนักเรียนชาย

ตาราง 2.13 เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	หญิง (n = 40)		ชาย (n = 39)		รวม (n = 39)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คู่นอนครั้งสุดท้าย						
• คู่รัก/แฟน	35	87.5	30	76.9	65	82.3
• บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	1	2.5	1	2.6	2	2.5
• บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	-	-	2	5.1	2	2.5
• ผู้ขายบริการทางเพศ	-	-	1	2.6	1	1.3
• บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	4	10.0	5	12.8	9	11.4
การใช้ถุงยางอนามัย						
• ใช้	20	50.0	24	61.5	44	55.7
• ไม่ใช้	20	50.0	15	38.5	35	44.3

ส่วนนักเรียนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย ให้เหตุผลหลักๆ ดังต่อไปนี้ เพศเดียวกัน/เป็นเหมือนกัน คงไม่ใช้อะไร/แฟนไม่ยากใส่/แฟนไม่ให้ใช้/

ไม่ทันคิด/ไม่คิดว่าจะมี/ซื้อไม่ทัน/ซื้อเกียจซื้อไม่ได้ซื้อ/ ไม่มีดั่งค์ซื้อ/แฟนไม่กล้าไปซื้อ/คู่รักยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์/ถ้าใช้จะไม่มีความรู้สึก/ไม่สะดวก/มันไม่สนุก/ใช้แล้วไม่สนุก

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

ในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน ร้อยละ 2.5 หรือจำนวน 2 ราย นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน เป็นนักเรียนชายทั้งหมด

การใช้ถุงยางอนามัย พบว่านักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ/เงินตอบแทน มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง จำนวน 1 ราย ใช้ถุงยางอนามัย เป็นบางครั้ง จำนวน 1 ราย



ตาราง 2.14 เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ

มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน และการใช้ถุงยางอนามัย *	หญิง (n = 40)		ชาย (n = 39)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมี	-	-	2	5.1
การใช้ถุงยางอนามัย				
• ใช้ทุกครั้ง	-	-	1	50.0
• ใช้บางครั้ง	-	-	1	50.0

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาเท่านั้น

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น การมีปัสสาวะแสบขัด มีแผลที่อวัยวะเพศ หรือมีหนองไหลจากอวัยวะเพศ พบว่ามีสัดส่วนไม่มากนัก จำนวน 4 รายเท่านั้น หรือร้อยละ 0.4 จากนักเรียนทั้งหมด (n = 1,005) เป็น

นักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง

การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการผิดปกติพบว่านักเรียนจำนวน 1 ราย มีการปรึกษากับเพื่อน จำนวน 1 ราย ไปหาหมอที่สถานพยาบาล หรือคลินิก อีกจำนวน 2 ราย ไม่ได้ทำอะไรเลย

ตาราง 2.15 การมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมี	1	0.2	3	0.6	1	0.4
การปฏิบัติตน						
• ปรึกษาเพื่อน/คู่รัก	-	-	1	33.3	1	50.0
• ไปรักษาตามคลินิกหรือสถานพยาบาล	-	-	1	33.3	1	25.0
• ไม่ได้ทำอะไรเลย	1	100.0	1	33.3	2	50.0

ปัญหาเรื่องเพศ

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีนักเรียนประมาณร้อยละ 5 เคยมี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนชายมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศมากกว่า นักเรียนหญิงประมาณ 1 เท่าตัว

การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องเพศ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่มีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องเพศส่วนใหญ่จะปรึกษากับพ่อแม่

ผู้ปกครอง หรือญาติพี่น้อง หรือเพื่อน รองลงมา ปรึกษากับแฟนหรือคู่รัก เกือบ 1 คนเดียว หาหนังสืออ่านเอง และปรึกษากับครู/อาจารย์ ตามลำดับ นักเรียนหญิง ส่วนใหญ่จะปรึกษากับเพื่อน ส่วนนักเรียน ชายส่วนใหญ่จะปรึกษากับแฟน/คู่รัก และ ผู้ปกครอง

ตาราง 2.16 การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ จำแนกตามเพศ

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมี	18	3.6	31	6.1	49	4.9
การปฏิบัติตน						
• พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ญาติ	5	27.8	9	29.0	14	28.6
• เพื่อน	6	33.3	5	16.1	11	22.4
• ครู/อาจารย์	1	5.6	1	3.2	2	4.1
• แฟน/คู่รัก	1	5.6	9	29.0	10	20.4
• หาหนังสืออ่าน	2	11.1	-	-	2	4.1
• เกือบ 1 คนเดียว	1	5.6	5	16.1	6	12.2
• ไม่รู้จะปรึกษาใคร	2	11.1	2	6.5	4	8.2

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีใน รอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีการตรวจ เลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในสัดส่วนไม่มากนัก กล่าวคือ มีประมาณร้อยละ 2 นักเรียนชาย- หญิงมีสัดส่วนของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ เอชไอวีเท่าๆ กัน

ในกลุ่มนักเรียนที่มีการตรวจเลือดเพื่อหา เชื้อเอชไอวี พบว่านักเรียนที่ทราบผลการ ตรวจเลือดประมาณ 2 ใน 3 มีจำนวน 9 ราย หรือร้อยละ 39 ที่ไม่ทราบผลการ ตรวจเลือด



ตาราง 2.17 การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยตรวจ	10	2.0	13	2.5	23	2.3
ทราบผลตรวจเลือด						
• ทราบผล	7	70.0	7	53.8	14	60.9
• ไม่ทราบผล	3	30.0	6	46.2	9	39.1

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

พฤติกรรมการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) หรือ ประมาณ 2 ใน 3 ไม่เคยดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นักเรียนชายมี สัดส่วน ของ การ ดื่ม เครื่อง ดื่ม ที่มี แอลกอฮอล์มากกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิง

ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ (คิดสัดส่วนในกลุ่มนักเรียนที่ เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น) พบว่านักเรียน

ส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นานๆ ครั้ง หรือแล้วแต่โอกาสเท่านั้น มีเพียงร้อยละ 13 ของนักเรียนที่เคยดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ ผ่านมาค่อนข้างบ่อยคือ ทุกวัน จนถึง 1 ครั้งต่อสัปดาห์

นักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทุกวัน (n = 13 ราย) พบว่า ปริมาณที่ดื่ม ในแต่ละวัน 1-2 แก้ว จำนวน 7 ราย และดื่ม ในแต่ละวัน 3 แก้ว หรือมากกว่า จำนวน 6 ราย

ตาราง 2.18 ความถี่ของการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ของ
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

การตีเครื่องตี ที่มีแอลกอฮอล์	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ตี	186	37.6	216	42.4	402	40.0
ไม่เคยตี	309	62.4	294	57.6	603	60.0
ความถี่ *						
• ทุกวัน	1	0.5	12	5.6	13	3.2
• 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	5	2.7	20	9.3	25	6.2
• 1 ครั้งต่อสัปดาห์	4	2.2	9	4.2	13	3.2
• แล้วแต่โอกาส	75	40.3	68	31.5	143	35.6
• นานๆ ครั้ง	101	54.3	107	49.5	208	51.7

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์

พฤติกรรมการสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ในรอบปีที่ผ่านมาของกลุ่มนักเรียน พบว่า มีนักเรียนประมาณ 1 ใน 4 เคยสูบบุหรี่แล้ว โดยเพศชายมีสัดส่วนในการสูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิงประมาณ 2 เท่าตัว

ความถี่ในการสูบบุหรี่นั้น (คิดสัดส่วนเฉพาะนักเรียนที่สูบบุหรี่ในรอบปีที่ผ่านมา) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะสูบแล้วแต่โอกาส และเคยทดลองสูบ โดยเพศชายนั้นมีสัดส่วนของการสูบบุหรี่ทุกวัน (ติดบุหรี่) มากกว่า

เพศหญิงประมาณ 2 เท่า ปริมาณที่สูบบุหรี่ในแต่ละวันของกลุ่มนักเรียนที่สูบบุหรี่ทุกวัน พบว่ามีนักเรียนจำนวน 9 รายที่สูบบุหรี่ วันละมากกว่า 10 มวน หรือมากกว่าครึ่งซองต่อวัน มีจำนวน 5 รายที่ไม่ตอบว่าสูบบุหรี่ วันละ กี่มวน ที่เหลือ (จำนวน 34 ราย) สูบบุหรี่วันละ 5 มวน และที่เหลือสูบบุหรี่วันละ 6-9 มวนต่อวัน



ตาราง 2.19 ความถี่ของการสูบบุหรี่ของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

การสูบบุหรี่	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยสูบบุหรี่	61	12.3	174	34.1	235	23.4
ไม่เคยสูบบุหรี่	434	87.7	336	65.9	770	76.6
ความถี่ *						
ทุกวัน	5	8.2	52	29.9	57	24.3
แล้วแต่โอกาส	29	47.5	74	42.5	103	43.8
เคยทดลองสูบ	27	44.3	48	27.6	75	31.9

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่สูบบุหรี่

พฤติกรรมการเสพสารเสพติด

การเสพสารเสพติดประเภทผิดกฎหมาย ในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ ยาบ้า/กัญชา/เฮโรอีน หรือโคเคน เป็นต้น พบว่านักเรียนร้อยละ 6 ที่เคยเสพสารเสพติด ในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนชาย มีสัดส่วนของการเสพสารเสพติดมากกว่านักเรียนประมาณ 3 เท่าตัว

ความถี่ของการเสพสารเสพติด พบว่า มีนักเรียนจำนวน 8 ราย ที่ต้องมีการเสพสารเสพติดทุกวัน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 7 ราย และนักเรียนหญิง จำนวน 1 ราย

ตาราง 2.20 การเสพสารเสพติดประเภทผิดกฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา

การเสพสารเสพติด	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยเสพ	10	2.0	52	10.2	62	6.2
ไม่เคยเสพ	485	98.0	458	89.8	943	93.8
ความถี่ *						
• ทุกวัน	1	10.0	7	13.5	8	12.9
• แล้วแต่โอกาส	6	60.0	18	34.6	24	38.7
• นานๆ ครั้ง	3	30.0	27	51.9	30	48.4

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เสพสารเสพติดประเภทผิดกฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา

ถ้าวิเคราะห์ในกลุ่มนักเรียนที่สูบบุหรี่กับการใช้สารเสพติดของกลุ่มนักเรียน พบว่านักเรียนที่สูบบุหรี่มีการใช้สารเสพติดด้วยประมาณร้อยละ 22 ส่วนนักเรียนในกลุ่มที่ไม่

สูบบุหรี่ แต่มีการใช้สารเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีจำนวน 10 รายเท่านั้น ดังนั้นการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตาราง 2.21 การสูบบุหรี่และการใช้สารเสพติด

การใช้สารเสพติด	สูบบุหรี่				Fisher's Exact test
	สูบบุหรี่ (n = 235)		ไม่สูบบุหรี่ (n = 770)		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เสพสารเสพติด (n = 62)	52	22.1	10	1.3	.000 *
ไม่เสพสารเสพติด (n = 943)	183	77.9	760	98.7	

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับการใช้สารเสพติด พบว่านักเรียนที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีสัดส่วนของการเสพสารเสพติดมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในภาพรวมแล้วจะสามารถสรุปได้ว่านักเรียนที่ใช้สารเสพติดจะมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตาราง 2.22 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับการใช้สารเสพติด

การใช้สารเสพติด	ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์				Fisher's Exact test
	ดื่ม (n = 402)		ไม่ดื่ม (n = 603)		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เสพสารเสพติด (n = 62)	54	13.4	8	1.3	.000*
ไม่เสพสารเสพติด (n = 943)	348	86.6	595	98.7	

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001



เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติด

เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ในการคิดสัดส่วนของนักเรียนในส่วนนี้ จะคิดเฉพาะนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และเป็นนักเรียนที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาด้วย) พบว่านักเรียนชายประมาณ 1 ใน 3 มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิงประมาณ 1 เท่าตัว สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 40 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งร้อยละ 47 ที่ใช้ถุงยางอนามัยบางครั้ง นักเรียนหญิง และชายมีสัดส่วนการ

ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่แตกต่างกัน

เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด (คิดสัดส่วนเฉพาะนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และมีการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา) พบว่ามีนักเรียนร้อยละ 32 ที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ถ้าคิดสัดส่วนจำแนกตามเพศแล้ว นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่านักเรียนชาย สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ($n = 5$)

ตาราง 2.23 เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และหลังการเสพยาเสพติด และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ

สารเสพติด	จำนวน	เพศสัมพันธ์*		ใช้ถุงยางอนามัย					
				ทุกครั้ง		บางครั้ง		ไม่ใช้เลย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์**	มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ($n = 62$ ราย)								
หญิง	31	4	12.9	2	50.0	2	50.0	-	-
ชาย	31	11	35.5	4	36.4	5	45.5	2	18.2
สารเสพติด***	มีเพศสัมพันธ์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา ($n = 22$ ราย)								
หญิง	3	2	66.7	1	50.0	-	-	1	50.0
ชาย	19	5	26.3	4	80.0	1	20.0	-	-

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนเฉพาะนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ($n = 79$ คน)

** คิดสัดส่วนเฉพาะนักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

*** คิดสัดส่วนเฉพาะนักเรียนที่เคยเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วิธีการเสพสารเสพติด

การใช้สารเสพติดชนิดฉีดโลหิตดำ พบว่า มีนักเรียนจำนวน 2 รายที่เคยเสพสารเสพติด โดยการฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ และมีจำนวน 1 รายที่เคยเสพยาด้วยวิธีเช่นนี้เสพโดยใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น และที่มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนำมาใช้ต่อเป็นบางครั้งเท่านั้น

นักเรียนจำนวน 2 รายที่มีการเสพสารเสพติดโดยการฉีดเข้าเส้นโลหิตดำในครั้งแรกเมื่ออายุ 12 ปี และ 14 ปี โดยภาพรวมแล้ว นักเรียนเพียง 1 รายเท่านั้น ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงมากต่อการติดเชื้อเอชไอวี


ตาราง 2.24 วิธีการเสพสารเสพติด จำแนกตามเพศ

การเสพโดยฉีด* เข้าเส้นโลหิตดำ	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 458)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคย	-	-	2	0.2
ไม่เคย	10	2.0	50	9.8
ไม่เคยเสพสารเสพติด	485	98.0	458	89.8
ใช้เป็นครั้งแรกเมื่ออายุ (ปี)				
12 ปี	-	-	1	50.0
14 ปี	-	-	1	50.0
เคยใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น**	-	-	1	50.0
ทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนำมาใช้ **				
บางครั้ง	-	-	1	100.0

หมายเหตุ: * การคิดสัดส่วนในส่วนนี้คิดในกลุ่มรวมทั้งหมด (ไม่ระบุเวลา)
** คิดสัดส่วนเฉพาะที่เคยเสพสารเสพติดโดยการฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ
*** คิดสัดส่วนเฉพาะที่เคยใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น

3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และนักเรียน อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2



การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ในปี พ.ศ.2553 เป็นรอบที่ 9 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน ตุลาคม- ธันวาคม พ.ศ. 2553

ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เก็บข้อมูลกับโรงเรียนเดียวกันกับปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมด และได้มีการเพิ่มโรงเรียนขยายโอกาสของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 โรงเรียน

ส่วนในนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในปี พ.ศ.2552 เช่นเดียวกัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 โรงเรียน

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) ที่หน่วยข้อมูลจะมีช่วงตัวอย่าง(sampling interval) คือ

$$k = N/n$$

N = จำนวนประชากร

n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 วิธี คือ

1. วิธี Liner systematic random sampling เมื่อ $k = N/n$ เป็นตัวเลขที่ลงตัว

(ไม่มีเศษ) เมื่อได้ค่า k แล้ว ทำการสุ่มตัวเลขที่มีค่าในช่วงค่า k เช่น ถ้า $k = 5$ นักวิจัยสุ่มตัวเลข 1-5 โดยใช้ตารางเลขสุ่ม

2. วิธี Circular systematic sampling เมื่อ $k = N/n$ เป็นตัวเลขที่ไม่ลงตัว (มีเศษ) มีวิธีการดังนี้ คือ $N/n = q$ (จำนวนเต็ม) + R (เศษของจำนวนเต็ม) หลังจากนั้นนักวิจัยเลือกค่า $k = q$ เมื่อ $R \leq n/2$ และเลือก $k = q + 1$ เมื่อ $R > n/2$ แล้วสุ่ม r โดยใช้ตารางเลขสุ่มจาก 1 ถึง k

ในบางกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถให้นักวิจัยสุ่มตัวอย่างนักเรียนแบบมีระบบได้ เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงต้องมีการสุ่มตัวอย่างนักเรียนเป็นห้องเรียน ดังนั้นนักวิจัยจะสุ่มตัวอย่างนักเรียนเป็นห้องเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่แตกต่างกันออกไปให้ครบตามจำนวนที่ต้องการในแต่ละโรงเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจาก Internet โปรแกรมที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมคือ Lime Survey ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ และเก็บข้อมูลได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ขั้นตอนของการทำ Web-based Survey มีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

วิธีการตอบคำถามด้วย Web-based Survey

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ

การเตรียมการสำหรับการตอบคำถามด้วย web-based survey นั้น อาจารย์ผู้ประสานงานทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ของแต่ละโรงเรียนที่ตกเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้นัดวัน-เวลาในการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง เมื่อถึงวันเวลานัดหมาย อาจารย์ ผู้ประสานงานได้จัดนักเรียนให้ตอบแบบสอบถามนี้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต

ได้ และเมื่อนักวิจัยพบกับนักเรียน นักวิจัยแนะนำตัว พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์และวิธีการสำหรับการตอบแบบสอบถาม ต่อจากนั้นนักวิจัยแจกรหัสหรือ Token พร้อมชื่อ Website ที่ใช้สำหรับการตอบแบบสอบถามให้นักเรียนแต่ละคน โดยรหัสหรือ Token ของแต่ละคนที่ได้รับจะไม่ซ้ำกัน เมื่อนักเรียนเข้าสู่ www.aihdmahidol.org แล้วจะพบหน้าแรกของเว็บไซต์นี้ ดังภาพ





ขั้นที่ 2 ขั้นเข้าสู่ระบบ

จากขั้นที่ 1 เมื่อได้พบกับหน้าแรกของแบบสอบถามแล้วนักวิจัยให้นักเรียนเข้าสู่ระบบ คือ ให้นักเรียนคลิกที่ **แบบสอบถามสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2** ระบบก็จะนำเข้าสู่หน้าที่ 2 คือการเข้าสู่ระบบ โดยนักเรียนต้องกรอกรหัสหรือ Token ที่ได้รับจากนักวิจัย โดย Token ที่นักเรียนกรอกนั้นประกอบด้วยเลข และตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์เล็ก) ทั้งหมด 15 หลัก โดยรหัสหรือ Token ที่นักเรียนกรอกนี้หากกรอกผิดหรือกรอกซ้ำกับ Token ที่ได้ตอบแบบสอบถามไปแล้ว ระบบจะให้นักเรียนกลับมาใส่ให้ถูกต้องอีกครั้ง โดย Token นี้ นักวิจัยเตรียมสำรองไว้เพื่อให้นักเรียนได้ตอบแบบสอบถามครบตามจำนวน หลังจาก que นักเรียนกรอก Token แล้ว คลิก **ดำเนินการต่อ**

แบบสอบถามด้านสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

คำถามทั้งหมด 59 ข้อ (41 ข้อใหญ่) ซึ่งเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัว

คำตอบที่เป็นจริงของท่านจะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้

ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอตส์ของประเทศ

ขอรับรองคำตอบที่ได้จะไม่มีการนำไปเผยแพร่โดยไม่ยินยอมจากคุณ

This is a controlled survey. You need a valid token to participate.

If you have been issued with a token, please enter it in the box below and click continue.

Token

ดำเนินการต่อ

ขั้นที่ 3 ขั้นชี้แจงการตอบแบบสอบถามและอธิบายวัตถุประสงค์

หลังจากคลิก [ดำเนินการต่อ](#) ในหน้าที่ 2
จะพบกับเว็บไซต์ที่แสดงรายละเอียดของ
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย จำนวนข้อ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ คำชี้แจง และชื่อ

หน่วยงานที่ดำเนินการ ซึ่งนักวิจัยจะเป็น
ผู้อธิบายรายละเอียดเหล่านี้ เมื่ออธิบาย
เสร็จให้นักเรียนคลิก [ถัดไป](#)

แบบสอบถามด้านสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

คำถามทั้งหมด 59 ข้อ (41 ข้อใหญ่) ซึ่งเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัว

คำเตือน: เป็นจริงของท่านจะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ขอรับรองว่าคำตอบที่ได้จะไม่มีการนำไปเปิดเผย เป็นระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ

กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณท่านที่ร่วมในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามในทุกข้อ และตอบตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อชีวิตของคนกรุงเทพฯ ที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์

ขอให้ความมั่นใจว่าคำตอบของท่านจะเป็นความลับ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม

1. ไม่ต้องระบุ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่
2. แบบสอบถามนี้มีจำนวน 59 ข้อ (41 ข้อใหญ่) ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
 - ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากร
 - ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์
 - ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรม
3. เลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือ เติมข้อความสั้นๆ

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ

ส่วนงานวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
25/5 พุทธมณฑล 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-9040-3 ต่อ 45, 54 หรือ 0-2441-9870
โทรสาร 0-2441-9044

หรือ กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2860-8751-6 ต่อ 502 หรือ 507

There are 61 questions in this survey.

A Note On Privacy
This survey is anonymous.

The record kept of your survey responses does not contain any identifying information about you unless a specific question in the survey has asked for this. If you have responded to a survey that used an identifying token to allow you to access the survey, you can rest assured that the identifying token is not kept with your responses. It is managed in a separate database, and will only be updated to indicate that you have (or haven't) completed this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses in this survey.

[ถัดไป >>](#)

[จบแบบสำรวจและล้างข้อมูล]

[Load Unfinished Survey](#)



ขั้นที่ 4 ขั้นการตอบแบบสอบถาม

เมื่อถึงหน้าแบบสอบถามหน้าแรกแล้ว
ให้นักเรียนเริ่มตอบแบบสอบถาม โดยต้อง
ตอบตามความจริงซึ่งแบบสอบถามจะมี
แบบเลือกตอบ แบบเติมคำหรือตัวเลข
และ มีทั้งหมด 3 หน้า คำถามในแต่ละข้อจะ
มีคำอธิบายวิธีการตอบไว้อย่างละเอียด เมื่อ

นักเรียนตอบหน้าที่หนึ่ง และหน้าที่สอง
เสร็จคลิก **ถัดไป**

เมื่อตอบหน้าที่สามเสร็จคลิก (ส่ง)
Submit ซึ่งการตอบแบบสอบถามในแต่ละ
หน้า นักเรียนต้องตอบครบทุกข้อถึงจะ
สามารถไปตอบคำถามในหน้าถัดไปได้

* กรุณาระบุเพศของท่าน Choose one of the following answers ☐ เพศชาย ☐ เพศหญิง
* ท่านกำลังศึกษาอยู่ในระดับใด Choose one of the following answers ☐ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ☐ อาชีวศึกษาชั้นปีที่ 2 ? กรุณาระบุลักษณะของสถาบันและระดับการศึกษาของท่าน
* ข้อที่ 1) ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. ไต Choose one of the following answers กรุณาเลือก.. ▾ ? กรุณาระบุปีพ.ศ.ที่เกิด โดยการเลือกปีที่ท่านเกิดจากรายการที่มีอยู่
* ข้อที่ 2) ท่านอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลากี่ปี และ กี่เดือน Only numbers may be entered in these fields จำนวนปี จำนวนเดือน ? กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลขลงในช่องที่กำหนด ตัวอย่าง เช่น ท่านอยู่ในกรุงเทพฯ มาแล้ว 6 เดือน ให้กรอก จำนวนปี [0] จำนวนเดือน [6] ท่านอยู่ในกรุงเทพฯ มาแล้ว 4 ปี 3 เดือน ให้กรอก จำนวนปี [4] จำนวนเดือน [3]

ขั้นที่ 5 ขั้นการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

เมื่อคลิก **Submit** หรือ ส่งใน
แบบสอบถามหน้าที่สามแล้ว หมายถึง การ
ตอบแบบสอบถามของนักเรียนสมบูรณ์
แล้ว จะปรากฏหน้าเว็บดังภาพ ซึ่งหน้า
เว็บนี้ต้องให้นักวิจัยตรวจสอบว่านักเรียนที่ตอบ-

แบบสอบถามเสร็จแล้วขึ้นหน้าเว็บนี้
หรือไม่ ถ้ามีหน้าเว็บนี้แล้วถึงจะสามารถ
ปิด Window และรับของที่ระลึกจาก
โครงการ ซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นการตอบ
แบบสอบถาม





ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มนักเรียนตัวอย่างที่เข้ามาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ มีสัดส่วนของนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย สำหรับ

สัดส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

ตาราง 3.1 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษา

เพศ/ระดับการศึกษา	ระดับการศึกษา			
	มัธยมศึกษาปีที่ 5 (n = 1,046)		อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (n = 1,012)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หญิง (n = 1,077)	583	55.7	494	48.8
ชาย (n = 981)	463	44.3	518	51.2

อายุโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างประมาณ 16.7 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.8 อายุที่น้อยที่สุดเท่ากับ 15 ปี และอายุที่สูง-

ที่สุดเท่ากับ 22 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับอายุของนักเรียน จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษาแล้วไม่มีความแตกต่างกันมากนัก

ตาราง 3.2 อายุเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

อายุเฉลี่ย	มัธยมศึกษาปีที่ 5			อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2			รวม		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
ค่าเฉลี่ย	16.68	16.71	16.76	16.85	16.84	16.78	16.76	16.78	16.77
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	.85	.80	.88	.91	.89	.85	.88	.85	.87
อายุน้อยสุด	15	15	15	15	15	15	15	15	15
อายุสูงสุด	22	22	22	22	22	22	22	22	22

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยประมาณ 13 ปี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครใกล้เคียงกันกับนักเรียน

อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 และนักเรียนชายมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่ากับนักเรียนหญิง

ตาราง 3.3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกทม.	มัธยมศึกษาปีที่ 5			อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2			รวม		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
ค่าเฉลี่ย	13.12	14.20	13.60	13.13	13.38	13.26	13.71	13.78	13.46
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	5.36	4.38	4.97	5.65	5.41	5.53	5.61	4.98	5.32
ระยะเวลาดำสุด	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ระยะเวลาดำสุด	20	18	20	20	20	20	20	20	20

หมายเหตุ: ไม่รวมนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในปริมณฑล คือ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี

ลักษณะการพักอาศัยของนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 80) พักอาศัยอยู่กับบิดา และ/หรือมารดา รองลงมาประมาณ ร้อยละ 13 อาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง ที่เหลืออาศัยอยู่กับพี่ๆ น้องๆ อยู่กับเพื่อน และอยู่เพียงลำพังคนเดียวซึ่งมีสัดส่วนที่น้อยมาก

นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนของการพักอาศัยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา และ/หรือมารดามากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล็กน้อย นักเรียนชายมีสัดส่วนของการอาศัยอยู่กับบิดา และ/หรือมารดามากกว่านักเรียนหญิงเล็กน้อย



ตาราง 3.4 ลักษณะการพักอาศัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

บุคคลที่พักอาศัย	รวม (n = 2,058)		มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2			
			หญิง (n = 583)		ชาย (n = 463)		หญิง (n = 494)		ชาย (n = 518)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดา และ/หรือมารดา	1,724	83.8	495	84.9	404	87.3	392	79.4	433	83.6
ผู้ปกครอง/ญาติ (ลุง, ป้า, น้า, อา)	267	13.0	73	12.5	50	10.8	80	16.2	64	12.4
พี่/น้อง/ลูกพี่ลูกน้อง	36	1.7	10	1.7	3	0.6	11	2.2	12	2.3
คนรู้จัก	9	0.4	1	0.2	2	0.4	4	0.8	2	0.4
อยู่คนเดียว	15	0.7	2	0.3	2	0.4	5	1.0	6	1.2
อยู่กับเพื่อน	4	0.2	-	-	1	0.2	2	0.4	1	0.2
อื่นๆ	3	0.1	2	0.3	1	0.2	-	-	-	-

หมายเหตุ: ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยถ้าอาศัยอยู่กับหลายบุคคล เช่น อาศัยอยู่กับมารดา และพี่น้อง ให้ลำดับความสำคัญกับมารดา

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (เกรดเฉลี่ย) ในปีการศึกษาที่ผ่านมาของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในรอบปี พ.ศ. 2553 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลางจนถึงดีมาก นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างอ่อน หรือมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2 มีเพียงร้อยละ 14 ส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง

มากคือ มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.5 ขึ้นไปมีร้อยละ 8 เมื่อวิเคราะห์กลุ่มนักเรียนตัวอย่างในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 แล้วพบว่า นักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งมีผลการเรียนในระดับกลางๆ คือ มีเกรดเฉลี่ยประมาณ 2.00-3.00 ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ตาราง 3.5 ระดับการศึกษาของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
และนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ระดับการศึกษา	รวม (n = 2,058)		มัธยมศึกษาปีที่ 5 (n = 1,046)		อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (n = 1,012)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1.5	45	2.2	18	1.7	27	2.7
1.51 – 2.00	202	9.8	88	8.4	114	11.3
2.01 2.50	543	26.4	261	25.0	282	27.9
2.51 – 3.00	640	31.1	325	31.1	315	31.1
3.01 – 3.50	455	23.1	255	24.4	200	19.8
มากกว่า 3.50 ขึ้นไป	173	8.4	99	9.5	74	7.3

การมีคูรักรหรือแฟนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีคูรักรหรือแฟน นักเรียนประมาณ 1 ใน 3 ที่มีคูรักรหรือแฟน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สัดส่วนของการมีคูรักรหรือแฟนน้อยกว่านักเรียนอาชีวศึกษาระดับ

ปวช. ปีที่ 2 นักเรียนหญิงอาชีวศึกษามีสัดส่วนของการมีคูรักรหรือแฟนมากกว่านักเรียนชาย ส่วนนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนของการมีคูรักรหรือแฟนมากกว่านักเรียนหญิง

ตาราง 3.6 การมีคูรักรหรือแฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

การมีคูรักร	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปีที่ 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
มีคูรักร	199	34.1	184	39.7	221	44.7	194	37.5	798	38.8
ยังไม่มีคูรักร	384	65.9	279	60.3	273	55.3	324	62.5	1,260	61.2



ลักษณะการใช้เวลาว่างของกลุ่มนักเรียนในภาพรวม พบว่ามี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประมาณ 1 ใน 3 ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการดูภาพยนตร์ โทรทัศน์/ฟังเพลง หรืออ่านหนังสือ มีนักเรียนประมาณ 1 ใน 4 ใช้เวลาว่างไปกับการเล่นกีฬา เล่นดนตรี และการออกกำลังกาย ร้อยละ 16 ใช้เวลาว่างกับการเล่นเกม/Internet

นักเรียนหญิง และนักเรียนชายใช้เวลาว่างที่แตกต่างกัน โดยที่นักเรียนหญิงส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างกับการดูภาพยนตร์ โทรทัศน์/ฟังเพลง หรืออ่านหนังสือ สำหรับนักเรียนชายส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างกับการเล่นกีฬา เล่นดนตรี และการออกกำลังกาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะของการใช้เวลาว่างไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักกับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ตาราง 3.7 การใช้เวลาว่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

การใช้เวลาว่าง	เพศ				ระดับการศึกษา				รวม (n = 2,058)	
	หญิง		ชาย		ม. 5		ปวช.2			
	(n = 1,077)	(n = 981)	(n = 1,046)	(n = 1,012)	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เล่นกีฬา/เล่นดนตรี/ออกกำลังกาย	76	7.1	401	40.9	270	26.8	207	20.5	477	23.2
เรียนพิเศษ	35	3.2	18	1.8	45	4.3	8	0.8	53	2.6
ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/เสพสารเสพติด	2	0.2	19	1.9	4	0.4	17	1.7	21	1.0
เล่นการพนัน	2	0.2	3	0.3	1	0.1	4	0.4	5	0.2
เดินตามศูนย์การค้า/Shopping	21	0.2	8	0.8	14	1.3	15	1.5	29	1.4
เล่นเกมส์/Internet	116	1.9	205	20.9	134	12.8	187	18.5	321	15.6
ทำงานเพื่อหารายได้พิเศษ	50	4.6	32	3.3	29	2.8	53	5.2	82	4.0
คุยโทรศัพท์	92	8.5	15	1.5	33	3.2	74	7.3	107	5.2
ทำงานบ้าน/ช่วยเหลือครอบครัว ทำงาน	66	6.1	23	2.3	38	3.6	51	5.0	89	4.3
เที่ยวตามสถานบันเทิง	1	0.1	3	0.3	2	0.2	2	0.2	4	0.2

ตาราง 3.7 การใช้เวลาว่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียน
อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ต่อ)

การใช้เวลาว่าง	เพศ				ระดับการศึกษา				รวม (n = 2,058)	
	หญิง (n = 1,077)		ชาย (n = 981)		ม. 5 (n = 1,046)		ปวช.2 (n = 1,012)			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทำที่บ้าน/อ่านหนังสือ	53	4.9	8	0.8	41	3.9	20	2.0	61	3.0
สังสรรค์กับเพื่อนๆ	13	1.2	44	4.5	21	2.0	36	3.6	57	2.8
ดูภาพยนตร์/โทรทัศน์/ ฟังเพลง/อ่านหนังสือ ทั่วไป	504	46.8	175	17.8	376	35.9	303	29.9	679	33.0
นอนหลับ	46	4.3	23	2.3	35	3.3	34	3.4	69	3.4
แข่งรถมอเตอร์ไซด์	0	-	4	0.4	3	0.3	1	0.1	4	0.2

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกลุ่มนักเรียนโดยภาพรวม พบว่านักเรียนที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องมากกว่าครึ่งหนึ่ง จำนวน 4 ข้อ (ระหว่างร้อยละ 67.0 - 90.5) คือ ilyang อนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ การมีเพศสัมพันธ์กับคนไว้วางใจโดยไม่ใช้ ilyang อนามัยสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้ การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ และคนที่มองเห็นว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงดี อาจเป็นคนที่ติดเชื้อเอชไอวีได้ ตามลำดับ มากไปน้อย

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ที่นักเรียนตอบ ได้ถูกต้องในสัดส่วนที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง จำนวน 5 ข้อ (อยู่ระหว่างร้อยละ 26.0-45.0) คือ การกินอาหารร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวีสามารถติดเชื้อเอดส์ yung เป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คน การมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างมีประจำเดือนไม่สามารถทำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้ ในปัจจุบันมียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอชไอวี และการสวนล้างช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย



ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนหญิง และนักเรียนชายมีสัดส่วนของการตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ทั้ง 9 ข้อ ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ในภาพรวมแล้ว พบว่านักเรียนชายสามารถตอบคำถาม ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องไม่แตกต่าง

กับนักเรียนหญิงเช่นกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนที่ตอบความรู้ทั้ง 9 ข้อได้มากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 เล็กน้อย (ค่าเฉลี่ยที่ตอบความรู้ได้ถูกต้องเท่ากับ 5.1 และ 4.5 ตามลำดับ)

ตาราง 3.8 ร้อยละการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

ข้อที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 5		อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2		รวม	
		หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	จำนวน	ร้อยละ
1	การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคเอดส์	93.3	93.7	86.6	88.0	1,862	90.5
2	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์ เป็นวิธีหนึ่ง ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์	71.5	74.5	62.8	64.7	1,407	68.4
3	คนที่เรามองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีอาจเป็นคนที่ติดเชื้อเอดส์	71.7	70.8	68.2	56.6	1,376	66.9
4	ยุ่งสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คน	41.2	44.3	38.7	35.9	822	39.9
5	การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ สามารถติดเชื้อเอดส์	51.3	49.5	40.7	38.2	927	45.0
6	การร่วมเพศกับแฟน/คนรักที่น่าวางใจโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย สามารถติดเชื้อเอดส์	28.6	29.4	22.3	23.7	536	26.0
7	ในปัจจุบันมียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอดส์ (ยาต้านไวรัส)	76.5	70.4	71.7	63.3	1,454	70.7
8	การสวมถุงยางอนามัยหลังการร่วมเพศ สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์	33.8	34.1	32.2	34.2	691	33.6
9	การร่วมเพศระหว่างมีประจำเดือนไม่ สามารถทำให้ติดเชื้อเอดส์	43.7	43.0	34.4	32.0	790	38.4

สำหรับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามตัวชี้วัดของ UNGASS ข้อที่ 1-5 พบว่านักเรียนตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อ (ข้อ 1-5) ร้อยละ 13 นักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการตอบคำถาม ข้อที่ 1-5 ได้ทุกข้อใกล้เคียงกันกับนักเรียนชาย (ร้อยละ 12.9 และ 12.2 ตามลำดับ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนของการตอบคำถามได้ถูกทั้ง 5 ข้อ มากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ร้อยละ 16.0 และ 9.2 ตามลำดับ)

เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนหญิง และนักเรียนชาย มีสัดส่วนการตอบคำถามข้อที่ 1-5 ได้ถูกทุกข้อใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันกับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปี 2 นักเรียนชายมีสัดส่วนของการตอบคำถามข้อที่ 1-5 ได้ถูกทุกข้อใกล้เคียงกับนักเรียนหญิง

การตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทั้งหมด (ข้อที่ 1-7) พบว่ามีนักเรียนเพียง

ร้อยละ 5 เท่านั้นที่ตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ (ร้อยละ 5.1 และ 4.5 ตามลำดับ) และนักเรียนชายมีสัดส่วนของการตอบคำถามได้ถูกทุกข้อมากกว่านักเรียนหญิง ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการตอบคำถามได้ถูกทุกข้อมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ร้อยละ 6.2 และ 3.3 ตามลำดับ) เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 พบว่านักเรียนหญิง และนักเรียนชาย มีสัดส่วนการตอบคำถามได้ถูกทุกข้อใกล้เคียงกัน

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ที่นักเรียนสามารถตอบได้ถูกต้อง จำนวน 9 ข้อ (ข้อที่ 1-9) พบว่ามีเพียงร้อยละ 1.4 เท่านั้น นักเรียนหญิง – ชาย กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนที่ตอบได้ถูกต้องทั้ง 9 ข้อ ใกล้เคียงกัน

ตาราง 3.9 การตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด UNGASS ได้ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ความรู้	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ตอบข้อที่ 1 – 5 ได้ถูกต้อง (ตามตัวชี้วัด UNGASS)	93	16.0	73	15.8	46	9.3	47	9.1	259	12.6
ตอบข้อที่ 1-7 ได้ถูกต้อง	32	5.5	33	7.1	16	3.2	17	3.3	98	4.8
ตอบข้อที่ 1-9 ได้ถูกต้อง	7	1.2	8	1.7	8	1.6	6	1.2	29	1.4



พฤติกรรมการใช้ Internet

การสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีนักเรียนจำนวน 41 ราย หรือร้อยละ 2 ที่ไม่เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนหญิง-นักเรียนชายมีสัดส่วนของการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 98.6 และ 97.3 ตามลำดับ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 เพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 98.9 และ 97.1 ตามลำดับ) ในกลุ่มนักเรียนที่เคยใช้ Internet ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มากกว่าครึ่งหนึ่งใช้ Internet ทุกวัน และมีระยะเวลาที่ใช้ Internet ในแต่ละวันประมาณ

3 ชั่วโมง สถานที่ที่ใช้ Internet เป็นประจำคือ ที่บ้าน ที่ร้าน Internet และที่โรงเรียน ตามลำดับ สถานที่ใช้ Internet ของนักเรียนหญิง – ชาย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี2 มีสัดส่วนไม่แตกต่างกัน

การมีคู่มือหรือแฟ้มทาง Internet พบว่านักเรียนประมาณร้อยละ 30 ที่มีคู่มือหรือแฟ้มทาง Internet นักเรียนชายมีสัดส่วนของการมีคู่มือหรือแฟ้มทาง Internet มากกว่านักเรียนหญิง และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 มีสัดส่วนของการมีคู่มือหรือแฟ้มทาง Internet มากกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตาราง 3.10 พฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

พฤติกรรมการใช้ Internet	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคย	577	99.0	457	98.7	485	98.2	498	96.1	2,017	98.0
ทุกวัน	276	47.8	260	56.9	213	43.8	281	56.4	1,030	51.1
2-3 ครั้ง/สัปดาห์	198	34.3	131	28.7	175	36.1	131	26.3	635	31.5
สัปดาห์ละครั้ง	32	5.5	15	3.3	22	4.5	18	3.6	87	4.3
เป็นบางครั้งบ้างคราว	71	12.3	51	11.2	75	15.5	68	13.7	265	13.1
ระยะเวลา (นาทิจ)*										
(มัธยมฐาน)	180		180		180		180		180	

ตาราง 3.10 พฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ต่อ)

พฤติกรรมการใช้ Internet	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สถานที่*										
บ้าน	416	72.2	325	71.1	307	63.3	307	61.8	1,356	67.2
ร้าน Internet	102	17.7	104	22.8	101	20.8	141	28.4	448	22.0
โรงเรียน	45	7.8	16	3.5	67	13.8	33	6.6	161	8.0
หอพัก	-	-	1	0.2	2	0.4	5	1.0	8	0.4
ศูนย์การค้า	1	0.2	-	-	1	0.2	1	0.2	3	0.1
บ้านเพื่อน	11	1.9	10	2.3	7	1.4	10	2.0	38	1.9
โทรศัพท์	1	0.2	1	0.2	-	-	-	-	2	0.1
มีคู่รัก/แฟน*	107	18.6	136	29.8	179	36.9	183	36.7	605	30.0

* เฉพาะนักเรียนที่เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

นักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปี พ.ศ. 2553 มีประมาณร้อยละ 29 นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์จะเป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 34.5 และ 23.9 ตามลำดับ) และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 39.5 และ 18.6 ตามลำดับ)

การวิเคราะห์พฤติกรรมทางเพศของนักเรียน จะวิเคราะห์เฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน (n = 595)

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นการสมัครใจมีเพศสัมพันธ์ มีนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยการถูกบังคับ ร้อยละ 11 โดยนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยการถูกบังคับมากกว่านักเรียนชายค่อนข้างชัดเจน (ร้อยละ 20.6 และ 4.4 ตามลำดับ) ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยถูกบังคับน้อยกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ร้อยละ 8.2 และ 13.0 ตามลำดับ)



เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนพบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 91 มีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกกับคูรักหรือแฟน มีร้อยละ 4.5 มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย และมีประมาณร้อยละ 4.0 ที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน กับบุคคลที่รู้จักกัน-ผิวเผิน ร้อยละ 1 ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลที่ขายบริการทางเพศไม่พบเลยในรอบปีนี้

สัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนในกลุ่มนักเรียนหญิง-ชาย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน

อาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2 ไม่แตกต่างกันมากนัก

การใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก พบว่านักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ใช้ถุงยางอนามัยในครั้งแรก สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย (ร้อยละ 56.4, 54.3 ตามลำดับ) และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 เล็กน้อย (ร้อยละ 56.7, 54.5 ตามลำดับ)

ตาราง 3.11 เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2


เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมีประสบการณ์ทางเพศ	65	11.1	130	28.1	192	38.9	208	40.2	595	28.9
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก *										
ถูกบังคับ	12	18.5	4	3.1	41	21.4	11	5.3	68	11.4
สมัครใจ	53	81.5	126	96.9	151	78.6	197	94.7	527	88.6
คู่นอนครั้งแรก *										
คูรัก/แฟน	61	93.8	119	91.5	173	90.1	187	89.9	540	90.8
คนที่รู้จักกันคุ้นเคย	3	4.6	6	4.6	5	2.6	13	6.3	27	4.5
คนที่รู้จักกันผิวเผิน	-	-	-	-	2	1.0	2	1.0	4	0.7
คนขายบริการทางเพศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพศเดียวกัน	1	1.5	5	3.8	12	6.3	6	2.9	24	4.0
การใช้ถุงยางอนามัย *	42	64.6	68	52.7	103	53.6	115	55.3	328	55.2

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน

เมื่อวิเคราะห์กลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี พบว่ามีประมาณร้อยละ 20 ของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว นักเรียนชายมีสัดส่วนที่มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปีมากกว่า

นักเรียนหญิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี ใกล้เคียงกันกับนักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวช.ปี 2

แผนภาพ 3.1 อายุของนักเรียนเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก





ในกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก มีเหตุผลของแต่ละบุคคลที่หลากหลายดังต่อไปนี้

เหตุผลที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (หญิง)

กระทันหัน, ฉุกเฉิน, โดนเพื่อนหลอก, ถูกบังคับเพราะตอนที่มิเพศสัมพันธ์ไม่มีถุงยางใช้ เพราะมัน ไม่มี, เพราะไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า, เพราะว่าเขาเป็นทอม, เพศเดียวกัน มันใจว่าไม่มีโรค, เขาไม่ยอมใส่, ไม่ได้เตรียมตัว, ไม่ได้เตรียมพร้อม, ไม่ทัน, ไม่มี ธิบ, สิมซื้อ, อยู่ที่บ้านเพื่อน ไม่ได้ซื้อไว้, กระทันหัน, กินยาแทน, จี้เกียจใช้, เขาไม่ยอมใส่ คงไม่มีอะไรหรอก, ครั้งแรก, คาดไม่ถึงไม่คิดว่าจะมี, คิดว่าคงไม่มีอะไร คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอก, คิดว่าเค้าจริงจังกับเรา ในความคิดของวัยรุ่นคิดว่าไม่เป็นอะไร นึกไม่ถึง สิม, ป้องกันการตั้งครรภ์, เป็นเพศเดียวกัน, ผู้ชายไม่ได้บอกไว้ล่วงหน้า, เพราะเป็นเพศเดียวกัน ไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชาย, เพราะฝ่ายชายไม่ได้ใส่, เพราะฝ่ายชายไม่ยอมใส่ เพราะมันกระทันหันไม่คิดว่าจะมี, เพราะมีแฟนเป็นทอม, เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะมีเพศสัมพันธ์ จึงไม่ ใช้เพราะไม่ได้เตรียมการและไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิด, เพราะไม่มีถุงยางอนามัย เพราะไม่รู้ มันอาจจะครั้งแรก ก็เลยไม่ได้ใส่, เพราะว่าเชื่อใจและไม่ทันได้เตรียมถุงยางอนามัย เพราะว่า มันไม่มีติดอยู่ในตัว, เพราะหนูเป็นดี, เพศเดียวกัน, เพศเดียวกัน, มันไม่ให้ใช้ ณ ตอนนั้น มันรวดเร็ว และไม่ได้บอกมาก่อน, มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน, ไม่กล้าซื้อ ไม่กล้าไปซื้อ, ไม่ชอบไม่ได้กังวลและไม่ได้คิดอะไรว่าจะเกิดอะไรตาม, ไม่ได้คิดจะทำ, ไม่ได้ซื้อ ไม่ได้ตั้งตัว, ไม่ได้เตรียมตัว, ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้ ไม่ได้เตรียมตัว ไม่ทราบมาก่อน, ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า, ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อน, ไม่ได้เตรียมตัวไว้ ก่อนว่าจะเพศสัมพันธ์, ไม่ได้เตรียมพร้อม, ไม่ได้เตรียมมา, ไม่ได้เตรียมไว้ ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน, ไม่ได้ไปซื้อไม่ได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้า, ไม่ทราบ, ไม่ทราบว่าจะมีเพศสัมพันธ์ ไม่มี ไม่มีถุงยางอนามัย, เพราะไม่คิดว่าจะมีอะไรกัน, ไม่มี และกลัวว่าเค้าจะหาว่ารังเกียจเขา ไม่มีเหตุผล, ไม่รู้เพราะอาจจะไว้วางใจคนรักมากไปก็ได้, ไม่รู้ เมา, ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าเขาใช้ยังงี้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรกัน, ไม่รู้ว่าต้องใช้, ยังไม่ได้ตั้งตัว...ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำ, สิม ไว้ใจแฟน, ใส่ไม่เป็นและไว้ใจกัน, ใส่แล้วมันไม่มัน



เหตุผลที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ชาย)

เพราะเขาไม่เคยได้กับใครมาก่อน, เชื้อใจ, ในช่วงนั้นไม่มี
เพราะคิดว่าไม่จำเป็น, เพราะแฟนโดนผมเปิดชิงเลยมันใจ, เพราะ มันเกิดกระทันหัน เลยไม่ได้ตั้งตัว
เพราะไม่มีถุงยาง, เพราะเราไว้วางใจว่าคนรักของเราไม่มีเชื้อเอ็ดส์
เพราะว่า ตอนนั้นผมยังเด็กแล้วก็ไม่รู้เรื่อง, เพราะว่าไม่มีถุงยาง,
เพราะ...อารมณ์ มา ไปและสามารถทำให้ เสียโอกาส, มันไม่สะใจ, มันไม่สนุก ไม่กล้าไปซื้อ
ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรเพราะเป็นเพื่อนกัน
ไม่ชอบ, ไม่ได้คิด, ไม่ได้ซื้อ, ไม่ได้เตรียมตัวและไม่กล้ากดที่ตู้, ไม่ได้เตรียมมา
ไม่ได้เตรียมไว้, ไม่ได้พกติดตัว, ไม่ เพราะต่างคนต่างไม่เคยมาก่อน
ไม่มันส์, ไม่มีการเตรียมตัวมาก่อน, ไม่มีถุงยางอนามัย, ไม่มีในตอนนั้น
ไม่ได้ซื้อ, ไม่มีเวลาซื้อ, ไม่มีใส่ในตอนนั้น, ไม่อยากใช้, ไม่อยากใส่
ยังไม่เคย, รีบทำ, รีบและไม่ทันนึกถึงผลที่จะตามมา, ไวใจ คนรัก, สนุก, ใส่ไม่เป็น, หาซื้อไม่ได้
หาไม่ทัน ไม่ได้ตั้งตัว, อยากลอง, ไม่ทราบ, ขี้เกียจซื้อ
คิดว่าเขาคงไม่เป็นหรอกแต่ก็กลัวเหมือนกัน, คู่รักไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนและตัวเองก็ไม่เคย
ตอนนั้น เมา, ตอนนั้นไม่มีถุง, ตื่นเต้นจนไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น, ถุงยางที่มีเหลือหมด
นำไว้วางใจ, เนื่องจากมีในโรงแรมจึงหาสถานที่ซื้อไม่ทัน, บอกไม่ถูก
เป็นช่วงเวลาฉุกเฉิน, เพราะ ตอน นั้น ยังเด็ก ไม่ ได้ คิด ไร มาก
เพราะว่า แฟนของเราไม่ผ่านใครมาก่อน, เพราะ ให้ผู้หญิงกินยาคุม, เพราะอายุที่จะไปซื้อ
เพราะแฟนไม่ให้ใส่ เพราะไม่เคย, เพราะรู้ว่าคนที่เราคบอยู่ไม่เคยมีอะไรกับใคร, มันรีบ,
ยังไม่ทันตั้งตัว มันก้อมา, ไม่กล้าซื้อ, ไม่กล้าไปซื้อถุงยางอนามัย,
ไม่คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันในตอนนั้น, ไม่ชอบ, ไม่ชอบใส่, ใส่แล้วไม่หนุกด้วย 5, ไม่ได้เตรียมการ,
ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมี อารมณ์พาไปจะ, ไม่ได้ออกไปซื้อ, ไม่ทันการ, ไม่ทันคิด, ไม่ทันซื้อ,
ไม่ทันได้คิด ,ไม่ใช้เพราะ ไวใจคู่รัก, ไม่มัน, ไม่มีเงินซื้อ, ไม่มีถุงยางในขณะนั้น,
หาไม่ได้, ไม่มีให้ใช้, ไม่อยากใช้, ยังใช้ไม่เป็น, ยังเด็กอยู่, รำคาญ ไม่อยากใส่, รีบ
ฉุกเฉิน, เราเป็นแรกของเขาแล้วเขาก็เป็นคนแรกเหมือนกัน,
รำคาญ ไม่ถนัดเลย, ลืมซื้อ, ไวใจ, วางใจแฟนเพราะว่าแฟนไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มา
ใส่ลำบาก, ใส่แล้วแฟนบอกว่ามันเจ็บก็เลยถอย, อยากสนุก





เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์มีร้อยละ 73 หรือประมาณ 3 ใน 4 มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา คิดสัดส่วนเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาเท่านั้น ($n = 430$) ไม่นับรวมนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทของคู่นอนของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ในส่วนนี้คิดสัดส่วนในแต่ละประเภทของคู่นอน โดยแยกวิเคราะห์กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาของกลุ่มนักเรียน โดยส่วนใหญ่แล้วมีเพศสัมพันธ์กับ

คู่รักหรือแฟน รองลงมาคือ บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย บุคคลที่มีเพศเดียวกัน บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน ตามลำดับ นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ขายบริการทางเพศมีสัดส่วนที่น้อยมาก คือ ประมาณร้อยละ 4 เท่านั้น

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่รักหรือแฟน มีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันระหว่างนักเรียนหญิง-ชาย ส่วนในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักหรือแฟน ในสัดส่วนที่มากกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล็กน้อย ส่วนการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทอื่นๆ นักเรียนชายมีสัดส่วนมากกว่านักเรียนหญิง

ตาราง 3.12 ประเภทคู่นอน และการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ในรอบปี*	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เคยมีเพศสัมพันธ์	44	67.7	88	68.2	40	20.9	60	29.0	430	72.6
2. ประเภทคู่นอน*										
คู่รัก/แฟน	40	90.9	81	92.0	144	96.0	142	96.6	407	94.9
คนที่รู้จักกันคุ้นเคย	5	11.4	15	17.0	10	6.7	34	23.1	64	14.9
คนที่รู้จักกันผิวเผิน	2	4.5	7	8.0	8	5.4	24	16.3	41	9.6
คนขายบริการทางเพศ	-	-	4	4.5	-	-	15	10.2	19	4.4
เพศเดียวกัน	6	13.6	9	10.2	19	12.7	9	6.1	43	10.0

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนเฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

การใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทต่างๆ พบว่ากลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ขายบริการทางเพศ มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ กลุ่มนักเรียนที่มีคู่นอนเป็นคู่อรักหรือแฟน มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยที่สุด คือ ประมาณร้อยละ 23

เมื่อเปรียบเทียบการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่อรักหรือแฟน จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษาแล้ว พบว่า นักเรียนชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อรัก หรือแฟน

มากกว่านักเรียนหญิงประมาณ 1 เท่าตัว (ร้อยละ 28.7, 15.8 ตามลำดับ) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อรักมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 เล็กน้อย (ร้อยละ 26.4, 21.3)

ในภาพรวมของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่อรักหรือแฟน มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทอื่นๆ

ตาราง 3.13 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

การใช้ถุงยางอนามัย*	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คู่อรัก/แฟน (n =407)	8	20.0	24	29.6	21	14.6	40	28.2	93	22.9
คนที่รู้จักกันคุ้นเคย(n =64)	2	40.0	7	46.7	3	30.0	16	47.1	28	43.8
คนที่รู้จักกันผิวเผิน (n = 41)	1	50.0	3	42.9	2	25.0	10	41.7	16	39.0
คนขายบริการทางเพศ (n =19)	-	-	3	75.0	-	-	13	86.7	13	68.4
เพศเดียวกัน (n = 43)	0	0	1	11.1	1	5.3	3	33.3	5	11.6

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนในแต่ละประเภท



จำนวนคู่นอน (คน) ของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 มีคู่นอนเพียงคนเดียวในรอบปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 62.6) เมื่อวิเคราะห์จำนวนคู่นอนโดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนชายมีจำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมามากกว่า 1 คน ในสัดส่วนที่สูงกว่า

นักเรียนหญิง และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีจำนวนคู่นอนมากกว่า 1 คน ในรอบปีที่ผ่านมา ในสัดส่วนมากกว่ากลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่มีจำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมามากที่สุดเท่ากับ 31 คน

ตาราง 3.14 จำนวนคู่นอน (คน) ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

จำนวนคู่นอน	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1 คน	31	70.5	59	67.0	105	69.5	74	50.3	269	62.6
มากกว่า 1 คน	13	29.5	29	33.0	46	30.5	73	49.7	161	37.4

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มีเพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟนมีร้อยละ 1 ที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักกันคุ้นเคย กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน และมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับบุคคลที่ขายบริการทางเพศไม่พบในรอบปีนี้

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัย พบว่า นักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด นักเรียนชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่านักเรียนหญิง และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้ถุงยางอนามัยในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ตาราง 3.15

เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย และการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย*	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเภทคู่นอน										
คูรัก/แฟน	40	90.9	82	92.1	149	98.7	139	95.2	410	95.3
คนที่รู้จักกันคุ้นเคย	0	0	5	5.6	-	-	-	-	5	1.2
คนที่รู้จักกันผิวเผิน	-	-	-	-	-	-	2	1.4	2	0.5
คนขายบริการทางเพศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพศเดียวกัน	1	2.3	1	1.1	2	1.3	2	1.4	6	1.4
ไม่ตอบ	3	6.8	1	1.1	-	-	3	2.1	7	1.5
การใช้ถุงยางอนามัย										
ใช้	22	53.7	58	65.9	74	49.0	74	51.7	228	53.0
ไม่ใช้	19	46.3	30	34.1	77	51.0	69	48.3	202	47.0

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา



เหตุผลของนักเรียนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย มีดังต่อไปนี้

เหตุผลที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย (หญิง)

กระทันหัน, เพราะเขาเป็นทอม, เพราะแฟนลืมหียบถุงยางมา,
เพราะไม่ได้เตรียมและไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น, เพราะรับประทานยาคุมกำเนิด, เพราะรู้สึกว่าจะไม่ยากใช้
และไม่มีใช้ ณ ตอนนั้น, เพราะว่ามันทำให้รู้สึกดีมากกว่า, เพศเดียวกัน,
แฟนบอกไม่สนุก, ไม่ทันและก็ได้ซื้อ, ไม่พร้อม, ไม่มั่ว, รีบ,
ลืมหืม ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น, ลืมซื้อและบรรยากาศพาไป, ไร้ใจ, ก็ปกติก็มีกันบ่อยอยู่แล้วและ
เห็นว่าไม่มี, กินยาคุม, กินยาแทน, ขี้เกียจซื้อ, เขาไม่ยอมใช้, คิดว่าคงไม่มีอะไร
คิดว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไร, คู่รักเป็นเพศเดียวกัน
เจอกันทุกวันเลยไร้ใจ, ฉีดยาคุม, เชื้อใจและไร้ใจ, ใช้แล้วไม่สนุก, เป็นเพศเดียวกัน
ฝ่ายชายไม่ยอมใส่, เพราะกินยาแทนการใช้ถุงยางอนามัย, เพราะความไร้หัวใจ
เพราะคู่รักเป็นเพศเดียวกัน, เพราะเป็นเพศเดียวกัน
เพราะเป็นเพศเดียว เลยไม่ใช้, เพราะมันไม่มัน, เพราะไม่ได้ซื้อ, เพราะไม่ได้เตรียมตัว
เพราะไม่มี, เพราะไม่มีเวลาไปซื้อ, เพราะรู้แนอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอะไร
เพราะรู้ว่าแฟนไม่มีใครนอกจากเราคนเดียว, เพราะว่า ในบ้านไม่มีถุงยาง
เพราะหนูเป็นดี, มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน
มีแฟนเป็นทอม, ไม่กล้าไปซื้อ, ไม่กล้าไปซื้อไม่มีเงิน ไม่ชอบ
ไม่ใช่เพราะว่าไม่มัน, ไม่ได้เกิดจากการสมยอมแต่ด้วยอารมณ์เท่านั้น, ไม่ได้คิดจะทำ, ไม่ได้ซื้อ
ไม่ได้ซื้อถุงยางมาเพราะถุงยางหมดแล้วขี้เกียจ
ไม่ได้เพศสัมพันธ์กับชาย, ไม่ทราบ, ไม่มี, ไม่มีตั้งซื้อ, ไม่มีถุงยาง, ไม่มีอะไร
ไม่รู้ ไม่ชอบ, รักในเพศเดียวกัน, ลืมซื้อ, ลืมซื้อ ไม่เงิน
ไร้ใจแฟน เพราะอยู่ด้วยกันตลอด, อยู่ด้วยกันทุกวัน,
หาที่ซื้อยาก, หาไม่ทัน, อารมณ์พาไป



เหตุผลที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย (ชาย)

จี้เกียจ, ช่วงเวลานั้นไม่มีใช้, ตอนที่แฟนไปซื้อเขาถามดูขนาด size
ใส่ไม่ได้ เพราะว่าตั้งแต่มีอะไรกันไม่ค่อยใช้, เพราะไว้ใจมากกว่า
ไม่จำเป็น, ไม่ชอบ, ไม่ได้คิด, ไม่ได้ซื้อ, ไม่ได้ตั้งตัว
ไม่ได้เตรียมตัว และหากดยาก อายด้วย, ไม่ได้เตรียมไว้, ไม่มันส์, ไม่มี, ไม่มีเงิน, ไม่มีตั้งค์
ซื้อไม่มีถุงยางอนามัย, ไม่มีเวลาซื้อ, ไม่รู้เหมือนกัน, ไม่สนุก, รีบ
ก็ไม่ชอบจี้, จี้เกียจหยิบ, คู่รักและตัวเองไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
คู่รักไม่มั่ว, ชั่วโง่งแรงด่วน, ชอบแบบสดๆ
ใช้ถุงยางแล้วไม่มัน, ถุงยางไม่มี, ถุงยางหมด, ถุงยางหมด, น่าไว้วางใจ, ผมไม่รู้ผมเมา
ผู้หญิงบอกว่า, เหมือนมีอะไรกับพลาสติก, เพราะ จี้เกียจใช้
เพราะมันสนุกดี, เพราะว่า แฟนของเราไม่ผ่านใครมาก่อนครับ, เพิ่มความไว้วางใจ
แฟน, มันดี, มันไม่เร้าใจ, มันไม่เสียว และ จี้เกียจไปซื้อเปรี๊ยะตั้งค์
ไม่กล้าซื้อ, ไม่กล้าไปซื้อ, ไม่ชอบ, ไม่ชอบใช้, ไม่ชอบ , เปลืองเงิน (ถุงยางมีราคาแพง)
ไม่ได้ซื้อ, ไม่ได้เตรียม, ไม่ได้พก, ไม่ได้ออกไปซื้อ, ไม่ทราบ, ไม่รู้
ไม่มี, ไม่มีเงินซื้อ, เปลืองตั้งค์
ไม่สะดวก, ไม่อยากใช้, ไม่อยากใส่
เร่งรีบ, ลืม, ไว้ใจคู่รัก, ไว้ใจเค้า และ ศึกษา ถามประวัติมา, ไว้วางใจแฟน
ใส่ลำบาก, หาไม่เจอ, หาไม่ทัน, อยู่กินมีลูกแล้ว





เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

การคิดสัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงิน/สิ่งของตอบแทนในส่วนนี้ คิดสัดส่วนจากนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ($n = 430$) นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน พบว่ามีประมาณร้อยละ 4 เท่านั้น นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 5.5, 2.1 ตามลำดับ) ส่วนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงิน

ตอบแทนมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ร้อยละ 5.3, 3.4 ตามลำดับ) มากกว่าครึ่งหนึ่งที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง นักเรียนชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 53.8, 50.0 ตามลำดับ) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ร้อยละ 42.9, 60.0 ตามลำดับ)

ตาราง 3.16 สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

เพศสัมพันธ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม (n = 429)	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แลกสิ่งของ/เงิน *										
เคย	3	6.8	4	4.5	1	0.7	9	6.2	17	4.0
ไม่เคย	41	93.2	85	95.5	149	99.3	137	93.8	412	96.0
ใช้ถุงยางอนามัย **										
ใช้ทุกครั้ง	2	66.7	1	25.0	0	0	6	66.7	9	52.9
บางครั้ง	1	33.3	2	50.0	0	0	1	11.1	4	23.5
ไม่ใช้เลย	0	0	1	25.0	1	100.0	2	22.2	44	23.5

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

** คิดสัดส่วนเฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์จากกลุ่มนักเรียนทั้งหมด พบว่า กลุ่มนักเรียนที่มีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 4 เท่านั้น นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก (ร้อยละ 3.8, 4.7 ตามลำดับ) ส่วนนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนมากกว่ากับนักเรียนมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 เล็กน้อย (ร้อยละ 5.6, 2.9 ตามลำดับ)

การปฏิบัติตนของนักเรียนในกลุ่มที่เคยมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ($n = 87$) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยปรึกษาเพื่อน ปรึกษากับผู้ปกครอง หรือญาติพี่น้อง และไปปรึกษาที่คลินิก ตามลำดับ

ตาราง 3.17 การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

อาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม (n = 429)	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมีอาการ	14	2.4	16	3.5	27	5.5	30	5.8	87	4.2
ไม่เคยมีอาการ	569	97.6	447	96.5	467	94.5	488	94.2	1,971	95.8
การปฏิบัติตน*										
ปรึกษาเพื่อน	2	14.3	4	25.0	5	19.2	7	25.0	18	21.4
ปรึกษาผู้ปกครอง/ ญาติพี่น้อง	5	35.7	4	25.0	2	7.7	9	32.1	20	23.8
ปรึกษาแฟน/คู่รัก	1	7.1	1	6.3	4	15.4	1	3.6	7	8.3
สถานบริการทางการแพทย์	1	7.1	2	12.5	9	34.6	4	14.3	16	19.0
ซื้อยามากินเอง	0	0	1	6.3	1	3.8	1	3.6	3	3.6
ไม่ได้ทำอะไรเลย	5	35.7	4	25.0	5	19.2	6	21.4	20	23.8

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



ปัญหาเรื่องเพศ

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในกลุ่มนักเรียน พบว่ามีนักเรียนที่เคยมีปัญหาเรื่องเพศในรอบปีที่ผ่านมาไม่มากนัก ประมาณร้อยละ 4 นักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการมีปัญหาเรื่องเพศน้อยกว่านักเรียนชาย (ร้อยละ 3.6 และ 5.0 ตามลำดับ) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีปัญหาเรื่องเพศในสัดส่วนที่น้อยกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ร้อยละ 2.9, 5.7 ตามลำดับ)

การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาเรื่องเพศเป็น

การวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เคยมีปัญหาเรื่องเพศเท่านั้น (n = 88) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ปรึกษากับครอบครัวเมื่อมีปัญหาในเรื่องเพศมากที่สุด รองลงมาปรึกษากับเพื่อน และปรึกษากับคู่รักหรือแฟนตามลำดับ มีนักเรียนประมาณ 5 ราย ที่มีปัญหาเรื่องเพศแล้วเก็บไว้คนเดียว และไม่ทราบว่า จะปรึกษากับใคร สำหรับคำตอบเกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นครู/อาจารย์ กับศูนย์ Hotline มีนักเรียนที่มีปัญหาทางเพศเลือกตอบคำตอบดังกล่าวเพียง 1-2 รายเท่านั้น

ตาราง 3.18 การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ปัญหาเรื่องเพศ	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม (n = 2,054)	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมี	13	2.2	17	3.7	26	5.3	32	6.2	88	4.3
การปฏิบัติตน*										
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ ญาติพี่น้อง	9	69.2	9	52.9	6	23.1	8	25.0	32	36.4
เพื่อน	1	7.7	3	17.6	12	46.2	8	25.0	24	27.3
แฟน/คู่รัก	1	7.7	1	5.9	-	-	3	9.4	1	1.1
หาหนังสืออ่านเอง	1	7.7	1	5.9	1	3.8	1	3.1	13	14.8
เก็บไว้คนเดียว	1	7.7	3	17.6	-	-	1	3.1	5	5.7
Hotline	-	-	-	-	1	3.8	1	3.1	2	2.3
ไม่ทราบจะปรึกษาใคร	-	-	-	-	1	3.8	5	15.6	6	6.8

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยมีปัญหาเรื่องเพศ

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนประมาณร้อยละ 6 หรือมีจำนวน 127 ราย ไปตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนชายมีส่วนของการไปตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 8.7, 3.9 ตามลำดับ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีส่วนของการไปตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา น้อยกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ร้อยละ 5.7, 6.6 ตามลำดับ)

สำหรับกลุ่มนักเรียนที่เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี พบว่ามีนักเรียนประมาณร้อยละ 14 ที่ไม่ทราบผลการตรวจเลือดในกลุ่มนักเรียนหญิงที่ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี มีส่วนของการไม่ทราบผลการตรวจเลือดน้อยกว่านักเรียนชาย (ร้อยละ 9.5, 15.5 ตามลำดับ) สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีส่วนการไม่ทราบผลการตรวจเลือดเท่ากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 13.6, 13.3 ตามลำดับ)

ตาราง 3.19 การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

การตรวจเลือด เพื่อหาเชื้อเอชไอวี	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ตรวจเลือด										
ตรวจ	22	3.8	38	8.2	20	4.1	47	9.1	127	6.2
ไม่ตรวจ	560	96.2	425	91.8	473	95.9	471	90.9	929	93.8
ทราบผลการตรวจ*										
ทราบ	21	95.5	31	81.6	17	85.0	40	87.0	109	86.5
ไม่ทราบ	1	4.5	7	18.4	3	15.0	6	13.0	17	13.5

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา



พฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

สัดส่วนของนักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ในกลุ่มนักเรียนชายมีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิงเกือบเท่าตัว (ร้อยละ 64.5, 47.3 ตามลำดับ) และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มากกว่ากลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 63.8, 47.4 ตามลำดับ)

ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่แล้ว ร้อยละ 87.2 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

เป็นบางครั้งบางคราวมีนักเรียนร้อยละ 2.5 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน มีนักเรียนประมาณร้อยละ 10 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ค่อนข้างบ่อย นักเรียนชายมีสัดส่วนของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ และทุกวันมากกว่านักเรียนหญิง ส่วนนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำและทุกวัน ในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับปริมาณของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกวัน พบว่านักเรียนกลุ่มนี้ดื่มมากที่สุด 5 แก้วต่อวัน (ค่าเฉลี่ย ประมาณ 1-2 แก้วต่อวัน)

ตาราง 3.20 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

การดื่มเครื่องดื่ม* ที่มีแอลกอฮอล์	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	211	36.2	285	61.6	298	60.3	348	67.2	1,142	55.5
ความถี่										
ทุกวัน	-	-	2	0.7	5	1.7	22	6.3	29	2.5
2-3 ครั้ง/สัปดาห์	8	3.8	25	8.8	12	4.0	41	11.8	86	7.5
สัปดาห์ละครั้ง	3	1.4	8	2.8	7	2.4	12	3.4	30	2.6
แล้วแต่โอกาส	98	46.7	110	38.6	136	45.8	157	45.1	501	43.9
นานๆ ครั้ง	101	48.1	140	49.1	137	46.1	116	33.3	494	43.3

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด

พฤติกรรมการใช้สารเสพติดที่เป็นประเภทผิดกฎหมาย เช่น กัญชา/ยาบ้า เฮโรอีน/โคเคน หรืออื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนประมาณร้อยละ 10 เคยเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนชายมีสัดส่วนการเสพยาเสพติดมากกว่านักเรียนหญิงประมาณ 4 เท่า (ร้อยละ 16.1, 3.7 ตามลำดับ) และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนการเสพยาเสพติดมากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประมาณ 2 เท่า (ร้อยละ 13.0, 6.3 ตามลำดับ)

ความถี่ของการเสพยาเสพติดของกลุ่มนักเรียนที่เคยเสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นการทดลองเสพยาเสพติดประมาณ 1 ใน 3 เสพยาเสพติดแล้วแต่โอกาส มีจำนวน 13 รายที่เสพยาเสพติดทุกวัน สำหรับการเสพยาเสพติดโดยวิธีการฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ มีประมาณ ร้อยละ 1 หรือจำนวน 2 รายของนักเรียนที่เคยเสพยาเสพติดทั้งหมด

ตาราง 3.21 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และความถี่ในการใช้สารเสพติดของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

พฤติกรรม การใช้สารเสพติด	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยเสพยาเสพติด	6	1.0	60	13.0	34	6.9	98	18.9	198	9.6
ความถี่*										
ทุกวัน	1	16.7	5	8.3	1	3.0	6	6.1	13	6.6
แล้วแต่โอกาส	2	33.3	6	10.0	6	18.2	29	29.6	43	21.8
ทดลองเสพ	3	50.0	49	81.7	26	78.8	63	64.3	141	71.6
เคยเสพยาเสพติดโดย ใช้เข็มฉีดยา**	1	16.7	-	-	-	-	1	1.0	2	1.0

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยเสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา

** คัดสัดส่วนในกลุ่มนักเรียนทั้งหมด



เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และใช้สารเสพติด

เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในส่วนนี้คิดสัดส่วนเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ($n = 138$) พบว่านักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีประมาณร้อยละ 12 นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มแอลกอฮอล์ไม่แตกต่างกันมากนัก

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (คิดสัดส่วนในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เท่านั้น) พบว่า มีเพียงร้อยละ 24 ที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กลุ่มนักเรียนชาย มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการ

ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งใกล้เคียงกับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดในส่วนนี้คิดสัดส่วนเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมา และมีการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ($n = 29$) พบว่า นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนักระหว่างนักเรียนชาย-หญิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดไม่แตกต่างกันกับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ามีสัดส่วนไม่มากนัก คือ ร้อยละ 20 ในกลุ่มนักเรียนหญิงที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ($n = 7$ ราย) ไม่มีใครใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอ (ทุกครั้ง) เลย สำหรับในกลุ่มนักเรียนชาย มีเพียง 6 รายเท่านั้นที่มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเลย ส่วนนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง (สม่ำเสมอ) จำนวน 6 ราย

ตาราง 3.23 การมีเพศสัมพันธ์หลังการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ และหลังเสพยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

เพศสัมพันธ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมีเพศสัมพันธ์หลัง ดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์* (n =1,140)	7	3.3	28	9.8	45	15.2	58	16.7	138	12.1
การใช้ถุงยางอนามัย**										
ทุกครั้ง	1	14.3	9	32.1	9	19.6	15	25.4	34	24.3
บางครั้ง	4	57.1	12	42.9	12	26.1	23	39.0	51	36.4
ไม่ใช้เลย	2	28.6	7	25.0	25	54.3	21	35.6	55	39.3
เคยมีเพศสัมพันธ์หลัง เสพยาเสพติด*** (n = 196)	2	33.3	4	6.7	4	12.1	19	19.6	29	14.8
การใช้ถุงยางอนามัย****										
ทุกครั้ง	-	-	-	-	-	-	6	31.8	6	20.7
บางครั้ง	1	50.0	2	50.0	2	50.0	5	26.3	10	34.5
ไม่ใช้เลย	1	50.0	2	50.0	2	50.0	8	42.1	13	44.8

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ใน 1 เดือนที่ผ่านมา และเคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

** เฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์

*** เฉพาะนักเรียนที่เคยเสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา และเคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

**** เฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด

4

กลุ่มประชากร ทั่วไป



การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2553 เป็นรอบที่ 3 (สำรวจครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และสำรวจครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2551) การสำรวจในรอบนี้ ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2553

พื้นที่ที่ทำการสำรวจข้อมูลในรอบปี พ.ศ. 2553 เป็นพื้นที่ที่ได้ทำการสำรวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2551 เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะของการสุ่มเลือกพื้นที่ มีหลายขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร มาจำนวน 20 ศูนย์ จาก 68 ศูนย์ (เป็นการสุ่มไว้ในรอบที่แล้ว)

ขั้นตอนที่ 2 สุ่มเลือก 1 ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เป็นตัวอย่างมาจำนวน 2 ชุมชน

ขั้นตอนที่ 3 สุ่มเลือกประชากรทั่วไปที่อยู่ในชุมชนตัวอย่าง ชุมชนละ 30 ราย โดยเป็นเพศหญิง-เพศชายอย่างละครึ่งๆ กัน มีอายุอยู่ระหว่าง 15-49 ปี และอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในส่วนนี้อาสาสมัครของชุมชนในแต่ละชุมชนมีส่วนช่วยในการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามที่ทีมวิจัยได้ทำการสุ่มเลือกไว้แล้ว

การตอบแบบสอบถาม เป็นการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ นักวิจัยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบด้วยความเป็นอิสระ ยกเว้นมีปัญหาคำถามหรือข้อสงสัย นักวิจัยจะเข้าไปช่วยอธิบายและให้ความมั่นใจว่าคำตอบจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคล แต่จะนำเสนอข้อมูลในภาพรวมๆ เท่านั้น

กลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2553 มีจำนวนทั้งหมด 1,005 ราย เป็นเพศชาย 510 ราย และเป็นเพศหญิง 495 ราย

ตาราง 4.1 พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ศูนย์บริการสาธารณสุข	เขต	ชุมชน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ	ราชเทวี	ซอยเพชรบุรี 7, ซอยสวนเงิน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์	พญาไท	ประดิพัทธ์ 15, ประดิพัทธ์ 11
ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี	ปทุมวัน	ร่วมฤดี, กุหลาบแดง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง	ดุสิต	สวนอ้อย, สุพันธ์าราม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์	ธนบุรี	วัดใหญ่ศรีสุพรรณ, วัดประดิษฐาราม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุนนาค	บางนา	ข้างธานินทร์, ตรงข้ามธานินทร์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย	คลองเตย	70 ไร่, ล็อก 456
ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เดชะสัมพันธ์	ยานนาวา	วัดช่องลม, คลองขวาง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทน์ ริมโอบุส	ธนบุรี	ปากคลองบางสะแก, วัดกันตะ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทน์เที่ยง เนตรวิเศษ	บางคอแหลม	บางคอแหลม, วัดจันทน์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล	บางคอแหลม	โรงแก้ว, วัดไผ่เงิน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พิกุลม	ราชบุรีบูรณะ	รุ่งอรุณ, ศาลารวมใจพัฒนา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง	บางซื่อ	วัดเชิงหวาย, วัดเลียบ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน	จตุจักร	ไปรษณีย์ 65, ลำสละ 2
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม	บางกอกน้อย	วัดสุวรรณาราม, ตลาดเช้า
ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัตนุทิศ	ลาดกระบัง	เคหะนคร, ประชาธรรมใจ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค	บางแค	เจริญแพทย์, เกษตรรุ่งเรือง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก	บางกะปิ	วังโสม, ลำสำลี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 ปิงกุม	ปิงกุม	คลองกุ่มนิเวศน์, นวกานต์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 49วัดชัยพฤกษ์มาลา	ตลิ่งชัน	วัดช้างเหล็ก, วัดชัยพฤกษ์มาลา

ข้อมูลทั่วไป

การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมของคนในชุมชนในรอบปี พ.ศ. 2553 ได้กำหนดผู้ตอบแบบสอบถามให้มีสัดส่วนเพศหญิง-เพศชายในจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละชุมชนที่ทำการสำรวจ รวมทั้งได้กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 15-49 ปี

อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามในรอบปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 32.3 ปี มีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 10.7 เพศหญิงและเพศชายมีอายุเฉลี่ยเท่ากัน

เมื่อวิเคราะห์เป็นกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่ทำการสำรวจมีสัดส่วนอายุในแต่ละกลุ่มเกือบเท่าๆ กัน ประมาณ 1 ใน 4 ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี (กลุ่มเยาวชน) เมื่อวิเคราะห์กลุ่มอายุจำแนกตามเพศ พบว่าแต่ละกลุ่มมีสัดส่วนเพศหญิง-เพศชายเท่าๆ กัน



ตาราง 4.2 อายุของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ

อายุ	หญิง (n = 493)		ชาย (n = 509)		รวม (n = 1,002)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
15 – 19 ปี	64	13.0	81	15.9	145	14.5
20 – 24 ปี	68	13.8	62	12.2	130	13.0
25 – 29 ปี	75	15.2	71	13.9	146	14.6
30 – 34 ปี	69	14.0	84	16.5	153	15.3
35 – 39 ปี	66	13.4	67	13.2	133	13.3
40 – 44 ปี	85	17.2	72	14.1	157	15.7
45 – 49 ปี	66	13.4	72	14.1	138	13.8
ค่าเฉลี่ย	32.3		31.9		32.1	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	10.0		10.0		10.7	

ภูมิสำเนาของกลุ่มประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่าคนส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นคนที่เกิดในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล มีประมาณร้อยละ 18 ที่เกิดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เหลือเกิดใน

ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ภูมิสำเนาของกลุ่มประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน จำแนกตามเพศหญิง – เพศชายแล้ว พบว่า มีภูมิสำเนาไม่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค

ตาราง 4.3 ภูมิสำเนาของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ

ภูมิสำเนา	หญิง (n = 493)		ชาย (n = 508)		รวม (n = 1,001)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล	318	64.5	329	64.8	647	64.6
ภาคกลาง	47	9.5	47	9.3	94	9.4
ภาคเหนือ	28	5.7	24	4.7	52	5.2
ภาคใต้	20	4.1	11	2.2	31	3.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	80	16.2	97	19.1	177	17.7

ตาราง 4.4 ระยะเวลา (ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มประชากรทั่วไป

ระยะเวลา	เฉลี่ย	ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน
อาศัยในกรุงเทพมหานคร	23.8	12.5
อาศัยในชุมชน	23.4	19.6
โดยภาพรวม	23.6	12.6

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าคนในชุมชนมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยประมาณ 24 ปี สำหรับคนในชุมชนเป็นเพศหญิงมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่ากับเพศชาย

กลุ่มประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่แล้วจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาคือ ประถมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าตามลำดับ

ส่วนผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยมีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นเมื่อวิเคราะห์คนในชุมชนจำแนกตามเพศแล้ว พบว่าเพศหญิง – เพศชายมีสัดส่วนการศึกษาในแต่ละระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

ตาราง 4.5 การศึกษาของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ

ระดับการศึกษา	หญิง (n = 488)		ชาย (n = 506)		รวม (n = 994)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้เรียนหนังสือ	7	1.4	10	2.0	17	1.7
ประถมศึกษา	124	25.4	140	27.7	264	26.6
มัธยมศึกษา	184	37.7	196	38.7	380	38.2
ประกาศนียบัตร	88	18.0	94	18.6	182	18.3
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า	85	17.4	66	13.0	151	15.2

สถานภาพสมรสในกลุ่มประชากรทั่วไปส่วนใหญ่แล้วแต่งงานและอยู่กินด้วยกัน รองลงมาคือ เป็นโสดแต่เคยมีเพศสัมพันธ์ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ตามเพศแล้วจะพบว่าเพศชายมีสถานภาพสมรสที่แต่งงาน

และอยู่กินด้วยกันในสัดส่วนที่น้อยกว่าเพศหญิง สำหรับสถานภาพเป็นโสดแต่เคยมีเพศสัมพันธ์เพศชายจะมีสัดส่วนมากกว่าเพศหญิง



ตาราง 4.6 สถานภาพสมรสของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ

สถานภาพสมรส	หญิง (n = 488)		ชาย (n = 506)		รวม (n = 994)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โสดและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	111	22.7	101	20.0	212	21.3
โสด แต่เคยมีเพศสัมพันธ์	35	7.2	95	18.8	130	13.1
แต่งงานและอยู่กินด้วยกัน	219	44.9	193	38.1	412	41.4
อยู่กินด้วยกันเฉยๆ โดยไม่ได้แต่งงาน	87	17.8	94	18.6	181	18.2
หย่าหรือแยกทางกัน	29	5.9	19	3.8	48	4.8
หม้ายหรือคู่ที่เคยอยู่ด้วยกันตายไปแล้ว	7	1.4	4	0.8	11	1.1

การประกอบอาชีพของกลุ่มประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ รองลงมาไม่ได้ประกอบอาชีพนอกบ้าน (พ่อบ้าน/แม่บ้าน) รวมทั้งมีสถานภาพเป็นนักเรียน มีร้อยละ 24 ประกอบอาชีพส่วนตัว และอีกร้อยละ 15 ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นรายวัน มีผู้ที่ประกอบอาชีพรับราชการร้อยละ 5

เมื่อวิเคราะห์จำแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงประมาณ 1 ใน 3 ไม่ได้ประกอบอาชีพ รวมทั้งนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขาย และเป็นพนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ ส่วนในเพศชายประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการเป็นส่วนใหญ่

ตาราง 4.7 อาชีพของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

การประกอบอาชีพ	หญิง (n = 488)		ชาย (n = 506)		รวม (n = 994)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/นักเรียน	161	33.0	107	21.1	268	27.0
รับราชการ	23	4.7	25	4.9	48	4.8
พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ	127	26.0	161	31.8	288	29.0
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	123	25.2	115	22.7	238	23.9
รับจ้างรายวัน	54	11.1	98	19.4	152	15.3

รายได้ต่อเดือนของคนในชุมชนโดย รายได้ต่อเดือนที่ต่ำสุดคือ 1,200 บาทต่อเดือน
ประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน ผู้หญิงมีรายได้ และมีผู้มีรายได้สูงสุดคือ 100,000 บาทต่อเดือน
ต่อเดือนโดยประมาณใกล้เคียงกันกับเพศชาย

ตาราง 4.8 รายได้ต่อเดือนของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบแบบสอบถาม
จำแนกตามเพศ

รายได้ต่อเดือน	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่า หรือเท่ากับค่ามัธยฐาน 1,200 – 8,000 บาท	180	36.4	174	34.1	354	35.2
มากกว่าค่ามัธยฐาน 8,001 – 100,000 บาท	315	63.6	336	65.9	651	64.8
มัธยฐาน (บาท)	8,000		8,000		8,000	
รายได้ต่ำสุด (บาท)	1,500		1,200		1,200	
รายได้สูงสุด (บาท)	100,000		100,000		100,000	

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

จากการสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ จำนวน 5 ข้อ พบว่าคนในชุมชนสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้มากที่สุด รองลงมาคือ การมีคู่นอนคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี และการรับประทานอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้ ตามลำดับ ส่วน

ความรู้เกี่ยวกับ “ยุ่งเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวี” คนในชุมชนตอบได้ถูกน้อยที่สุด ในกลุ่มหญิง – กลุ่มชายมีสัดส่วนของความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละข้อ

กลุ่มประชากรทั่วไป ร้อยละ 34 สามารถตอบคำถามได้ถูกทั้ง 5 ข้อ โดยผู้หญิงสามารถตอบคำถามได้ถูกทั้ง 5 ข้อ มีสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มผู้ชายเล็กน้อยเท่านั้น



ตาราง 4.9 ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง

ข้อที่	ความรู้เรื่องเอดส์	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	การใช้ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้	449	90.7	448	87.8	897	89.3
2	การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีและคู่นอนนั้นไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	406	82.0	378	74.1	784	78.0
3	บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้	368	74.3	351	68.8	719	71.5
	ยุ่งเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้	302	61.0	321	62.9	623	62.0
5	กินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	344	69.5	364	71.4	708	70.4
ตอบถูกทุกข้อ		172	34.7	172	33.7	344	34.2

เมื่อวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของคนในชุมชนที่สามารถตอบได้ถูกทุกข้อ จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่มีอายุน้อย (กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี) สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อน้อยกว่ากลุ่มอายุที่มากกว่าอย่างชัดเจน

กลุ่มอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อมากกว่า ร้อยละ 40 ยกเว้นกลุ่มอายุ 40 – 44 ปี ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ถูกทุกข้อ ร้อยละ 34

ตาราง 4.10 ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง จำแนกตามกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ	จำนวน	ตอบถูกทุกข้อ	
		จำนวน	ร้อยละ
15 – 19 ปี	145	32	22.1
20 – 24 ปี	130	30	23.1
25 – 29 ปี	146	47	32.2
30 – 34 ปี	153	63	41.2
35 – 39 ปี	133	61	45.9
40 – 44 ปี	157	53	33.8
45 – 49 ปี	138	58	42.0

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

จากการสำรวจพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน พบว่ากลุ่มที่เคยมี
เพศสัมพันธ์มี ร้อยละ 76 เพศหญิงเคยมี
เพศสัมพันธ์น้อยกว่าเพศชายเล็กน้อย ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมทางเพศจะไม่นับรวมกลุ่ม
คนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ($n = 760$)

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีร้อยละ 4 ที่เป็นผู้ที่มี
เพศเดียวกัน เพศชายมีสัดส่วนที่มี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับเพศเดียวกันมากกว่า
กลุ่มผู้หญิง

คนในชุมชน ร้อยละ 2 (จำนวน 16 คน)
ที่มีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกเป็นการถูกบังคับ
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชายมากกว่ากลุ่มผู้หญิง ส่วน
การถูกชักชวน/ถูกร้องขอโดยที่ไม่ยินยอม หรือ
สมัครใจผู้หญิงจะมีสัดส่วนมากกว่าผู้ชาย
เล็กน้อย

สำหรับคู่นอนของคนในชุมชน เมื่อมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคู่รัก

รองลงมา คือ เพื่อน คนที่รู้จักกันผ่านทาง
โทรศัพท์/Internet และคนที่เพิ่งพบกัน
ครั้งแรก ตามลำดับ การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่
ขายบริการทางเพศมีเพียง 1 รายเท่านั้นเมื่อ
วิเคราะห์คู่นอนครั้งแรกจำแนกตามเพศ พบว่า
ในกลุ่มเพศหญิงเกือบทั้งหมดมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรกกับแฟนหรือคู่รัก ส่วนในกลุ่มเพศชาย
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่รักหรือแฟน
ประมาณ 2 ใน 3 ร้อยละ 12 มีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรกกับเพื่อน หรืออีก ประมาณร้อยละ 8
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงที่รู้จักกันผ่าน
Internet/โทรศัพท์ ร้อยละ 6 มีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรกกับผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักกัน และมีจำนวน
1 ราย มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขาย
บริการทางเพศ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเพศชาย
ประมาณ 1 ใน 3 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่รักหรือแฟน สำหรับกลุ่ม
ผู้หญิงมีร้อยละ 5 ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับ
ผู้ชายอื่นๆ ที่ไม่ใช่คู่รัก



ตาราง 4.11 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	หญิง (n = 364)		ชาย (n = 396)		รวม (n = 760)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรก						
ต่างเพศ	323	97.3	344	95.3	667	96.2
เพศเดียวกัน	9	2.7	17	4.7	26	3.8
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก						
ถูกขืนใจ/ข่มขืน	5	1.4	11	2.8	16	2.1
ถูกชักชวน/ถูกร้องขอโดยไม่ยินยอม	17	4.7	10	2.6	27	3.6
สมัครใจ	339	93.9	370	94.6	709	94.3
คู่นอนครั้งแรก						
คู่รัก/แฟน	341	94.5	297	75.0	638	84.3
เพื่อนหรือกิ๊ก	7	1.9	46	11.6	53	7.0
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	10	2.8	22	5.6	32	4.2
คนที่รู้จักกันผ่าน Internet/โทรศัพท์	3	0.8	30	7.6	33	4.4
ผู้ขายบริการทางเพศ	-	-	1	0.3	1	0.1

อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของคนในชุมชน พบว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 20 ปี เพศหญิงจะมีอายุโดยเฉลี่ยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย อายุที่น้อยที่สุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในกลุ่มเพศชาย คือ อายุ 11 ปี และอายุ 12 ปี ในกลุ่มเพศหญิง

เมื่อวิเคราะห์อายุเป็นกลุ่ม พบว่ามีร้อยละ 4 ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี โดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อย่างไรก็ตามคนในชุมชนครึ่งหนึ่ง แล้วมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุระหว่าง 15-19 ปี และอีกประมาณ 1 ใน 3 มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุระหว่าง 20-24 ปี

ตาราง 4.12 อายุของการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ

อายุเมื่อมี เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	หญิง (n = 399)		ชาย (n = 381)		รวม (n = 720)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
11 – 14 ปี	6	1.8	19	5.0	25	3.5
15 – 19 ปี	147	43.4	211	55.4	358	49.7
20 – 24 ปี	125	36.9	108	28.3	233	32.4
25 – 29 ปี	39	11.5	32	8.4	71	9.9
30 – 34 ปี	14	4.1	5	1.3	19	2.6
35 – 39 ปี	7	2.1	5	1.3	12	1.7
40 – 44 ปี	1	0.3	1	0.3	2	0.3
ค่าเฉลี่ย	20.8		19.3		20.0	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	4.8		4.3		4.6	
Min	12		11		11	
Max	40		42		42	

การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพศชายใช้ถุงยางอนามัยในสัดส่วนที่สูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย เมื่อวิเคราะห์การใช้ถุงยางอนามัย

จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าในกลุ่มที่มีอายุน้อยระหว่าง 15-19 ปี และกลุ่มที่มีอายุมากระหว่าง 45 – 49 ปี มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ



ตาราง 4.13 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก

คุณลักษณะ	จำนวน	การใช้ถุงยางอนามัย	
		จำนวน	ร้อยละ
เพศ			
หญิง	353	157	44.5
ชาย	393	185	47.1
รวม	746	342	45.8
อายุ			
15 – 19 ปี	40	30	8.8
20 – 24 ปี	86	55	16.1
25 – 29 ปี	118	70	20.5
30 – 34 ปี	125	53	15.5
35 – 39 ปี	114	53	15.5
40 – 44 ปี	141	48	14.1
45 – 49 ปี	121	32	9.4

เหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยครั้งแรกมีดังต่อไปนี้

เป็นสามี แฟน แต่งงาน, ไม่รู้จัก, ยังไม่ค่อยรู้ , เป็นสามีของเรา,
มีเพศสัมพันธ์กับสามี, รักเดียวใจเดียว, พร้อมมีบุตร, กินยาคุม, ทำหมัน, คุมธรรมชาติ,
ฉีดยาคุม, แต่งงานตรวจเลือดแล้ว, ไม่ทันคิด, ไม่จำเป็น,
ไม่สนใจ, ไว้ใจ, ไม่ใช่, ยังไม่ค่อยรู้, แฟนรัก, อยู่ด้วยกันมานานแล้ว, ไม่รู้ว่าเป็นโรคภัย,
ยังเด็กอยู่, ไม่ชอบ, ไม่มี, ไม่รู้, อยากมีบุตร,
แฟนไม่ได้เที่ยว, เป็นแฟน, ไว้ใจสามี, เชื่อใจแฟน, คิดว่าปลอดภัย,
ตอนนั้นไม่มีเอดส์ ไม่มีอะไร, เพื่อบริสุทธิ์

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์สัดส่วนของคนในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา คิดเฉพาะคนในชุมชนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา เท่านั้นไม่นับรวมคนเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงมีจำนวนของคนในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีเท่ากับ 669 ราย เป็นเพศชายจำนวน 350 ราย และเพศหญิงจำนวน 319 ราย

จำนวนคู่นอนของคนในชุมชนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าในภาพรวมโดยเฉลี่ยประมาณ

1 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 84 มีคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมาเพียง 1 คน ร้อยละ 10 มีคู่นอนมากกว่า 1 คนและมีผู้ไม่ตอบจำนวนคู่นอนจำนวน 41 ราย เมื่อวิเคราะห์จำนวนคู่นอนจำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุแล้วพบว่าผู้ชายมีคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมาจำนวนมากกว่า 1 รายในสัดส่วนที่มากกว่าผู้หญิง และคนที่มีอายุน้อยมีจำนวนคู่นอนมากกว่า 1 คนในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มคนที่มีความอายุน้อยกว่าอย่างชัดเจน

ตาราง 4.14 สัดส่วนของคนในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

ลักษณะประชากร	จำนวน	จำนวนคู่นอน					
		1 คน		มากกว่า 1 คนขึ้นไป		ไม่ตอบ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพศ							
หญิง	319	288	90.3	15	4.7	16	5.0
ชาย	350	272	77.7	53	15.1	25	7.1
อายุ							
15 – 24 ปี	116	92	79.3	18	15.5	6	5.2
25 – 34 ปี	224	182	81.3	30	13.4	12	5.4
35 ปีขึ้นไป	329	286	86.9	20	6.1	23	7.0

ประเภทของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94) มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นคู่อุปถัมภ์หรือแฟน มีประมาณร้อยละ 14 มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับเพื่อนหรือกิ๊ก ประมาณร้อยละ 11 มีเพศสัมพันธ์กับคนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก และ

อีกร้อยละ 5 มีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักกันทาง Internet/โทรศัพท์ และคนที่ขายบริการทางเพศเมื่อวิเคราะห์จำแนกตามเพศแล้ว พบว่าเพศชาย มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่คู่อุปถัมภ์/แฟน ในสัดส่วนที่มากกว่าเพศหญิง



ตาราง 4.15 ประเภทของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

ประเภทของคู่นอน	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คูรัก/แฟน	301	94.4	325	93.1	626	93.7
เพื่อน/กิ๊ก	23	7.2	73	20.9	96	14.4
บุคคลที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	19	6.0	53	15.2	72	10.8
คนที่รู้จักกันผ่านInternet/โทรศัพท์	6	1.9	26	7.4	32	4.8
ผู้ขายบริการทางเพศ	5	1.6	27	7.7	32	4.8

เมื่อวิเคราะห์จำนวนของประเภทคู่นอน ทั้ง 5 ประเภท พบว่าในภาพรวมกลุ่มคนในชุมชน ส่วนใหญ่รายงานว่า ตนเองมีคู่นอนประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียวเป็นกลุ่มผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัดเจน

ในกลุ่มผู้ชายนั้นมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลมากกว่า 1 ประเภท มากถึง 1 ใน 3 ในขณะที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลมากกว่า 1 ประเภทมากกว่ากลุ่มผู้หญิงประมาณ 2 เท่า

ตาราง 4.16 จำนวนของประเภทคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

จำนวนของประเภทคู่นอน	หญิง (n = 319)		ชาย (n = 350)		รวม (n = 669)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวน 1 ประเภท	264	82.6	233	66.6	497	74.3
มากกว่า 1 ประเภท	55	17.2	117	33.4	172	25.7

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ พบว่าคนในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการทางเพศ และคนที่รู้จักกันผ่านทาง Internet/โทรศัพท์มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงมากที่สุด

รองลงมาคือ คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก เพื่อน/กิ๊ก ส่วนบุคคลที่เป็นคูรักหรือแฟน มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามจะพบว่าสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งยังมีสัดส่วนไม่สูงมากนัก

ตาราง 4.17 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ

ประเภทคู่นอน	จำนวน	การใช้ถุงยางอนามัย							
		ทุกครั้ง		บางครั้ง		ไม่ใช่เลย		ไม่ตอบ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คู่อรัก/แฟน	626	96	15.3	138	22.0	369	58.9	23	3.7
เพื่อน/กิ๊ก	96	39	40.6	32	33.3	23	24.0	2	2.1
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	72	32	44.4	15	20.8	22	30.6	3	4.2
คนที่รู้จักกันผ่าน Internet/โทรศัพท์	32	17	53.1	7	21.9	6	18.8	2	6.3
ผู้ขายบริการทางเพศ	32	17	53.1	11	34.4	3	9.4	1	3.1

การวิเคราะห์สัดส่วนของการใช้ถุงยาง- น้อยกว่าในกลุ่มเพศชาย การใช้ถุงยางอนามัย
อนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนก ทุกครั้ง กับคู่นอนที่เป็นคู่อรักหรือแฟน มีสัดส่วน
ตามเพศ พบว่าในกลุ่มเพศหญิงมีสัดส่วนการ น้อยกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ อย่างชัดเจน
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนทุกประเภท

ตาราง 4.18 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ

คู่เพศสัมพันธ์	ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง			
	หญิง		ชาย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คู่อรัก/แฟน	40	13.3	56	17.2
เพื่อน/กิ๊ก	8	34.8	31	42.5
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	6	31.6	26	49.1
คนที่รู้จักกันผ่าน Internet/โทรศัพท์	2	40.0	15	55.6
ผู้ขายบริการทางเพศ	2	33.3	15	57.5



เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย

เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย พบว่าส่วนใหญ่คนในชุมชนมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับคูรักหรือแฟน มีเพียงร้อยละ 8 ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับบุคคลอื่น เมื่อวิเคราะห์ประเภทของกลุ่มเพศชายมีเพศสัมพันธ์ในครั้งสุดท้ายกับคูรักหรือแฟนในสัดส่วนที่น้อยกว่า

กลุ่มเพศหญิง ในขณะที่กลุ่มเพศหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับคู่นอนอื่นๆ ร้อยละ 5

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้าย พบว่าในภาพรวมมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยประมาณร้อยละ 31 ในกลุ่มเพศชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่ากลุ่มเพศหญิงอย่างชัดเจน

ตาราง 4.19 การมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย จำแนกตามเพศ

ประเภทของคู่นอน*	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คูรัก/แฟน	304	95.3	307	88.0	611	91.5
เพื่อน/กิ๊ก	4	1.3	16	4.6	20	3.0
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	1	0.3	3	0.9	4	0.6
คนที่รู้จักกันผ่านInternet/โทรศัพท์	-	-	6	1.7	6	0.9
ผู้ขายบริการทางเพศ	5	1.6	11	3.2	16	2.4
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	89	27.9	119	34.0	208	31.1

หมายเหตุ * มีผู้ไม่ตอบคำถามนี้ จำนวน 11 ราย ร้อยละ 1.6

เหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดมีดังต่อไปนี้

เป็นสามี, เป็นภรรยา, นอนกับแฟน, คู่รัก, เป็นแม่ของลูก, ยังไม่ค่อยรู้,
มีคู่นอนเพียงคนเดียว, สามีคนเดียว, อยู่ด้วยกันมานานแล้ว, ต้องการมีบุตร, คุณกำเนิดแล้ว,
กินยาคุม, ฉีดยาคุม, คุมธรรมชาติ, ทำหมัน
แต่งงานตรวจเลือดแล้ว, ไม่ทันคิด, ไม่สนใจ, ไม่ชอบ, ไม่ชิน, แฟนรัก, ไม่มี
ไวใจสามี, เชื่อใจแฟน, คิดว่าปลอดภัย, แฟนไม่ได้เที่ยว, ไม่รู้ว่าเป็นโรคร้าย, ไม่จำเป็น,
ยังเด็กอยู่, ตอนนั้นไม่มีเอดส์, ไม่มีอะไร
เปิดบริษัท, หลังข้างนอก, สมัยใจ. เป็นเมียเพื่อน

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือ ผ่านมา
เงินตอบแทน พบว่าในภาพรวมแล้ว มีสัดส่วน สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุก
ของคนในชุมชนมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับ ครั้งค่อนข้างน้อย มีจำนวน 6 ราย จาก
สิ่งของ หรือเงินตอบแทนเพียงร้อยละ 4 ทั้งหมด 25 ราย
หรือจำนวน 25 คน ที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่

ตาราง 4.20 การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนในภาพรวม
จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์เพื่อ แลกสิ่งของหรือเงินตอบแทน	หญิง (n = 319)		ชาย (n = 349)		รวม (n = 668)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคย	4	1.3	21	6.0	25	3.7
ไม่เคยมี	307	96.2	325	93.1	632	94.6
ไม่ตอบ	8	2.5	3	0.9	11	1.6
การใช้ถุงยางอนามัย						
ทุกครั้ง	-	-	6	28.6	6	24.0
บางครั้ง	1	25.0	10	47.6	11	44.0
ไม่ใช้เลย	1	25.0	3	14.3	4	16.0
ไม่ตอบ	2	50.0	2	9.5	4	16.0



อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ปัสสาวะแสบขัด มีแผลที่อวัยวะเพศ หรือมีหนองไหลจากอวัยวะเพศ พบว่าในภาพรวมมีเพียงร้อยละ 7 โดยเพศชาย มีสัดส่วนของอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่าเพศหญิง

สำหรับการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการผิดปกติ พบว่าในภาพรวมส่วนใหญ่ไปรักษาอาการผิดปกติที่สถานพยาบาล รองลงมาคือปรึกษากับเพื่อน/ญาติ แฟน หรือคู่รัก ซ้ำๆ มารับประทานเอง ตามลำดับ สำหรับการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการผิดปกติในกลุ่มผู้หญิง-ผู้ชายไม่แตกต่างกันมากนัก

ตาราง 4.21 การมีอาการผิดปกติ และการปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ

อาการผิดปกติ	หญิง (n = 319)		ชาย (n = 349)		รวม (n = 668)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมี	17	5.3	29	8.3	46	6.9
การปฏิบัติ*						
ปรึกษาเพื่อน/ญาติที่น้อง/ แฟน/คู่รัก	5	29.4	7	24.1	12	26.1
ซื้อยามากินเอง	3	17.6	8	27.6	11	23.9
ไปรักษาตามคลินิกหรือ สถานพยาบาล	6	35.3	9	31.0	15	32.6
ไม่ได้ทำอะไรเลย	1	5.9	3	10.3	4	8.7
อื่นๆ	1	5.9	-	-	1	2.2
ไม่ตอบ	1	5.9	2	6.9	3	6.5

* คิดสัดส่วนเฉพาะคนที่เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าคนในชุมชนมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 30 เพศหญิงมีสัดส่วนของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่าเพศชาย

ในกลุ่มคนที่เคยเจาะเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา (n = 297) พบว่า

มีประมาณร้อยละ 5 ที่ไม่ทราบผลการตรวจเลือด อย่างไรก็ตามมีผู้ไม่ตอบคำถามค่อนข้างสูงคือ ร้อยละ 12 ผู้ที่ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่าร้อยละ 90 สนใจที่จะตรวจเลือดประมาณร้อยละ 4 ที่ถูกขอร้องให้ตรวจ และมีเพียง 1 ราย ที่ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีโดยไม่สนใจ

ตาราง 4.22 การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี จำแนกตามเพศ

การตรวจเลือด	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 509)		รวม (n = 1,004)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การตรวจเลือด						
เคย	157	31.7	140	27.5	297	29.6
ไม่เคย	328	66.3	362	71.1	690	68.7
ไม่ตอบ	10	2.0	7	1.4	17	1.7
ผลการตรวจเลือด*						
ทราบ	138	87.9	110	78.6	248	83.5
ไม่ทราบ	4	2.5	10	7.1	14	4.7
ไม่ตอบ	15	9.6	20	14.3	35	11.8
ความสนใจ*						
สนใจ	152	96.8	120	85.7	272	91.6
ถูกขอร้อง	1	0.6	10	7.1	11	3.7
ไม่สนใจ	1	0.6	-	-	1	0.3
ไม่ตอบ	3	1.9	10	7.1	13	4.4

* คิดสัดส่วนเฉพาะคนที่เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของคนในชุมชนในรอบ 1 เดือนพบว่า ครึ่งหนึ่งมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยเพศชายมีส่วนของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมามากกว่าเพศหญิง

พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีคนในชุมชนร้อยละ 7 ที่มีการเสพติดที่ผิดกฎหมาย เช่น การเสพยาบ้า เฮโรอีน กัญชา โคเคน เป็นต้น เพศชายมีการเสพติดมากกว่ากลุ่มเพศหญิงประมาณ 4 เท่า



ตาราง 4.23 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการเสพสารเสพติด จำแนกตามเพศ

พฤติกรรมการดื่ม และการเสพสารเสพติด	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 510)		รวม (n = 1,005)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา)						
ดื่ม	198	40.0	311	61.0	509	50.6
ไม่ดื่ม	297	60.0	199	39.0	496	49.4
เสพสารเสพติด (ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา)						
เคยเสพ	14	2.8	60	11.8	74	7.4
ไม่เคยเสพ	481	97.2	450	88.2	931	92.6

เมื่อวิเคราะห์ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของกลุ่มคนในชุมชน พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในทุกวัน ร้อยละ 12 มีร้อยละ 17 ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์เป็นประจำ (2-3 ครั้งต่อสัปดาห์/สัปดาห์ละครั้ง) เพศชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกวัน และดื่มเป็นประจำในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มเพศหญิง

ตาราง 4.24 ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำแนกตามเพศ

ความถี่	เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์					
	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทุกวัน	5	2.5	55	17.7	60	11.8
2-3 ครั้ง/สัปดาห์	15	7.6	73	23.5	88	17.3
แล้วแต่โอกาส	91	46.0	101	32.5	192	37.7
นานๆ ครั้ง/ทดลองเสพ	87	43.9	82	26.4	169	33.2

เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่าคน ส่วนใหญ่ (ประมาณ 2 ใน 3) จะดื่มเครื่องดื่มที่

มีแอลกอฮอล์กับเพื่อน และพบเช่นเดียวกันกับพฤติกรรมเสพสารเสพติด ส่วนใหญ่แล้วจะเสพกับกลุ่มเพื่อน

ตาราง 4.25 ลักษณะการตี๋มเครื่องตี๋มที่มีแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพตี๋ด
จำแนกตามเพศ

พฤติกรรมการตี๋ม และเสพสารเสพตี๋ด	แอลกอฮอล์				ยาเสพตี๋ด			
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คนเดียว	11	5.6	57	18.3	-	-	11	18.3
คู่รัก/แฟน	30	15.2	11	3.5	2	14.3	-	-
เพื่อน	146	73.7	223	71.7	8	57.1	33	55.0
ไม่ตอบ	11	5.6	20	6.4	4	28.6	16	26.7

ประเภทของสารเสพตี๋ดที่คนในชุมชน
เสพกันมากที่สุดคือ กัญชาหรือกระท่อม
และบาราอู ร่องลงมาคือ ยาบ้า และยาไอซ์
ตามลำดับส่วนยาเสพตี๋ดชนิดอื่นๆ มีสัดส่วน
การเสพไม่มากนัก โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า

คนในชุมชน มีการเสพสารเสพตี๋ดประเภท
บาราอูมากกว่าประเภทอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะเป็น
สารเสพตี๋ดที่เฟื่องรู้จักกันได้ไม่นาน แต่ก็เป็นที่
นิยมเสพกันอย่างรวดเร็ว

ตาราง 4.26 พฤติกรรมการตี๋มเครื่องตี๋มที่มีแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพตี๋ด

สารเสพตี๋ด (ในรอบ 12 เดือน)	หญิง (n = 14)		ชาย (n = 60)		รวม (n = 74)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กัญชา หรือกระท่อม	4	0.8	36	7.1	40	4.0
ยาบ้า	6	1.2	31	6.1	37	3.7
เฮโรอีน	2	0.4	3	0.6	5	0.5
โคเคน	2	0.4	2	0.4	4	0.4
ยาอี/ยาเส้น	1	0.2	8	1.6	9	0.9
กาว/ทินเนอร์	2	0.4	6	1.2	8	0.8
ยาไอซ์/ยากล่อมประสาท	4	0.8	15	2.9	19	1.9
บาราอู	9	1.8	32	6.3	41	4.1



คนในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีมากกว่าครึ่งหนึ่ง (คิดสัดส่วนในกลุ่มที่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) เพศชายมีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มเพศหญิง

การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่าการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพียงร้อยละ 24 เท่านั้น เพศชายมีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย

ตาราง 4.27 การมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ การใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ

พฤติกรรมทางเพศ	หญิง (n = 198)		ชาย (n = 311)		รวม (n = 509)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	81	40.9	206	66.2	287	56.4
การใช้ถุงยางอนามัย						
ทุกครั้ง	18	22.2	51	24.8	69	24.0
บางครั้ง	17	21.0	59	28.6	76	26.5
ไม่ใช้เลย	42	51.9	90	43.7	132	46.0
ไม่ตอบ	4	4.9	6	2.9	10	3.4

การมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีสัดส่วนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คือ ประมาณร้อยละ 38 เพศหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดน้อยกว่าในกลุ่มเพศชาย

เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ามีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยมาร้อยละ 4 เท่านั้น หรือมีจำนวน 1 รายที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

ตาราง 4.28 การมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด และการใช้ถุงยางอนามัย
จำแนกตามเพศ

พฤติกรรมทางเพศ	หญิง (n = 14)		ชาย (n = 60)		รวม (n = 74)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	4	28.6	24	40.0	28	37.8
การใช้ถุงยางอนามัย						
ทุกครั้ง	1	25.0	-	-	1	3.6
บางครั้ง	-	-	5	20.8	5	17.9
ไม่ใช้เลย	3	75.0	17	70.8	20	71.4
ไม่ตอบ	-	-	2	8.3	2	7.1

การเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ (ในส่วนนี้ไม่ได้จำกัดกรอบเวลาว่าเป็นการเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำในรอบปีที่ผ่านมา) พบว่ามีคนในชุมชนจำนวน 9 ราย หรือประมาณร้อยละ 1 ที่เคยเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ ในจำนวน 9 รายเป็นเพศชายเสียเป็นส่วนใหญ่ มีเพศหญิง จำนวน 2 ราย

ในจำนวน 9 รายที่เคยเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ พบว่ามีการเริ่มเสพยา

เสพติดโดยวิธีดังกล่าวในช่วงอายุที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล อายุที่เริ่มเสพยาเสพติดโดยวิธีการฉีดน้อยที่สุดเท่ากับ 12 ปี เท่านั้น

มีผู้ใช้อุปกรณ์ในการฉีดสารเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำ ร่วมกับบุคคลอื่น จำนวน 5 ราย จากจำนวนทั้งหมด 9 ราย และในจำนวน 5 รายนี้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนนำมาใช้ จำนวน 1 รายเท่านั้น อีกจำนวน 4 รายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีไม่สูงมาก



ตาราง 4.29 การเสพยาเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำของกลุ่มประชากรทั่วไป

การเสพยาเสพติด โดยการฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ	หญิง (n = 495)		ชาย (n = 509)		รวม (n = 1,004)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยเสพยาเสพติดโดยการฉีดเข้า เส้นโลหิตดำ	2	0.4	7	1.4	9	0.9
อายุ*						
12 ปี	-	-	1	14.3	1	11.1
13 ปี	-	-	1	14.3	1	11.1
17 ปี	1	50.0	-	-	1	11.1
18 ปี	-	-	2	28.6	2	22.2
19 ปี	1	50.0	-	-	1	11.1
20 ปี	-	-	1	14.3	1	11.1
ไม่ตอบ	-	-	2	28.6	2	22.2
มีการใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น (n= 9)	2	100.0	3	42.9	5	55.6
ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้ง**	1	50.0	-	-	1	20.0

หมายเหตุ: * คัดสรรส่วนเฉพาะกลุ่มที่เคยเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ

** คัดสรรส่วนเฉพาะกลุ่มที่เคยเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำและใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น

5

กลุ่มพนักงานใน สถานประกอบการ



การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการในปี พ.ศ. 2553 เป็นการสำรวจในรอบที่ 6

พื้นที่ในการสำรวจในปี พ.ศ.2553 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่บริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่

ชั้นในกรุงเทพมหานคร นอกจากสถานประกอบการจะมีขนาดเล็กแล้ว ยังให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย ดังนั้นสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในรอบปี พ.ศ. 2553 จึงมีจำนวนไม่มากนัก โดยคัดเลือกเฉพาะสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่ในเขตที่เป็นพื้นที่ตัวอย่างและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ

ตาราง 5.1 พื้นที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูล

โซน	ลักษณะพื้นที่	เขตพื้นที่ในแต่ละโซน	เขตที่สุ่มเลือกได้	สถานประกอบการ
1	เขตเศรษฐกิจใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รองรับการขยายตัวของย่าน CBD เดิม และวงแหวนอุตสาหกรรม	คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา พระโขนง บางนา	บางนา	บริษัท แพรนด้า จิวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2	เขตอนุรักษ์เมืองเก่ากรุงธนบุรี แหล่งวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม และแหล่งท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม	ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย คลองสาน บางพลัด	คลองสาน บางพลัด	บริษัท ลีลาพงศ์ จำกัด, บริษัท เกสซ์กรรม ศรีประสิทธิ์ จำกัด
3	เขตศูนย์ชุมชนชานเมืองรองรับ สนามบินสุวรรณภูมิ	ลาดกระบัง มีนบุรี ประเวศ	มีนบุรี ลาดกระบัง	บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด, บริษัท เนสท์เล่ จำกัด, บริษัท เจอาร์ เอพแอนด์มี จำกัด

ตาราง 5.1 พื้นที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ)

โซน	ลักษณะพื้นที่	เขตพื้นที่ใน แต่ละโซน	เขตที่ สุ่มเลือกได้	สถานประกอบการ
4	เขตเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดี ผสมผสานพื้นที่เกษตรกรรม	ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางแค หนองแขม	ตลิ่งชัน หนองแขม	บริษัท นันยาง จำกัด
5	เขตเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยู่ อาศัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ	บางขุนเทียน	บริษัทเคเอชทีเคซีไทย จำกัด บริษัท อินเตอร์ รับเบอร์ พาร์ท

การสุ่มสถานประกอบการใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ในขั้นตอนแรกผู้วิจัยสุ่มเลือกเขตจำนวน 6 เขต จากนั้นสุ่มเลือกสถานประกอบการที่อยู่ในแต่ละเขตมาจำนวน 1 สถานประกอบการ แล้วทำการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจำนวน 200 ราย โดยสุ่มเลือกกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการทั้งเพศหญิง และเพศชาย ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน ในบางครั้งเมื่อสุ่มเลือกสถานประกอบการได้แล้ว แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เช่น มีพนักงานจำนวนน้อย หรือมีพนักงานที่เป็นเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น หรือทางสถานประกอบการไม่สะดวกในวัน/เวลาดังกล่าว ก็ต้องมีการสุ่มเลือกสถานประกอบการตัวอย่างหลายครั้ง

การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการในปี พ.ศ. 2553 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ประสานงานกับ

สำนักงานเขตพื้นที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดย มีเจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ประสานงานกับสถานประกอบการให้กับนักวิจัย รวมทั้งลงเก็บข้อมูลร่วมกันกับนักวิจัยด้วยทุกครั้ง

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป็นผู้ที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยทั้งหมด ก่อนที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง นักวิจัยได้อธิบายวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือกับผู้ตอบแบบสอบถามให้ตอบตามความเป็นจริง รวมทั้งให้ตอบทุกข้อคำถาม โดยรับรองว่าคำตอบที่ได้จะไม่มีการนำไปเปิดเผยเป็นรายบุคคล หรือรายสถานประกอบการเด็ดขาด

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 1,070 ราย จากทั้งหมด 10 สถานประกอบการ เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ผลการสำรวจข้อมูลจะนำเสนอเป็น 3 ส่วน คือ

1. ข้อมูลลักษณะประชากร
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
3. ข้อมูลด้านพฤติกรรม



ข้อมูลลักษณะประชากร

กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในสถานประกอบการในรอบปี พ.ศ. 2553 เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 31 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 8 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 49 ปี และอายุน้อยที่สุดเท่ากับ 17 ปี เพศหญิงและชาย มีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.5 และ 30.7 ตามลำดับ)

ตาราง 5.2 ลักษณะประชากรของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ

ข้อมูลทั่วไป	หญิง (n = 604)		ชาย (n = 466)		รวม (n = 1,070)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สถานประกอบการ						
หนองแขม	105	17.4	123	26.4	228	21.3
บางขุนเทียน	133	22.0	63	13.5	196	18.3
คลองสาน	85	14.1	62	13.3	147	13.7
มีนบุรี	111	18.4	117	25.1	228	21.3
ลาดกระบัง	93	15.4	39	8.4	132	12.3
บางนา	77	12.7	82	13.3	139	13.0
อายุเฉลี่ย = 31.1 SD = 8.1 อายุต่ำสุด = 17 อายุสูงสุด = 49						
17 – 24 ปี	155	25.8	120	26.4	275	26.0
25-39 ปี	320	53.2	201	57.4	581	55.0
40-49 ปี	126	21.0	74	16.3	200	18.9

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) ของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ พบว่าส่วนใหญ่มีภูมิลำเนามาจากจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาเป็นคนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วน

พนักงานในสถานประกอบการที่มีภูมิลำเนาในภาคกลาง และภาคเหนือ มีประมาณร้อยละ 14 และ 12 ตามลำดับ และพนักงานในสถานประกอบการที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ มีสัดส่วนน้อยมาก

ตาราง 5.3 ภูมิสำเนาของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ

ภูมิสำเนา	หญิง (n = 593)		ชาย (n = 453)		รวม (n = 1,046)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร/ ปริมณฑล	156	26.3	94	20.8	250	23.9
ภาคกลาง	84	14.2	60	13.2	144	13.8
ภาคเหนือ	73	12.3	55	12.1	128	12.2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	254	42.8	223	49.2	477	45.6
ภาคใต้	26	4.4	21	4.6	47	4.5

ระยะเวลาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ พบว่าในภาพรวมกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการจะอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ค่ามัธยฐานประมาณ 12 ปี

กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่เป็นเพศหญิงเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร นานกว่าพนักงานในสถานประกอบการที่เป็นเพศชาย (Median=14, 10 ตามลำดับ)

ตาราง 5.4 ระยะเวลา(ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครของ
กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ

ระยะเวลาที่เข้ามาอาศัยใน กรุงเทพมหานคร	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
0-5 ปี	136	22.5	116	24.9	252	23.6
6-15 ปี	166	27.5	156	33.5	322	30.1
16-30 ปี	204	33.8	129	27.7	333	31.1
มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป	98	16.2	65	13.9	163	15.2



กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่จบการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 1 ใน 5 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และอีกประมาณ 1 ใน 5 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาคือ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีประมาณร้อยละ 8, 11.0 ตามลำดับกลุ่มพนักงานชายในสถานประกอบการจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากกว่ากลุ่มพนักงานหญิง กลุ่มพนักงานหญิงมีสัดส่วนการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มพนักงานชายประมาณ 1 เท่าตัว

ตาราง 5.5 ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ

ระดับการศึกษา	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	125	21.0	76	16.5	201	19.1
มัธยมศึกษา	214	36.0	235	51.1	449	42.6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	47	7.9	37	8.0	84	8.0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	63	10.6	53	11.5	116	11.0
ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี	145	24.4	59	12.8	204	19.4

สถานภาพสมรสของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่แล้ว พบว่าแต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคู่ของตนเอง ส่วนสถานภาพสมรสโดยอยู่ร่วมกันกับคู่โดยที่ไม่ได้แต่งงานกัน เป็นโสดและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นโสดและเคยมีเพศสัมพันธ์มีสัดส่วนที่

ใกล้เคียงกัน ส่วนพนักงานที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยก ประมาณร้อยละ 7 เมื่อวิเคราะห์กลุ่มพนักงานหญิง พบว่ามีสถานภาพสมรสแต่งงาน และอยู่ร่วมกัน มีสถานภาพที่เป็นโสด และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มพนักงานชาย

ตาราง 5.6 สถานภาพสมรสของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ

สถานภาพสมรส	หญิง (n = 599)		ชาย (n = 457)		รวม (n = 1,056)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โสด และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	141	23.5	42	9.2	183	17.3
โสด และเคยมีเพศสัมพันธ์	66	11.0	106	23.2	172	16.3
แต่งงานและอยู่กินด้วยกัน	269	44.9	202	44.2	471	44.6
อยู่กินด้วยกันเฉยๆ โดยไม่แต่งงาน	69	11.5	86	18.8	155	14.7
หย่า/แยก	47	7.8	21	4.6	68	6.4
หม้าย	7	1.2	-	-	7	0.7

ลักษณะการอยู่ร่วมกันของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่มีคูครอง (ทั้งแต่งงานและไม่ได้แต่งงาน) พบว่าพนักงานในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่มีคูครองอยู่ร่วมกันทุกวัน พนักงานในสถานประกอบการที่มีคูครอง และอยู่ร่วมกันเป็นบางครั้งบางคราว

มีประมาณร้อยละ 13 และที่เหลืออยู่ร่วมกันกับคูครองเฉพาะวันหยุดสัปดาห์ เมื่อวิเคราะห์กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศชาย - เพศหญิง จะพบว่ามีส่วนของการอยู่ร่วมกันของคูครองไม่ต่างกัน

ตาราง 5.7 ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคูครองในกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ

การอยู่ร่วมกัน	หญิง (n = 584)		ชาย (n = 459)		รวม (n = 1,043)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทุกวัน	318	54.5	265	57.7	583	55.9
เฉพาะวันหยุด	29	5.0	24	5.2	53	5.1
เป็นบางครั้งบางคราว	63	10.8	71	15.5	134	12.8
ไม่มีคู่รักในปัจจุบัน	174	29.8	99	21.6	273	26.2

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานทั่วไปของสถานประกอบการ มีประมาณ ร้อยละ 12 ที่เป็นหัวหน้างาน/แผนก และตำแหน่งอื่นๆ มีสัดส่วนไม่มากนัก ส่วน

รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยประมาณ คือ 8,000 บาทต่อเดือน กลุ่มพนักงานหญิง-ชาย มีรายได้ในแต่ละเดือนไม่แตกต่างกันมากนัก



ตาราง 5.8 ตำแหน่งของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม
จำแนกตามเพศ

ตำแหน่ง	หญิง (n = 588)		ชาย (n = 456)		รวม(n = 1,044)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พนักงานทั่วไป	490	83.3	379	83.1	869	83.2
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	4	0.7	12	2.6	16	1.5
หัวหน้าแผนก	79	13.4	45	9.9	124	11.9
นักวิชาการ	1	0.2	4	0.9	5	0.5
ผู้จัดการ	5	0.9	7	1.5	12	1.1
อื่นๆ	9	1.5	9	2.0	18	1.7
รายได้ต่อเดือน (ค่ามัธยฐาน)	8,000		8,000		8,000	
Percentile 25	3,520		6,600		6,600	
Percentile 75	12,000		8,000		8,000	

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

จากการสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ จำนวน 5 ข้อ พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92) สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้ถูกต้องมากที่สุด รองลงมาคือ ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี และคู่นอนนั้นไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้ กินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้ และยุ่งเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้ ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์แยกเพศ

หญิง - เพศชาย จะพบว่ากลุ่มพนักงานเพศหญิง มีสัดส่วนที่ตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี และคู่นอนนั้นไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และในเรื่องบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้มากกว่ากลุ่มพนักงานชาย ส่วนกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อมีประมาณ 1 ใน 3 โดยเพศชายมีสัดส่วนของการตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อใกล้เคียงกับกลุ่มเพศหญิง

ตาราง 5.9 ร้อยละของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง จำแนกตามเพศ

ข้อ	ความรู้เรื่องเอดส์	หญิง (n = 604)		ชาย (n = 466)		รวม (n = 1,070)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	การใช้ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้	555	91.9	425	91.2	980	91.6
2	การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี และคู่นอนนั้นไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	497	82.3	358	76.8	855	79.9
3	บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้	479	79.3	364	78.1	843	78.8
4	ยุ่งเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้	375	62.1	307	65.9	682	63.7
5	กินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	437	72.4	353	75.8	790	73.8
ตอบถูกทุกข้อ		226	37.4	177	38.0	403	37.7

เมื่อวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่มีอายุน้อยระหว่าง 25-39 ปี เป็นกลุ่มที่ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน กลุ่มอายุ 40 ปี ขึ้นไป ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อประมาณร้อยละ 22 ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่สามารถตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้

ถูกต้องในสัดส่วนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 16

เมื่อวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกลุ่มที่เคยกับกลุ่มไม่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน พบว่ากลุ่มผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้ว สามารถตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ประมาณ 4 เท่า



ตาราง 5.10 ร้อยละของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ จำแนกตามอายุและประสบการณ์ทางเพศ

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	จำนวน	ตอบถูกทุกข้อ	
		จำนวน	ร้อยละ
กลุ่มอายุ			
17 – 24 ปี	275	63	15.7
25 – 39 ปี	581	250	62.3
40 – 49 ปี	200	88	21.9
ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์			
เคย	873	333	82.6
ไม่เคย	197	70	17.4

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเคยมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้วเป็นส่วนใหญ่ ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน (n = 873) พบว่าส่วนใหญ่แล้ว (ร้อยละ 93) มีเพศสัมพันธ์โดยการสัมผัสใจ มีประมาณร้อยละ 3 ที่มีเพศสัมพันธ์

โดยการถูกบังคับและอีกร้อยละ 4 มีเพศสัมพันธ์โดยถูกชักชวน เมื่อวิเคราะห์กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศหญิง-เพศชาย พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่มีเพศสัมพันธ์ โดยการถูกบังคับ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย และคู่นอนครั้งแรกเป็นคนที่มิเพศเดียวกันร้อยละ 4

ตาราง 5.11 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์	หญิง (n =604)		ชาย (n =466)		รวม (n =1,070)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์						
เคยมี	458	75.8	415	89.1	873	81.6
ไม่เคยมี	146	24.2	51	10.9	197	18.4

ตาราง 5.11 ประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามเพศ (ต่อ)

เพศสัมพันธ์	หญิง (n =604)		ชาย (n =466)		รวม (n =1,070)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก						
ถูกขืนใจ/ข่มขืน	19	4.2	8	2.0	27	3.1
ถูกชักชวน	25	5.5	10	2.4	35	4.0
สมัครใจ	412	90.4	392	95.6	804	92.8
คู่เพศ						
ต่างเพศ	429	98.2	375	94.0	804	96.2
เพศเดียวกัน	8	1.8	24	6.0	32	3.8

คู่นอนครั้งแรกของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87) มีเพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟน รองลงมาเป็นเพื่อนหรือกิ๊ก บุคคลที่รู้จักกันครั้งแรก และบุคคลที่ขายบริการทางเพศ ตามลำดับ ส่วนการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักกันทาง internet/โทรศัพท์ มีเพียงจำนวน 3 รายเท่านั้น เมื่อวิเคราะห์กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ เพศหญิงและ

เพศชาย พบว่าเพศหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟน เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 96) ส่วนกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชาย มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟน ร้อยละ 76 กับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนหรือกิ๊ก ร้อยละ 11 สำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขายบริการทางเพศและกับผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักกัน มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือประมาณร้อยละ 6

ตาราง 5.12 ประเภทของคูเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามเพศ

ประเภทคู่นอน	หญิง (n = 457)		ชาย (n = 413)		รวม (n = 874)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คูรัก/แฟน	439	96.1	315	76.3	754	86.7
เพื่อนหรือกิ๊ก	5	1.1	47	11.4	52	6.0
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	12	2.6	26	6.3	38	4.4
คนที่รู้จักกันผ่าน internet/โทรศัพท์	1	0.2	2	0.5	3	0.4
ผู้ขายบริการทางเพศ	0	0	23	5.6	24	2.6



อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่แล้ว (ร้อยละ 47) มีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 15 – 19 ปี มีกลุ่มพนักงานในสถาน

ประกอบการที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เมื่ออายุต่ำกว่า 15 ปี ประมาณร้อยละ 5 และมีร้อยละ 3 ที่มีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี

ตาราง 5.13 อายุของการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ

อายุ	หญิง (n = 439)		ชาย (n = 389)		รวม (n = 828)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
10 – 14 ปี	4	0.9	33	8.5	37	4.5
15 – 19 ปี	145	33.0	239	61.4	384	46.4
20 – 24 ปี	209	47.6	87	22.4	296	35.7
25 – 29 ปี	60	13.7	24	6.2	84	10.1
30 – 34 ปี	16	3.6	5	1.3	21	2.5
35 – 39 ปี	5	1.1	1	0.3	6	0.7
ค่าเฉลี่ย	21.2		18.4		19.9	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	3.91		3.53		3.98	
อายุน้อยสุด	13		10		10	
อายุมากที่สุด	38		35		38	

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีร้อยละ 40 หรือประมาณ 2 ใน 5 ของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก แล้วมี

การใช้ถุงยางอนามัย กลุ่มพนักงานเพศชาย มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่ากลุ่มพนักงานเพศหญิง

ตาราง 5.14 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

การใช้ถุงยางอนามัย	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ใช้	163	36.1	185	44.6	348	40.1
ไม่ใช้	289	63.9	230	55.4	519	59.9

เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของการใช้ถุงยาง-
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจำแนก
ตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มพนักงานในสถาน-
ประกอบการที่มีอายุระหว่าง 25-39 ปี มี
สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยในครั้งแรกสูงกว่า

กลุ่มอื่นๆอย่างชัดเจน กลุ่มที่มีอายุ 17-24 ปี
มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยในครั้งแรก
รองลงมา ส่วนกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 40 ปี
ขึ้นไป มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งแรก
น้อยที่สุด

ตาราง 5.15 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
จำแนกตามอายุ

กลุ่มอายุ	จำนวน	ใช้ถุงยางอนามัย	
		จำนวน	ร้อยละ
17 - 24 ปี	200	96	27.7
25 - 39 ปี	492	210	60.7
40 - 49 ปี	169	40	11.6



เหตุผลของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก มีรายละเอียดดังนี้

ไม่ใช่, ไม่ตอบ, ไม่มีเหตุผล, ไม่บอก, มีกับสามี, แต่งงานแล้ว, เป็นแฟน, ยังไม่ค่อยรู้, ไม่รู้จัก, ไม่เคยเห็น, แฟนไม่เคยนอนกับคนอื่น, ทั้งสองไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น
 เชื้อใจแฟน, เต็มใจและไว้วางใจ, มั่นใจ, ทำงานที่เดียวกัน,
 ศึกษากันมา, รักเดียวใจเดียว, อยู่ด้วยกันมานาน, อยากมีลูก, ต้องการมีบุตร
 คุณกำเนิดแล้ว, กินยาคุมกำเนิดแล้ว, คุมธรรมชาติ, ทำหมัน, ตรวจเลือดแล้ว,
 พบแพทย์แล้ว, ตรวจเลือดทุกปี, ไม่ได้เตรียมพร้อม, จุกเงิน, รีบ, ไม่เตรียมตัว, ไม่ทัน,
 ไม่ได้ตั้งใจ, เกะกะ, ไม่สนใจ, ไม่เข้าใจ, ไม่ชอบ, ไม่ สนุก
 โดนข่มขืนโดยไม่สมัครใจ, ไม่มี, แฟนไม่ใช่, ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเอดส์
 ยังไม่รู้จักความเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวี, ไม่เคยใช้, ตอนนั้นไม่มีเอดส์,
 แฟนไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน, ซิงๆ, คินส่งตัววิวาร์, รู้ว่าบริสุทธิ์, ครั้งแรกทั้งสองคน
 เป็นครั้งแรก, แพ้สารหล่อลื่น

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ($n = 873$) พบว่ามีประมาณ ร้อยละ 9 ที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และในจำนวนนี้จะไม่นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปี มีจำนวน 794 ราย เป็นเพศชาย 380 ราย และเป็นเพศหญิง 414 ราย

จำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมาของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ พบว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 1 คน ผู้ที่มีคู่นอนมากที่สุดเท่ากับ 32 คน จำนวน 1 คน และมีคู่นอน

20 คน จำนวน 1 คน (ไม่ได้นำมาวิเคราะห์ในส่วนนี้) เพศหญิงมีสัดส่วนของจำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่า 1 คนขึ้นไปน้อยกว่าเพศชาย

เมื่อวิเคราะห์จำนวนคู่นอนตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่มีอายุอยู่ในช่วง 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่มีคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่า 1 คนขึ้นไป มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป มีคู่นอนมากกว่า 1 คนขึ้นไป ร้อยละ 21 ส่วนในกลุ่มอายุ 25-39 ปี มีคู่นอนมากกว่า 1 คนขึ้นไป ร้อยละ 14

ตาราง 5.16 จำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ

ลักษณะประชากร	จำนวน	จำนวนคู่นอนในรอบปี			
		1 คน		มากกว่า 1 คนขึ้นไป	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพศ					
หญิง	415	370	89.2	45	10.8
ชาย	370	263	71.1	107	28.9
อายุ					
15 – 24 ปี	184	125	67.9	59	32.1
25 – 39 ปี	446	384	86.1	62	13.9
45 ปีขึ้นไป	151	120	79.5	31	20.5
ค่าเฉลี่ย		1.20		0.95	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.70		1.70	

ประเภทของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเกือบทั้งหมดมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีกับคู่นอนที่เป็นคนรักหรือแฟนของตนเอง มีประมาณร้อยละ 17 มีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนหรือกิ๊ก ประมาณร้อยละ 10 ที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่เพิ่งรู้จักกันครั้งแรก กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่มี

เพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการทางเพศ ประมาณร้อยละ 5 และมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักกันทาง internet/โทรศัพท์ ร้อยละ 4 กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมากับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่คู่อรักหรือแฟน มากกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงค่อนข้างชัดเจน

ตาราง 5.17 ประเภทของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

ประเภทของคู่นอน*	หญิง (n = 414)		ชาย (n = 380)		รวม (n = 794)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คู่อรัก/แฟน	408	98.6	365	96.1	713	97.4
เพื่อนหรือกิ๊ก	25	6.0	107	28.2	132	16.6
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	20	4.8	57	15.0	77	9.7
คนที่รู้จักกันผ่าน internet/โทรศัพท์	8	1.9	23	6.1	31	3.9
ผู้ขายบริการทางเพศ	8	1.9	28	7.4	36	4.5

หมายเหตุ * คัดสรรเฉพาะบุคคลที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา (n = 794)



สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับ รู้จักกันครั้งแรก คู่นอนที่เป็นเพื่อนหรือกิ๊กและ คู่นอนประเภทต่างๆ พบว่ากลุ่มพนักงานใน คู่นอนที่เป็นคูรักหรือแฟน ตามลำดับ สถานประกอบการมีการใช้ถุงยางอนามัย อย่างไรก็ตามมีผู้ที่ไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับการ ใช้ถุงยางอนามัยค่อนข้างมาก คือ อยู่ระหว่าง ทุกครั้งกับคู่นอนประเภทที่เป็นผู้ขายบริการ ใช้ถุงยางอนามัยค่อนข้างมาก คือ อยู่ระหว่าง ทางเพศมากที่สุด รองลงมาคือกับคู่นอนที่ ร้อยละ 8-26 รู้จักกันทาง Internet/โทรศัพท์ คู่นอนที่เพิ่ง-

ตาราง 5.18 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ

ประเภทคู่นอน*	จำนวน	การใช้ถุงยางอนามัย							
		ทุกครั้ง		บางครั้ง		ไม่ใช้เลย		ไม่ตอบ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คูรัก/แฟน	773	96	12.4	189	24.5	429	55.5	59	7.6
เพื่อนหรือกิ๊ก	132	42	31.8	45	34.1	32	24.2	13	9.8
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	77	25	32.5	19	24.7	20	26.0	13	16.9
คนที่รู้จักกันผ่าน internet/โทรศัพท์	31	12	38.7	5	16.1	6	19.4	8	25.8
ผู้ขายบริการทางเพศ	36	16	44.4	11	30.6	-	-	9	25.0

หมายเหตุ * คัดสัดส่วนเฉพาะบุคคลที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา (n = 794)

เมื่อวิเคราะห์การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง จำแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มพนักงานใน สถานประกอบการหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับ ผู้ชายที่รู้จักกันทาง internet/โทรศัพท์ มีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ กับเพื่อนผู้ชายหรือกิ๊ก ส่วนกลุ่มที่มี เพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟน มีสัดส่วนการ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยที่สุด ในขณะที่ กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชายที่มี

เพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศมีสัดส่วน การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ รู้จักกันทาง internet/โทรศัพท์ กับผู้หญิงที่ รู้จักกันครั้งแรก กับเพื่อนหรือกิ๊ก ตามลำดับ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มพนักงานในสถาน ประกอบการทั้งหญิง-ชายมีสัดส่วนการใช้ ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนที่ไม่ใช่คูรัก หรือแฟน (คู่นอนไม่ประจำ) มากกว่าคู่นอนที่ เป็นคูรักหรือแฟน (คู่นอนประจำ)

ตาราง 5.19 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ

ประเภทคู่นอน	การใช้ถุงยางอนามัย *											
	หญิง (n =408)						ชาย (n =365)					
	ทุกครั้ง		บางครั้ง		ไม่ใช้เลย		ทุกครั้ง		บางครั้ง		ไม่ใช้เลย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คูรัก/แฟน	46	11.3	94	3.0	236	57.8	50	13.7	95	26.0	193	52.9
เพื่อนหรือกิ๊ก	4	16.0	6	24.0	10	40.0	38	35.5	39	36.4	22	20.6
คนที่เพิ่งพบกัน ครั้งแรก	2	10.0	4	20.0	8	40.0	23	40.4	15	26.3	12	21.1
คนที่รู้จักกัน ผ่าน internet/ โทรศัพท์	2	25.0	2	25.0	-	-	10	43.5	3	13.0	6	26.1
ผู้ขายบริการ ทางเพศ	1	12.5	2	25.0	-	-	15	53.6	9	32.1	-	-

หมายเหตุ : * ไม่แสดงร้อยละของผู้ที่ไม่ตอบคำถามนี้

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

สำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94) มีเพศสัมพันธ์กับคูรัก/แฟน มีประมาณร้อยละ 4 ที่มีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนหรือกิ๊ก ที่เหลือประมาณร้อยละ 1 ที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เพิ่งรู้จักกันครั้งแรก ผู้ที่ขายบริการทางเพศ และบุคคลที่รู้จักกันทาง internet/โทรศัพท์ ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ประเภทคู่นอนในครั้งล่าสุด จำแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงเกือบทั้งหมดมีเพศสัมพันธ์

กับคูรักหรือแฟน ในขณะที่กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชายมีร้อยละ 90 ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟน อีกร้อยละ 10 ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับบุคคลอื่นๆ

การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่ามีร้อยละ 29 ที่ใช้ถุงยางอนามัย กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชายใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด มากกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิง



ตาราง 5.20 การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย กับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	หญิง (n = 404)		ชาย (n = 364)		รวม (n = 768)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเภทคู่นอน						
คู่รัก/แฟน	396	98.0	326	89.6	722	94.0
เพื่อนหรือกิ๊ก	4	1.0	29	8.0	33	4.3
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	2	0.5	5	1.4	7	0.9
คนที่รู้จักกันผ่านinternet/โทรศัพท์	2	0.5	1	0.3	3	0.4
ผู้ขายบริการทางเพศ	-	-	3	0.8	3	0.4
การใช้ถุงยางอนามัย						
ใช้	100	24.9	119	32.7	219	28.6
ไม่ใช้	302	75.1	245	67.3	547	71.4

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการประมาณร้อยละ 3 ที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน โดยเป็นกลุ่มพนักงานชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่ากลุ่มพนักงานหญิง 1 เท่าตัว

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง พบว่ามีผู้ที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน แต่ไม่ตอบคำถามการใช้ถุงยางอนามัยมากคือ ประมาณ 1 ใน 3 ซึ่งมีเพียงร้อยละ 17 เท่านั้น ที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

ตาราง 5.21 เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน และ
การใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์	หญิง (n = 404)		ชาย (n = 370)		รวม (n = 774)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน						
มี	8	2.0	16	4.3	24	3.1
ไม่มี	396	98.0	354	95.7	750	96.9
การใช้ถุงยางอนามัย*						
ทุกครั้ง	-	-	4	25.0	4	16.7
บางครั้ง	2	25.0	8	50.0	10	41.7
ไม่ใช้	2	25.0	-	-	2	8.3
ไม่ตอบ	4	50.0	4	25.0	8	33.3

หมายเหตุ: * คัดสรรส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น การมีปัสสาวะแสบขัด มีแผลที่อวัยวะเพศ การมีหนองไหลจากอวัยวะเพศ เป็นต้น พบว่ามีประมาณร้อยละ 6 โดยเป็นกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศหญิงมากกว่าพนักงานในสถานประกอบการเพศชายเล็กน้อย

การปฏิบัติตนเมื่อพบว่าตนเองมีอาการที่ผิดปกติ กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ

ส่วนใหญ่จะปรึกษากับแฟนหรือคู่ครองลงมาคือ ปรึกษาเพื่อน ปรึกษากับญาติพี่น้อง และซื้อยากินเอง ตามลำดับ

เมื่อวิเคราะห์จำแนกตามเพศหญิง-เพศชาย พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศหญิงส่วนใหญ่เมื่อพบอาการผิดปกติจะไปรักษาที่สถานพยาบาล ในขณะที่กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศชายจะไปรักษาที่สถานพยาบาล กับซื้อยารับประทานเองในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน



ตาราง 5.22 การมีอาการผิดปกติ และการปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ

อาการผิดปกติ/การปฏิบัติตน	หญิง (n = 408)		ชาย (n = 372)		รวม (n = 789)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อาการผิดปกติ						
มี	28	6.9	19	5.1	47	6.0
ไม่เคยมี	380	93.1	353	94.9	733	94.0
การปฏิบัติ*						
ปรึกษาเพื่อน	7	25.0	3	15.8	10	21.3
ปรึกษาญาติพี่น้อง	5	17.9	4	21.1	9	19.1
ปรึกษาแพทย์/คู่อุปถัมภ์	13	46.4	5	26.3	18	38.3
ซื้อยามากินเอง	1	3.6	5	26.3	6	12.8
ไม่ตอบ	2	7.1	2	10.5	4	8.5

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยมีอาการผิดปกติ

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า มีกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการร้อยละ 29 ที่เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา โดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย

การทราบผลการตรวจเลือดนั้น พบว่าในกลุ่มที่มีการตรวจเลือดมีร้อยละ 75 ที่ทราบผลการตรวจเลือด และมีเพียงร้อยละ 2 ที่ไม่

ทราบผลการตรวจเลือด กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศหญิง-เพศชายที่ทราบผลการตรวจเลือดมีสัดส่วนไม่แตกต่างกัน ความสนใจในการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี มีเพียง 2 ราย ที่ถูกบังคับให้ไปตรวจเลือด และอีก 7 ราย ที่ถูกร้องขอให้ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

ตาราง 5.23 การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

การตรวจเลือด เพื่อหาเชื้อเอชไอวี	หญิง (n = 577)		ชาย (n = 447)		รวม (n = 1,024)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การตรวจเลือด						
เคย	163	28.2	136	30.4	299	29.2
ไม่เคย	414	71.8	311	69.6	725	70.8
สมัครใจตรวจเลือด						
สมัครใจ	150	92.0	120	88.2	270	90.3
ถูกขอร้องให้ไปตรวจ	2	1.2	5	3.7	7	2.3
ไม่สมัครใจ	1	0.6	1	0.7	2	0.7
ไม่ตอบ	10	6.1	10	7.4	20	6.9
ผลการตรวจเลือด*						
ทราบ	122	74.8	103	75.7	225	75.3
ไม่ทราบ	4	2.5	2	1.5	6	2.0
ไม่ตอบ	37	22.7	31	22.8	68	22.8

หมายเหตุ: * คัดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และ การใช้สารเสพติด

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศหญิง

พฤติกรรมการใช้สารเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาบ้า เฮโรอีน/กัญชา เป็นต้น ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการพบว่า มีประมาณร้อยละ 7 ที่เคยเสพยาเสพติด ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และส่วนใหญ่เป็นเพศชาย



ตาราง 5.24 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติด
จำแนกตามเพศ

พฤติกรรม การใช้สารเสพติด	หญิง (n = 604)		ชาย (n = 466)		รวม (n = 1,070)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา)						
ดื่ม	263	43.5	351	75.3	614	57.4
ไม่ดื่ม	341	56.5	115	24.7	456	42.6
เสพยาเสพติด (ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา)						
เสพ	8	1.3	69	14.8	77	7.2
ไม่เสพ	596	98.7	397	85.2	993	92.8

ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสารเสพติด พบว่าในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นบางครั้งบางคราว หรือแล้วแต่โอกาสเท่านั้น มีประมาณ 1 ใน 4 ที่มี

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ (ดื่มทุกวัน-สัปดาห์ละครั้ง) ซึ่งสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ เป็นกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศชายมากกว่าในกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศหญิง

ตาราง 5.25 ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำแนกตามเพศ

ความถี่	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทุกวัน	4	1.5	35	10.0	39	6.4
2-3 ครั้ง/สัปดาห์	10	3.8	38	10.8	48	7.8
สัปดาห์ละครั้ง	13	4.9	28	8.0	41	6.7
แล้วแต่โอกาส	106	40.3	146	41.6	252	41.0
นานๆ ครั้ง	130	49.4	104	29.6	234	38.1

เพศสัมพันธ์หลังจากการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ และการเสพยาเสพติด พบว่ากลุ่มที่มีการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์มีเพศสัมพันธ์หลังตีมี ร้อยละ 62 (คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา) ส่วนในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีร้อยละ 3 เท่านั้น

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมีสัดส่วนน้อยมาก คือ ร้อยละ 19 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ และร้อยละ 13 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในกรณีทั้ง 2 นี้ เป็นเพศชายในสัดส่วนสูงกว่าเพศหญิง

ตาราง 5.26 การใช้ถุงยางอนามัยกับการมีเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ และเสพยาเสพติด จำแนกตามเพศ

พฤติกรรม	หญิง (n =414)		ชาย (n =380)		รวม (n =794)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์	107	56.9	190	65.7	297	62.3
การใช้ถุงยางอนามัย						
ทุกครั้ง	15	14.0	42	22.1	57	19.2
บางครั้ง	29	27.1	56	29.5	85	28.6
ไม่ใช่เลย	57	53.3	86	45.3	143	48.1
ไม่ตอบ	6	5.6	6	3.2	12	4.0
มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	15	2.5	15	3.8	30	3.0
การใช้ถุงยางอนามัย						
ทุกครั้ง	-	-	2	13.3	2	13.3
บางครั้ง	-	-	3	20.0	3	20.0
ไม่ใช่เลย	-	-	9	60.0	9	60.0
ไม่ตอบ	-	-	1	6.7	1	6.7



พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานหญิงจะดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเพื่อนทั้งชายและหญิง ขณะที่พนักงานชายจะดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนชายด้วยกัน สำหรับพฤติกรรมการเสพสารเสพติดในกลุ่ม

พนักงานชายจะเสพสารเสพติดกับคู่รักหรือแฟนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพนักงานหญิงจะเสพสารเสพติดกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน ในรอบปี 2553 ไม่พบว่ามียุติกรรมพนักงานที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดดำ


ตาราง 5.27 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเสพสารเสพติด

พฤติกรรม	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	(n = 260)		(n = 347)		(n = 607)	
ดื่มคนเดียว	13	5.0	32	9.2	45	7.4
คู่รัก /แฟน	36	13.8	15	4.3	51	8.4
กลุ่มเพื่อนผู้ชาย	7	2.7	188	54.2	195	32.1
กลุ่มเพื่อนผู้หญิง	61	23.5	6	1.7	67	11.0
กลุ่มเพื่อนทั้งหญิง/ชาย	114	43.8	82	23.6	196	32.3
เสพสารเสพติด	(n =6)		(n =69)		(n =75)	
ดื่มคนเดียว	1	16.7	7	10.0	8	10.7
คู่รัก /แฟน	1	16.7	39	56.5	40	53.3
กลุ่มเพื่อนผู้ชาย	1	16.7	0	0	1	1.3
กลุ่มเพื่อนผู้หญิง	3	50.0	5	7.2	8	10.7
กลุ่มเพื่อนทั้งหญิง/ชาย	0	0	18	26.1	18	24.0

6

บทสรุป

ผลการสำรวจ



การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการมาเป็นเวลา 9 ปี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2553 เป็นการสำรวจ ครั้งที่ 9)

จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 39,996 ราย โดยดำเนินการสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มตัวอย่างต่างๆ จำนวน 11 กลุ่ม ดังรายละเอียดในตาราง 6.1

ตาราง 6.1 จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ในปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553

กลุ่มตัวอย่าง	ปี พ.ศ.								
	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	747	846	1,125	1,065	1,019	1,071	1,183	1,015	1,046
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปี 2	763	844	1,209	1,041	906	1,041	1,158	1,009	1,012
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	-	-	-	-	-	1,220	1,250	1,079	1,005
คนงาน (2545-2546) / พนักงานในโรงงาน (2547) / คนงานในสถานประกอบการ (2549, 2551)	681	711	1,009	-	1,011	-	1,022	-	1,070
ชายที่มารับการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร	354	354	518	-	-	-	-	-	-
หญิงบริการทางเพศ	346	359	-	501	-	500	-	300	-
แม่บ้าน	346	353	508	-	-	-	-	-	-
ผู้ติดยาเสพติด	373	356	-	376	-	314	-	424	-
แรงงานต่างด้าว	-	-	-	552	-	527	-	439	-
ชายรักชาย	-	-	-	498	-	-	-	300	-
ประชากรทั่วไป	-	-	-	-	1,089	-	1,146	-	1,005
รวม	3,610	3,823	4,369	4,033	4,025	4,673	5,759	4,566	5,138

ผลสรุปของการสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในปี พ.ศ. 2553 มีด้วยกัน 5 กลุ่ม จำนวนตัวอย่างทั้งหมด

5,138 ราย เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงมีจำนวนมากกว่าเพศชาย

ตาราง 6.2 จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังในปี พ.ศ. 2553
จำแนกตามเพศ

กลุ่มที่	กลุ่มตัวอย่าง	หญิง	ชาย	รวม
1	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	495	510	1,005
2	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	583	463	1,046
3	นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	494	518	1,012
4	พนักงานในสถานประกอบการ	604	466	1,070
5	ประชากรทั่วไป	495	510	1,005
รวมทั้งหมด		2,671	2,467	5,138

กลุ่มตัวอย่างเมื่อจำแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ส่วนกลุ่ม พนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่ม ประชากรทั่วไป มีอายุเฉลี่ยมากกว่ากลุ่ม นักเรียนอย่างชัดเจน

ดังนั้นในการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี จึงต้องคำนึงถึง กลุ่มประชากรเป้าหมายด้วยว่า แต่ละกลุ่มเป็น กลุ่มที่ไม่ใช่รุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อให้การ นำเสนอได้เห็นข้อแตกต่างจะเป็นการนำเสนอ ผลการสำรวจแยกในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง และ จำแนกตามเพศด้วย

ตาราง 6.3 อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2553

กลุ่มที่	กลุ่มตัวอย่าง	อายุเฉลี่ย	ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน	อายุน้อย ที่สุด	อายุมาก ที่สุด
1	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	13.8	0.6	13	16
2	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	16.8	0.9	15	22
3	นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	16.8	0.9	15	22
4	พนักงานในสถานประกอบการ	31.1	8.1	17	49
5	ประชากรทั่วไป	32.1	10.0	15	49



ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS ในแต่ละรายข้อ พบว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัย เป็นความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสามารถตอบได้ถูกต้องในสัดส่วนที่มากกว่าความรู้ในเรื่องอื่นๆ อยู่ระหว่างร้อยละ 87-94 ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยการ มีคู่นอนที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี (มีคู่นอนคนเดียว) นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตอบได้ถูกต้องในสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ในข้อนี้กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบได้ถูกต้องอยู่ระหว่าง ร้อยละ 64-80 คนที่ดูว่ามีสุขภาพแข็งแรงอาจมีเชื้อเอชไอวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ

นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีความรู้ค่อนข้างน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ เช่นกัน สำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวี กลุ่มนักเรียนยังมีความรู้ต่ำกว่ากลุ่มพนักงานและประชากรทั่วไป ส่วนเรื่องการติดเชื้อโดยการรับประทานอาหารร่วมกัน กลุ่มนักเรียนและกลุ่มพนักงานยังมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย

โดยภาพรวมแล้ว กลุ่มนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ค่อนข้างน้อยกว่ากลุ่มพนักงานและกลุ่มประชากรทั่วไป และสัดส่วนของความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องเอดส์ในแต่ละข้อยังมีความแตกต่างกันอยู่มากในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ตาราง 6.4 ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง ในภาพรวม

ข้อที่	ข้อความ	มัธยมศึกษาปีที่ 2	มัธยมศึกษาปีที่ 5	อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	พนักงานในสถานประกอบการ	ประชากรทั่วไป
1	การใช้ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้	90.2	93.5	87.4	91.6	89.3
2	การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีและคู่นอนนั้นไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	65.2	72.8	63.7	79.9	78.0
3	บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้	42.3	71.3	62.3	78.8	71.5
4	ยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้	45.1	42.5	37.3	63.7	62.0
5	กินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	38.5	50.5	39.4	37.7	70.4

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เมื่อจำแนกใน
กลุ่มผู้หญิง พบว่าในเรื่องเกี่ยวกับการใช้
ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวีได้ สามารถตอบได้ถูกต้องระหว่าง
ร้อยละ 87-93 การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่
ไม่มีเชื้อเอชไอวี และคู่นอนนั้นไม่มีเพศ-
สัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 63-82 บุคคลที่มี
สุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้ร้อยละ
48-79 ยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้ร้อยละ
39-62 และการกินอาหารร่วมกันสามารถ
ติดเชื้อเอชไอวีได้ ร้อยละ 41-72

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เมื่อจำแนกใน
กลุ่มผู้ชาย พบว่าในเรื่องเกี่ยวกับการใช้

ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวีได้ สามารถตอบได้ถูกต้องระหว่าง
ร้อยละ 88-94 การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่
ไม่มีเชื้อเอชไอวี และคู่นอนนั้นไม่มีเพศสัมพันธ์
กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวี ร้อยละ 62-77 บุคคลที่มีสุขภาพ
แข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้ ร้อยละ 37-78
ยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้ ร้อยละ 36-66
และการกินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อ
เอชไอวีได้ ร้อยละ 36-76

โดยภาพรวมแล้วเมื่อดูสัดส่วนที่ตอบได้
ถูกต้องในแต่ละข้อไม่แตกต่างกันมากนัก
ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย

ตาราง 6.5 ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง
จำแนกตามเพศ


ข้อที่	ข้อความ	มัธยมศึกษา ปีที่ 2		มัธยมศึกษา ปีที่ 5		อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2		พนักงาน ในสถาน ประกอบการ		ประชากร ทั่วไป	
		หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
1	การใช้ถุงยางอนามัยลด ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวีได้	90.1	90.4	93.3	93.7	86.6	88.0	91.9	91.2	90.7	87.7
2	การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคล ที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีและคู่นอน นั้นไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อ การติดเชื้อเอชไอวี	68.9	61.6	71.5	74.5	62.8	64.7	82.3	76.8	82.0	74.1
3	บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้	48.1	36.7	71.7	70.8	68.2	56.6	79.3	78.1	74.3	68.8
4	ยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้	42.4	47.6	41.2	44.3	38.7	35.9	62.1	65.9	61.0	62.9
5	กินอาหารร่วมกันสามารถ ติดเชื้อเอชไอวีได้	41.8	36.3	51.3	49.5	40.7	38.2	72.4	75.8	69.5	71.4



กลุ่มตัวอย่างที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ (ตอบถูกข้อ 1 – 5) พบว่า กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวช.ปี 2 ตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน รองลงมาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป ตามลำดับ โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างในรอบปี พ.ศ. 2553 สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ UNGASS อยู่ระหว่างร้อยละ 9-38


แผนภาพ 6.1 ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อในภาพรวม



เมื่อวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS จำแนกตามเพศพบว่า ในกลุ่มผู้หญิงสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อ (ข้อที่ 1- 5) อยู่ระหว่างร้อยละ 9 – 37 กลุ่มนักเรียนหญิงสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อน้อยกว่าในกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และประชากรทั่วไปอย่างชัดเจน

ส่วนในกลุ่มผู้ชาย พบว่าสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อ อยู่ระหว่างร้อยละ 6 – 38 กลุ่มประชากรทั่วไป และกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อมากกว่ากลุ่มนักเรียนอย่างชัดเจนเช่นกัน

แผนภาพ 6.2 ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ
จำแนกตามเพศ




เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

การมีประสบการณ์ทางเพศในแต่ละกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไปส่วนใหญ่มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 มีประสบการณ์ทางเพศประมาณ 2

ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศร้อยละ 19 หรือประมาณ 1 ใน 5 และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 9 ที่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์แล้ว

แผนภาพ 6.3 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในภาพรวม






เมื่อวิเคราะห์ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มผู้ชาย มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มผู้หญิงในทุกกลุ่มตัวอย่าง ยกเว้นในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่นักเรียนหญิงและชายมีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์เท่าๆ กัน ในกลุ่มนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 5 เคยมีประสบการณ์ทางเพศ

มากกว่านักเรียนหญิงประมาณ 2 เท่า กลุ่มประชากรทั่วไป และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 เพศหญิง-เพศชายมีประสบการณ์ทางเพศไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศหญิงมีประสบการณ์ทางเพศน้อยกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศชายค่อนข้างชัดเจน

แผนภาพ 6.4 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ



อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ากลุ่มนักเรียน มีอายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไปค่อนข้างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และประชากรทั่วไปประมาณ 20 ปี

กลุ่มตัวอย่างมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยที่สุดประมาณ 10 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามควรคำนึงถึงอายุของกลุ่มนักเรียนกับกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป มีความแตกต่างกันมากด้วย

โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างจะมีประสบการณ์ทางเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี

ตาราง 6.6 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในภาพรวม


กลุ่ม ที่	กลุ่มตัวอย่าง	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	อายุน้อย ที่สุด	อายุมาก ที่สุด
1	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	13.1	1.10	10	15
2	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	15.19	1.96	10	19
3	นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	15.21	1.83	11	18
4	พนักงานในสถานประกอบการ	19.9	3.98	10	38
5	ประชากรทั่วไป	20.0	4.6	11	42

กลุ่มตัวอย่างที่เคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี พบว่ามีสัดส่วนระหว่าง ร้อยละ 1 – 20 สำหรับกลุ่มผู้หญิง และร้อยละ 5 – 25 ในกลุ่มผู้ชาย ไม่นับรวมกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี อยู่แล้ว ในกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไปมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

น้อยกว่า 15 ปี น้อยกว่าในกลุ่มนักเรียนค่อนข้างชัดเจน

โดยสรุปแล้ว ผู้ชายจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี ในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มผู้หญิง ยกเว้นในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่นักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปีใกล้เคียงกับนักเรียนชาย

แผนภาพ 6.5 การมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี
จำแนกตามเพศ



หมายเหตุ : ยกเว้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพราะมีอายุน้อยกว่า 15 ปี



คู่เพศสัมพันธ์ในครั้งแรก พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่รัก/แฟน เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 80-96 รองลงมาคือ ผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคย ร้อยละ 1-5 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่มีคู่นอนครั้งแรกที่เป็นผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผิน และผู้ชายบริการทางเพศ ส่วนคู่นอนครั้งแรกที่เป็นเพศเดียวกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

สำหรับกลุ่มผู้ชายพบว่ามีคู่นอนครั้งแรกที่เป็นคู่รักหรือแฟน ร้อยละ 75-92 ผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคย ร้อยละ 2-12 ผู้หญิงที่รู้จักกัน-

ผิวเผิน ร้อยละ 1-6 หญิงบริการทางเพศ ร้อยละ 2-6 ยกเว้นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2 ที่ไม่มีคู่นอนเป็นหญิงบริการทางเพศในครั้งแรก และผู้ชายด้วยกัน ร้อยละ 1-9

โดยสรุปแล้ว พบว่ากลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกกับคู่รักหรือแฟน ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มผู้หญิงค่อนข้างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของผู้ชายก็ยังคงเป็นคู่รักหรือแฟน มากกว่าผู้หญิงคนอื่นๆ หรือว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศ ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยมาก

ตาราง 6.7 การมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ

คู่นอน ครั้งแรก	มัธยมศึกษา ปีที่ 2		มัธยมศึกษา ปีที่ 5		อาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2		พนักงาน ในสถาน ประกอบการ		ประชากร ทั่วไป	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คู่รัก/แฟน	79.5	87.0	93.8	91.5	90.1	89.9	96.1	76.3	94.5	75.0
บุคคลที่รู้จักกัน คุ้นเคย เพื่อนหรือกิ๊ก	4.5	2.2	4.6	4.6	2.6	6.3	1.1	11.4	1.9	11.6
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	-	-	-	-	1.0	1.0	2.6	6.3	2.8	5.6
คนที่รู้จักกันผ่าน Internet/โทรศัพท์	-	2.2	-	-	-	-	0	5.6	0	0.3
ผู้ชายบริการทางเพศ	15.9	8.7	1.5	3.8	6.3	2.9	0.2	0.5	0.8	7.6

ในรอบปี พ.ศ. 2553 ในกลุ่มประชากรทั่วไป และกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการได้มีการเปลี่ยนคำถามประเภทของคู่นอน จากบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคยเป็น “เพื่อนหรือกิ๊ก” บุคคลที่รู้จักกันผิวเผินเป็น

“คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก” และตัดคู่นอนที่เป็นเพศเดียวกันออก โดยเปลี่ยนเป็นคู่นอนที่รู้จักกันทาง Internet หรือทางโทรศัพท์แทน


การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ระหว่าง ร้อยละ 36-65 กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มประชากรทั่วไป กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มผู้ชายพบว่ามีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ระหว่าง ร้อยละ 45-55 กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัย

ครั้งแรกน้อยที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มประชากรทั่วไป สำหรับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยใกล้เคียงกัน ส่วนกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากที่สุด

โดยสรุปแล้วผู้ชายมีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกมากกว่าในกลุ่มผู้หญิง ยกเว้นในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้หญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่าในกลุ่มผู้ชาย

แผนภาพ 6.6 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก
จำแนกตามเพศ





เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทคู่นอนของกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีคู่นอนเป็นคู่รักหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 93-99 มีคู่นอนเป็นผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคย ร้อยละ 6-13 มีคู่นอนเป็นผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผิน ร้อยละ 3-6 และมีคู่นอนเป็นผู้หญิงด้วยกัน ร้อยละ 2-15

สำหรับกลุ่มผู้ชาย พบว่ามีคู่นอนในรอบปีเป็นคู่รักหรือแฟน ร้อยละ 72-97 เป็น

ผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคยร้อยละ 17-28 เป็นผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน ร้อยละ 9-16 เป็นผู้ชายขายบริการทางเพศ ร้อยละ 7-10 และเป็นผู้ชายด้วยกัน ร้อยละ 6-18

โดยสรุปแล้วผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่นอนที่ไม่ใช่คู่รักหรือแฟนในสัดส่วนมากกว่ากลุ่มผู้หญิง และผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่นอนหลายๆ ประเภทมากกว่ากลุ่มผู้หญิงค่อนข้างชัดเจน

ตาราง 6.8 ประเภทของคู่นอนสำหรับเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

ประเภทคู่นอน	คู่รัก/แฟน		บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย		บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน		ผู้ชายบริการทางเพศ		เพศเดียวกัน	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	62.5	71.8	12.5	20.5	2.5	15.4	-	7.7	15.0	17.9
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	90.9	92.0	11.4	17.0	4.5	9.0	-	4.5	13.6	10.2
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	96.0	96.6	6.7	23.1	5.4	16.3	-	10.2	12.7	6.1
พนักงานในสถานประกอบการ	98.6	96.1	6.0	28.2	4.8	15.0	1.9	7.4	1.9	6.1
ประชากรทั่วไป	94.4	93.1	7.2	20.9	6.0	15.2	1.9	7.4	1.6	7.7

การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะนำเสนอในส่วนที่มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆ เท่านั้น

ในกลุ่มผู้หญิง พบว่ามีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่รัก/แฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 11-44 กับผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคย ร้อยละ 16-50 กับผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผิน ร้อยละ 10-100 และกับผู้หญิงด้วยกัน

ร้อยละ 5-33 กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยกว่ากลุ่มนักเรียนค่อนข้างชัดเจน และมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่รักหรือแฟนน้อยกว่าคู่นอนคนอื่น ๆ

ในกลุ่มผู้ชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่รักหรือแฟน ร้อยละ 14-30

กับผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคย ร้อยละ 36 – 47 กับ
ผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน ร้อยละ 17 – 49 กับ
ผู้ชายบริการทางเพศร้อยละ 54 – 87 กับ
ผู้ชายด้วยกัน ร้อยละ 11 – 58 สัดส่วนของการ
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อรัก/แฟนน้อยกว่า
คู่นอนคนอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน

โดยสรุปแล้วผู้หญิงมีสัดส่วนของการใช้
ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ใน

รอบปีน้อยกว่าผู้ชาย กลุ่มนักเรียนมีสัดส่วน
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่าในกลุ่ม
พนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่ม
ประชากรทั่วไป นอกจากนี้มีสัดส่วนการใช้
ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภท
คู่อรัก/แฟนน้อยกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ อย่าง
ชัดเจน

ตาราง 6.9 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆ
ในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

ประเภทคู่นอน	คู่อรัก/แฟน		บุคคลที่รู้จัก กันคุ้นเคย		บุคคลที่รู้จักกัน ผิวเผิน		ผู้ชายบริการ ทางเพศ		เพศเดียวกัน	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	44.0	25.0	50.0	37.5	100.0	16.7	-	66.7	-	42.9
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	20.0	29.6	40.0	46.7	50.0	42.9	-	75.0	-	11.1
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	14.6	28.2	30.0	47.1	25.0	41.7	-	86.7	5.3	33.3
พนักงานในสถาน ประกอบการ	11.3	13.7	16.0	35.5	10.0	40.4	25.0	53.6	12.5	43.5
ประชากรทั่วไป	13.3	17.2	34.8	42.5	31.6	49.1	40.0	55.6	33.3	57.5

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

คู่นอนครั้งล่าสุดในกลุ่มผู้หญิง พบว่า
ผู้หญิงเกือบทั้งหมดมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับ
คู่อรักหรือแฟน ส่วนคู่นอนคนอื่นๆ มีสัดส่วนที่
น้อยมาก สำหรับในกลุ่มผู้ชายพบว่ามีคู่นอน
ครั้งล่าสุดเป็นคู่อรักหรือแฟน อยู่ระหว่างร้อยละ
77-98 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เป็นกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่คู่อรัก

หรือแฟนมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มประชากร
ทั่วไป กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ
และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2
ตามลำดับ สำหรับการมีเพศสัมพันธ์
ครั้งล่าสุดกับผู้ให้บริการทางเพศมี
สัดส่วนที่น้อยมาก



ตาราง 6.10 ประเภทของกลุ่มนอนสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย จำแนกตามเพศ


ประเภทกลุ่มนอน	คู่รัก/แฟน		บุคคลที่รู้จักกัน คุ้นเคย		บุคคลที่รู้จักกัน ผิวเผิน		ผู้ขายบริการ ทางเพศ		เพศ เดียวกัน*	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	87.5	76.9	2.5	2.6	-	5.1	-	2.6	10.0	12.8
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	90.9	92.1	0	5.6	-	-	-	-	2.3	1.1
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	98.7	95.2	-	-	-	1.4	-	-	1.3	1.4
พนักงานในสถานประกอบการ	98.0	89.6	1.0	8.0	0.5	1.4	-	0.8	0.5	0.3
ประชากรทั่วไป	95.3	98.0	1.3	4.6	0.3	0.9	-	1.7	1.6	3.2

หมายเหตุ : * ในรอบปี พ.ศ. 2553 เป็นคนที่รู้จักกันทาง Internet/โทรศัพท์

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย พบว่าในกลุ่มผู้หญิง กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายน้อยที่สุด และกลุ่มนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายมากที่สุด ในภาพรวมแล้วมีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายอยู่ระหว่างร้อยละ 25-77 ในกลุ่มผู้หญิงมี

สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายอยู่ระหว่าง ร้อยละ 25-54 และในกลุ่มผู้ชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายอยู่ระหว่างร้อยละ 33-77 กลุ่มนักเรียนมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายมากกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ/ประชากรทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเจน กลุ่มผู้ชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายมากกว่ากลุ่มผู้หญิง

แผนภาพ 6.7 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย จำแนกตามเพศ



เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน


เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาเท่านั้น พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนร้อยละ 0-7 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนในรอบปีนี้ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงิน/สิ่งของมากที่สุด

สำหรับกลุ่มผู้ชายพบว่าไม่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน ร้อยละ 4-6 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 และประชากรทั่วไปมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับ-

สิ่งของ หรือเงินตอบแทนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ ตามลำดับ

โดยสรุปแล้วผู้ชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนมากกว่ากลุ่มผู้หญิง ยกเว้นในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างไรก็ตามการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนมีสัดส่วนไม่มากนัก คือ ประมาณร้อยละ 0-7 เท่านั้น และจำนวนในแต่ละกลุ่มก็มีค่อนข้างน้อย เช่น ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพศชายมีเพียงจำนวน 3 คนเท่านั้น

แผนภาพ 6.8 สัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน
จำแนกตามเพศ




สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน คิดเฉพาะในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนเท่านั้น

พบว่าการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง อยู่ระหว่างร้อยละ 0-67.0 ผู้ชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่ากลุ่มผู้หญิงเล็กน้อย ยกเว้นกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2



แผนภาพ 6.9 สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง จำแนกตามเพศ



อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา คิดสัดส่วนกับกลุ่มตัวอย่างทุกคน (ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีเพศสัมพันธ์เท่านั้น) พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ระหว่างร้อยละ 1-7 โดยที่กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการมีสัดส่วนของอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กลุ่มประชากรทั่วไป กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มผู้ชายพบว่ามีอาการผิดปกติทั่วไปมีที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อยู่ระหว่างร้อยละ 1-8 กลุ่มประชากรทั่วไปมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 พนักงานในสถานประกอบการ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้อยมาก

โดยภาพรวมแล้ว กลุ่มผู้ชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมามากกว่ากลุ่มผู้หญิง ยกเว้นกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ

แผนภาพ 6.10 อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จำแนกตามเพศ




การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีอยู่ระหว่างร้อยละ 2-32 และกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป มีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มนักเรียนอย่างชัดเจน และกลุ่มผู้ชายมีการ

ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มผู้หญิง ยกเว้นกลุ่มประชากรทั่วไป

กลุ่มผู้หญิงมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมาระหว่างร้อยละ 2-32 ซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่วนในกลุ่มผู้ชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีระหว่างร้อยละ 3-30

แผนภาพ 6.11 การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ





พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 36-60 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมามากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ กลุ่มประชากรทั่วไป กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามลำดับ

กลุ่มผู้ชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาอยู่ระหว่าง ร้อยละ 42-75 โดยที่กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ มีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือน

ที่ผ่านมามากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กลุ่มประชากรทั่วไป และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยที่สุด

โดยสรุปแล้วกลุ่มผู้ชายมีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมามากกว่ากลุ่มผู้หญิงอย่างชัดเจน กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 และกลุ่มประชากรทั่วไป มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมามากกว่ากลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนภาพ 6.12 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ



พฤติกรรมกรรมการเสพยาเสพติด


พฤติกรรมกรรมการเสพยาเสพติด หมายถึง การเสพยาเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาบ้า เฮโรอีน โคเคน กัญชา เป็นต้น ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 1-19 กลุ่มผู้ชายมีการเสพยาเสพติดมากกว่ากลุ่มผู้หญิง

กลุ่มผู้หญิงมีการเสพยาเสพติดร้อยละ 1-7 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 เป็นกลุ่มที่มีการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมามากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มประชากร-

ทั่วไป กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มผู้ชายพบว่าการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10-19 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีการเสพยาเสพติดมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มประชากรทั่วไป และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามลำดับ

แผนภาพ 6.13 พฤติกรรมการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ



วิธีการเสพยาเสพติดโดยการฉีดสารเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำ คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนที่น้อยมากในแต่ละกลุ่มที่เสพยาเสพติดโดยการฉีด กลุ่มผู้ชายมีจำนวนคนเสพยาเสพติดโดยวิธีการฉีดมากกว่าในกลุ่มผู้หญิงจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการสำรวจใน

รอบปี พ.ศ. 2553 มีผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการเสพยาเสพติด จำนวน 9 รายเท่านั้น (เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ราย นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำนวน 1 ราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ราย ประชากรทั่วไป จำนวน 5 ราย



โดยสรุปแล้วความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวีโดยการเสพยาเสพติด มีสัดส่วนที่ น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงด้าน พฤติกรรมทางเพศ ซึ่งผลการเฝ้าระวัง ใน

ทุกๆ ปีชี้ชัดว่าการติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าร้อยละ 80 จากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย (ไม่ใช่ ถุงยางอนามัยทุกครั้ง)

ตาราง 6.11 วิธีการเสพยาเสพติด ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

กลุ่มตัวอย่าง	เสพยาโดยใช้เข็ม		ร่วมกับบุคคลอื่น*		ทำความสะอาดอุปกรณ์ ทุกครั้ง**	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	-	0.2	-	50.0	-	-
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	16.7	-	-	-	-	-
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปี 2	-	1.0	-	-	-	-
พนักงานในสถานประกอบการ	0	0	0	0	0	0
ประชากรทั่วไป	0.4	1.4	100.0	42.9	50.0	0

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนเฉพาะกลุ่มที่เคยเสพยาเสพติดโดยการฉีดเท่านั้น

** คิดสัดส่วนเฉพาะกลุ่มที่เคยใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับบุคคลอื่น

กลุ่มผู้หญิง มีเพศสัมพันธ์หลังดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่าง ร้อยละ 3-57 ซึ่งมีความแตกต่างกันมากในแต่ละกลุ่ม กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการมี เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มากกว่ากลุ่มอื่นๆ รองลงมาคือ กลุ่มประชากร ทั่วไป ส่วนกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน สำหรับกลุ่มนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเพศสัมพันธ์หลังดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยที่สุด

สำหรับกลุ่มผู้ชาย พบว่ามีเพศสัมพันธ์ หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ ประมาณ ร้อยละ 10-66 กลุ่มพนักงานใน สถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป

มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 และกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ตามลำดับ ในภาพรวมกลุ่มผู้ชายมี เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มากกว่าในกลุ่มผู้หญิง และกลุ่มพนักงานใน สถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มากกว่ากลุ่มนักเรียน

เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ในกลุ่ม ผู้หญิง ประมาณร้อยละ 3-67 กลุ่มผู้ชาย มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดร้อยละ 17-40 ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนมากนักว่า กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด มากกว่ากลุ่มผู้หญิง

สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มผู้หญิง ยกเว้นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่านักเรียนชาย และสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดอยู่ระหว่าง ร้อยละ 13-80 ยกเว้นกลุ่มนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง และกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการไม่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเลย

โดยภาพรวมแล้ว เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และหลังเสพยาเสพติดมีสัดส่วนไม่มากนัก และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งก็มีสัดส่วนไม่สูงมากนักเช่นกัน

ตาราง 6.12 การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และหลังเสพยาเสพติด

กลุ่มตัวอย่าง	เพศสัมพันธ์				ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง			
	หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์*		หลังเสพยาเสพติด**		เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์		เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	12.9	50.0	66.7	26.3	50.0	36.4	50.0	80.0
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	3.3	9.8	33.3	6.7	14.3	32.1	0	0
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปี 2	15.2	16.7	12.1	19.6	19.6	25.4	0	31.8
พนักงานในสถานประกอบการ	56.9	65.7	2.5	3.8	14.0	22.1	0	13.3
ประชากรทั่วไป	40.9	66.2	28.6	40.0	22.0	24.8	25.0	0

หมายเหตุ: * คัดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

** คัดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่มีการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

7

แนวโน้มพฤติกรรม ที่สัมพันธ์กับ การติดเชื้อเอชไอวี



ในบทนี้เป็นการติดตามแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 พนักงานในสถานประกอบการ และประชากรทั่วไป ของกรุงเทพมหานคร

กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ได้ติดตามแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และเฝ้าติดตามต่อเนื่องเป็นรอบที่ 9 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เริ่มติดตาม

พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และเฝ้าติดตามต่อเนื่องเป็นรอบที่ 3 สำหรับกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ เริ่มติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และเฝ้าติดตามต่อเนื่องมาอีก 3 ปี จนปี พ.ศ. 2548 ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการทุก 2 ปี กลุ่มประชากรทั่วไป ได้เริ่มติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และเฝ้าติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีทุก 2 ปีเช่นกัน

7.1 แนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรอบ 4 ปี


จากการติดตามพฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมาของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีสัดส่วนการใช้ Internet สูงขึ้นทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิง และในกลุ่มนักเรียนชาย ในภาพรวมกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหญิงและชาย มีสัดส่วนการใช้ Internet ไม่แตกต่างกัน

มากนักในแต่ละรอบปีที่ศึกษา


พฤติกรรมการใช้ Internet เพื่อหาคูรักหรือแฟน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแนวโน้มการใช้ Internet เพื่อหาคูรักหรือแฟนสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนหญิง ส่วนนักเรียนชายมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

แผนภาพ 7.1.1 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ Internet และการใช้ Internet เพื่อหา
คูรักรหรือแฟนในรอบปีที่ผ่านมา

การใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา



การใช้ Internet เพื่อหาคูรักรหรือแฟน



ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแนวโน้มของการตอบ
ความรู้ได้ถูกต้องมากขึ้นในทุกข้อ

ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และการ
มีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีเป็นวิธี
หนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ตอบได้

ถูกต้องในสัดส่วนที่สูง (มากกว่าครึ่งหนึ่ง)
ส่วนความรู้เกี่ยวกับคนที่มองว่า มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงดีอาจเป็นคนที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี
ยังสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีมาสู่คนได้
และการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้มีสัดส่วน
ตอบได้ถูกต้องไม่ถึงครึ่งหนึ่ง




ตาราง 7.1.1 แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง

ข้อที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	2550	2551	2552	2553
1	ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวี	70.0	83.8	86.7	90.2
2	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	45.4	61.0	64.9	65.2
3	คนที่มองเห็นว่ามีความสุขร่างกายที่แข็งแรงดี อาจเป็นคนที่ติดเชื้อเอชไอวี	48.9	43.0	39.1	42.3
4	ถุงสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีมาสู่คนได้	34.8	45.0	39.6	45.1
5	การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	30.9	34.1	30.0	38.5

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สามารถตอบได้ถูกต้องทุกข้อตามเกณฑ์ของ UNGASS พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ถูกต้องทั้ง 5 ข้อ ตามเกณฑ์ของ UNGASS ในสัดส่วนที่ลดลงเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนชาย ส่วนใน


กลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อวิเคราะห์ดูแนวโน้มของนักเรียนหญิง - ชาย แล้ว พบว่านักเรียนหญิงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อ อยู่ระหว่างร้อยละ 5-12 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายอยู่ระหว่างร้อยละ 5-7

แผนภาพ 7.1.2 แนวโน้มของการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อตามเกณฑ์ของ UNGASS ในรอบ 4 ปี



ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์


แผนภาพ 7.1.3 แนวโน้มประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 4 ปี



ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มนักเรียนหญิง ส่วนในกลุ่มนักเรียนชาย มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย นักเรียนชายมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 4 ปี ประมาณ 1 เท่าตัว ส่วนในปี พ.ศ. 2553 นักเรียนหญิง

มีประสบการณ์ทางเพศในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกับนักเรียนชาย ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงอยู่ระหว่างร้อยละ 4-9 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายมีร้อยละ 9-11

แผนภาพ 7.1.4 แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก โดยความสมัครใจ ในรอบ 4 ปี



เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยความสมัครใจมากขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิงและนักเรียนชายในรอบ 2 ปีที่แล้ว ส่วนในปีพ.ศ. 2552 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนชายและลดลงเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนหญิง สำหรับในรอบนี้มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย




คู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนรัก หรือแฟน มีแนวโน้มลดลงมาทีละน้อยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ คู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเป็นบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่แฟน หรือคู่รักมากขึ้นในปี พ.ศ. 2552 คู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่เป็นบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน และบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันมี

แนวโน้มสูงขึ้น และเห็นได้ชัดเจนว่า คู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชายที่เป็นหญิงบริการทางเพศมีเพียงปีละ 1-2 รายเท่านั้น ในแต่ละปี สำหรับในรอบปี พ.ศ. 2553 มีคู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเป็นแฟน/คู่รักมากกว่าในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลประเภทอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง

ตาราง 7.1.2 แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบ 4 ปี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	2550	2551	2552	2553
คู่รัก/แฟน	74.0	73.7	71.7	83.3
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	12.0	15.8	10.1	3.3
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	2.0	1.3	10.1	0
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	1.3	3.0	1.1	1.1
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	7.9	4.0	6.7	12.2

แผนภาพ 7.1.5 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในรอบ 4 ปี



จากการติดตามการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าในรอบปีมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนชาย ส่วนในกลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มลดลง

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ระหว่างร้อยละ 39-62 สำหรับนักเรียนหญิงมีสัดส่วนการ

ใช้ถุงยางอนามัยครั้งแรกร้อยละ 39-62 และอยู่ระหว่างร้อยละ 44-57 ในกลุ่มนักเรียนชาย

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า
ในภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา
คูรัก หรือแฟนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน
การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลประเภทอื่นๆ มี

แนวโน้มลดลงในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ส่วน
ในรอบปี พ.ศ. 2553 แนวโน้มของการมี
เพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟนลดลงอย่าง
เห็นได้ชัดเจน

ตาราง 7.1.3 แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่นอนประเภทต่างๆ

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา	2550	2551	2552	2553
คูรัก/แฟน	84.4	87.7	91.4	67.1
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	40.3	32.3	30.9	16.5
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	22.1	18.5	12.3	8.9
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	18.9	6.2	6.2	3.8
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	13.0	18.5	13.6	16.5

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยกับ
คู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ พบว่าในรอบปี
กลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มการใช้ถุงยาง
อนามัยทุกครั้งเพิ่มขึ้นเมื่อมีเพศสัมพันธ์ใน
รอบปีที่ผ่านมา กับคู่นอนทุกประเภท
ในขณะที่กลุ่มนักเรียนชาย พบว่าแนวโน้ม

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งลดลงกับคู่นอน
ทุกประเภท อย่างไรก็ตามเมื่อดูในภาพรวม
แล้ว จะเห็นได้ว่าการใช้ถุงยางอนามัยทุก
ครั้งในกลุ่มนักเรียนกับคู่นอนที่เป็นคูรักหรือ
แฟนน้อยกว่าในคู่นอนประเภทอื่นๆ

ตาราง 7.1.4 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ

การใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง	พ.ศ. 2550		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2552		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	19.0	33.3	38.9	25.6	29.6	43.8	44.0	25.0
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	0	31.0	50.0	36.8	25.0	25.0	60.0	37.5
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	0	29.4	0	50.0	-	62.5	100.0	16.7
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	27.3	na	75.0	100.0	75.0	-	66.7
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	0	22.2	0	22.0	-	57.1	-	42.0



เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด


เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่าในรอบปีนี้นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟนลดลงในกลุ่มนักเรียนหญิงส่วนนักเรียนชายมีแนวโน้มสูงขึ้น

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับบุคคลที่มีเพศเดียวกันมีแนวโน้มลดลงทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย

ตาราง 7.1.5 แนวโน้มเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบ 4 ปี

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	พ.ศ. 2550		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2552		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	83.3	52.8	94.7	73.9	96.4	73.6	87.5	76.9
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	4.6	11.3	0	15.2	-	13.2	2.5	2.6
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	0	1.9	0	2.2	-	9.4	-	5.1
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	7.5	na	0	na	na	-	2.6
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	4.2	3.8	5.3	8.7	3.6	3.8	10.0	12.8


แผนภาพ 7.1.6 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด



แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่าในรอบปีนี้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดลดลงทั้งในกลุ่มนักเรียนชายและในกลุ่มนักเรียนหญิง นักเรียนชายใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมากกว่านักเรียนหญิง ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ในกลุ่มนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยอยู่ระหว่างร้อยละ 50-63 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายอยู่ระหว่างร้อยละ 45-70

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน


แผนภาพ 7.1.7 แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน



แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งในกลุ่มนักเรียนชาย และกลุ่มนักเรียนหญิง นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่านักเรียนชายในรอบปี พ.ศ. 2552

ส่วนในรอบปี พ.ศ. 2553 มีจำนวน 2 ราย เท่านั้น ซึ่งเป็นนักเรียนชาย โดยภาพรวมแล้วการมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละรอบปีจำนวนไม่มากนัก และแนวโน้มก็คงที่ในแต่ละรอบ

แผนภาพ 7.1.8 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน




การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสำหรับนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนนั้นในรอบปีนี้มีจำนวน 1 ราย อย่างไรก็ตามมีจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนน้อยมาก (ในปี พ.ศ. 2550 มีจำนวน 9 ราย และปี พ.ศ. 2551 มีจำนวน 6 ราย และปี พ.ศ. 2552 มีจำนวน 10 รายเท่านั้น) จึงทำให้การวิเคราะห์ในส่วนนี้ค่อนข้างจำกัด



อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


แผนภาพ 7.1.9 แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบ 4 ปี



แนวโน้มของนักเรียนที่มีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย นักเรียนชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใกล้เคียงกับนักเรียนหญิง อย่างไรก็ตามในรอบปี พ.ศ. 2553 มีนักเรียนจำนวนน้อยมากที่จะวิเคราะห์เพื่อเห็นแนวโน้มอะไรได้ (นักเรียนหญิงจำนวน 1 ราย และนักเรียนชายจำนวน 3 ราย)

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

แผนภาพ 7.1.10 แนวโน้มของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในรอบ 4 ปี




ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย นักเรียนชายมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศมากกว่านักเรียนหญิง

นักเรียนหญิงมีปัญหาเรื่องเพศในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่างร้อยละ 3-8 ส่วนนักเรียนชายมีปัญหาเรื่องเพศในแต่ละรอบปี อยู่ระหว่างร้อยละ 4-13

พฤติกรรมการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์


แผนภาพ 7.1.11 แนวโน้มการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา



พฤติกรรมการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแนวโน้มการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ทั้งนักเรียนหญิง-นักเรียนชาย นักเรียนชายมีการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิง การตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มนักเรียนหญิงอยู่ระหว่างร้อยละ 26-38 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายอยู่ระหว่างร้อยละ 35-42

แผนภาพ 7.1.12 แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์




เพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ พบว่าในรอบปีนี้มีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ลดลงในกลุ่มนักเรียนหญิง ส่วนกลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิงยกเว้นในรอบปี พ.ศ. 2552

หมายเหตุ: คัดสรรส่วนเฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา



แผนภาพ 7.1.13 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีแนวโน้มไม่คงที่ ทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใกล้เคียงกับนักเรียนหญิง ในรอบปี พ.ศ. 2552 ส่วนในปี พ.ศ. 2553 นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

มากกว่านักเรียนชาย อย่างไรก็ตามจำนวนนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีจำนวนน้อยมาก ทำให้การวิเคราะห์ในส่วนนี้ไม่ชัดเจน (นักเรียนหญิงจำนวน 4 ราย ส่วนนักเรียนชายจำนวน 11 รายเท่านั้น)

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด


แผนภาพ 7.1.14 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมายในรอบ 4 ปี



พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา ประเภทผิดกฎหมาย เช่น ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน หรือโคเคน เป็นต้น พบว่ากลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มการเสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมาสูงขึ้น ส่วนนักเรียนหญิงมีแนวโน้มการเสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมาลดลงเล็กน้อย นักเรียนชายมีการเสพยาเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมายมากกว่า


นักเรียนหญิงประมาณ 1 เท่าตัว ในรอบ 4 ปี นักเรียนหญิงมีการเสพยาเสพติดอยู่ระหว่างร้อยละ 2-3 ส่วนนักเรียนชายอยู่ระหว่างร้อยละ 5-10

แผนภาพ 7.1.15 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา ในรอบ 4 ปี




การเสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา
เข้าเส้นโลหิต พบว่ามีแนวโน้มใกล้เคียงกันใน
ทุกๆ ปี กล่าวคือในแต่ละปีจะมีประมาณร้อยละ
1 เท่านั้น นักเรียนชายมีการเสพยาเสพติด
ชนิดฉีดมากกว่านักเรียนหญิง ในรอบปี พ.ศ.
2553 มีนักเรียนที่เสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา
มีจำนวน 2 รายเท่านั้น

แผนภาพ 7.1.16 แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ในรอบ 4 ปี



เพศสัมพันธ์หลังจากเสพยาเสพติด
พบว่าในรอบปีนี้มีแนวโน้มลดลงทั้งในกลุ่ม
นักเรียนหญิง-นักเรียนชาย นักเรียนหญิงมี
เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่า
นักเรียนชาย อย่างไรก็ตามจำนวนของนักเรียน
ที่มีเพศสัมพันธ์ และมีการใช้สารเสพติดด้วยมี
จำนวนน้อยมาก จึงอาจทำให้มองเห็นแนวโน้ม
ไม่ชัดเจนมากนัก

แผนภาพ 7.1.17 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
หลังเสพยาเสพติดในรอบ 4 ปี



การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมี
เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ากลุ่ม
นักเรียนชายมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนกลุ่มนักเรียน
หญิงมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามจำนวน
นักเรียนที่เสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา
มีจำนวนไม่มากนักในแต่ละปี ทำให้แนวโน้ม
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดและ
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ไม่สามารถวิเคราะห์
ให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน



7.2 แนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรอบ 5 ปี

การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และดำเนินการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมทุกๆ ปี รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี ในแต่ละปีได้มีการปรับเปลี่ยนข้อคำถามบ้างเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และบริบทที่เปลี่ยนไปในแต่ละปี รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการรวบรวมข้อมูล

จากแบบสอบถาม (paper based survey) เป็นการตอบแบบสอบถามแบบหน้าเว็บ (web-based survey)

การนำเสนอแนวโน้มพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีนี้ จะนำเสนอในรอบ 5 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2553 เท่านั้น


ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อตามตัวชี้วัดของ UNGASS พบว่ามีแนวโน้มลดลงในกลุ่มนักเรียนชาย แต่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนหญิง

ในกลุ่มนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย ในปี พ.ศ. 2550 นักเรียนชายสามารถตอบคำถามได้ถูกทุกข้อมากกว่านักเรียนหญิงค่อนข้างชัดเจน แต่ในปี พ.ศ. 2551

ทั้งนักเรียนหญิง - ชายมีสัดส่วนของการตอบคำถามได้ถูกทุกข้อใกล้เคียงกัน ในปี พ.ศ. 2552 นักเรียนชายสามารถตอบคำถามได้ถูกทุกข้อมากกว่านักเรียนหญิงเล็กน้อย และในปี พ.ศ. 2553 นักเรียนหญิงสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย อย่างไรก็ตามสัดส่วนของนักเรียนที่สามารถตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ มีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละปี

แผนภาพ 7.2.1 แนวโน้มของความรู้ที่ถูกต้องตามตัวชี้วัดของ UNGASS



ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์รายข้อตาม
เกณฑ์ของUNGASS พบว่าความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีมาสู่คนได้
และการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้ มี
แนวโน้ม ที่นักเรียนตอบได้ถูกต้องค่อนข้าง
น้อย ทั้งนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย
ส่วนความรู้เกี่ยวกับการมีคู่นอนเพียงคน

เดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีเป็นวิธีหนึ่งในการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ความรู้เกี่ยวกับ
คนที่มองเห็นว่ามียุงพาหะนำเชื้อเอชไอวี
ดีอาจเป็นคนติดเชื้อเอชไอวี และการใช้
ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวี เป็นความรู้ที่นักเรียน
สามารถตอบได้ถูกต้องในสัดส่วนที่ค่อนข้าง
สูง

ตาราง 7.2.1 แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง


ข้อ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2552		พ.ศ. 2553	
		หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
1	การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อ จากโรคเอดส์	90.9	93.2	89.0	90.7	93.3	93.7
2	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์เป็น วิธีหนึ่ง ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์	69.2	73.8	70.7	74.8	71.5	74.5
3	คนที่เรามองเห็นว่ามียุงพาหะนำเชื้อเอชไอวี ดีอาจเป็นคนที่มีเชื้อเอดส์	74.6	71.2	76.2	69.7	71.7	70.8
4	ยุงสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คน	51.2	53.0	40.9	45.1	41.2	44.3
5	การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถ ติดเชื้อเอดส์	52.1	50.1	46.5	47.8	51.3	49.5

เมื่อวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
ตามเกณฑ์ของ UNGASS (ตอบถูกทั้ง
5 ข้อ) พบว่านักเรียนหญิงสามารถตอบ
ได้ถูกต้องอยู่ในระหว่างร้อยละ 9-20
ส่วนนักเรียนชายอยู่ระหว่างร้อยละ 14-19

ในรอบปีนี้ทั้งนักเรียนหญิง และนักเรียน
ชายมีสัดส่วนที่ตอบความรู้ได้ถูกต้องทั้ง
5 ข้อ มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
รอบปีที่ผ่านมา



แผนภาพ 7.2.2 แนวโน้มของความรู้ที่ถูกต้องตามตัวชี้วัดของ UNGASS (ตอบถูกทั้ง 5 ข้อ)




ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์สูงขึ้นประมาณร้อยละ 5 นักเรียนหญิงมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์อยู่ระหว่างร้อยละ 7 – 11 ส่วนนักเรียนชายมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์อยู่ระหว่างร้อยละ 9 – 28

นักเรียนชายมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิงค่อนข้างชัดเจน ยกเว้นในปี พ.ศ. 2551 ที่นักเรียนทั้งผู้หญิง และผู้ชายมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน โดยภาพรวมจะเห็นว่าในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553) นักเรียนมีเพศสัมพันธ์สูงขึ้นในทุกปี

แผนภาพ 7.2.3 แนวโน้มของการมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก



เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่านักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนในรอบปี พ.ศ.2553 สูงขึ้น โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 81-96 ส่วนนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 77-92 ซึ่งจะเห็นว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ส่วนในปี พ.ศ. 2553 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนใกล้เคียงกันกลุ่มนักเรียนชายในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักมากกว่านักเรียนชายค่อนข้างชัดเจน


นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขายบริการทางเพศน้อยมาก และใน 2-3 ปีก่อนหน้านี้ รวมทั้งในปี พ.ศ. 2553 ไม่มีนักเรียนชายคนใดมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่านักเรียนชายไม่นิยมมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ ในรอบปี พ.ศ. 2552 มีนักเรียนชายที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขายบริการ จำนวน 3 ราย

ตาราง 7.2.2 แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ในรอบ 6 ปี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	พ.ศ. 2548		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2550		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2552		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	85.5	76.5	80.6	77.8	85.1	78.7	95.6	78.7	88.7	84.6	93.8	91.5
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	1.8	11.1	0	4.8	8.5	6.4	4.4	10.7	5.7	9.0	4.6	4.8
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	0	4.9	2.8	3.2	2.1	4.3	0	4.0	1.9	2.6	-	-
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	2.5	na	1.6	na	0	na	0	na	3.8	-	-
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	10.9	2.5	16.7	12.7	4.3	10.6	0	6.7	1.9	-	1.5	3.8



แผนภาพ 7.2.4 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในรอบ 7 ปี




การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่าในรอบปี พ.ศ. 2553 มีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนหญิง แต่มีแนวโน้มลดลงในกลุ่มนักเรียนชาย กลุ่มนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร้อยละ 33-66 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 43-62 นักเรียนหญิง

และนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละปี


เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

แผนภาพ 7.2.5 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่อีกหรือแฟน



กลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่อีกหรือแฟนในรอบปีที่ผ่านมา มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนชาย ในกลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน นักเรียนหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่อีกหรือแฟนมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง อยู่ระหว่างร้อยละ 6-33 ส่วนนักเรียนชายใช้ถุงยางอนามัยอยู่ระหว่างร้อยละ 9-30


แผนภาพ 7.2.6 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย



นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคยในรอบปีที่ผ่านมา ในกลุ่มนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพิ่มขึ้น นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่สม่ำเสมอในแต่ละปี กล่าวคือมีการใช้ถุงยางอนามัย 100% จนถึงไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยเลย อย่างไรก็ตามจำนวนของนักเรียนหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคย

ไม่มากนัก สำหรับนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง อยู่ระหว่าง ร้อยละ 40 – 53 และมีแนวโน้มค่อนข้างสม่ำเสมอมากกว่านักเรียนหญิง


แผนภาพ 7.2.7 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน



นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผินในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่สม่ำเสมอ กลุ่มนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งอยู่ระหว่างร้อยละ 0 – 100 ส่วนกลุ่มนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง อยู่ระหว่างร้อยละ 40-57 และมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยสม่ำเสมอมากกว่านักเรียนหญิง




แผนภาพ 7.2.8 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน



กลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพศเดียวกันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าในรอบปี พ.ศ. 2553 มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยลง ทั้งในกลุ่มนักเรียนชาย และในกลุ่มนักเรียนหญิง อย่างไรก็ตามนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพศเดียวกันจำนวนไม่มากนัก และแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยไม่คงที่ในแต่ละปี


แผนภาพ 7.2.9 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการทางเพศ



กลุ่มนักเรียนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งอยู่ระหว่างร้อยละ 50-100 ในรอบปีนี้ มีการใช้ถุงยางอนามัยกับผู้หญิงขายบริการทางเพศเพิ่มขึ้นจากรอบปีที่ผ่านมา

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

แผนภาพ 7.2.10 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด




การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่าในรอบปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนชาย ส่วนนักเรียนหญิงมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดลดลงในกลุ่มนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด อยู่ระหว่างร้อยละ 38-58 ส่วนกลุ่มนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 49-68 นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดน้อยกว่านักเรียนชายในรอบ 7 ปี

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน


แผนภาพ 7.2.11 แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน



เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่าในรอบปี พ.ศ. 2553 มีแนวโน้มลดลงในกลุ่มนักเรียนชาย นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 0-7 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายมีร้อยละ 2-13 นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 6 ปี ยกเว้นในรอบปีนี้นักเรียนหญิงมีสัดส่วนมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย



แผนภาพ 7.2.12 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน




การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่า มีแนวโน้มไม่ชัดเจน เนื่องจากมีนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนในแต่ละปีมีจำนวนไม่มากนัก

หมายเหตุ: na = ไม่เข้าข่าย

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แผนภาพ 7.2.13 แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์




นักเรียนที่มีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่าในรอบปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ส่วนนักเรียนหญิงมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ระหว่างร้อยละ 1-11 ส่วนนักเรียนชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ร้อยละ 0-11 นักเรียนหญิง และนักเรียนชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใกล้เคียงกันในแต่ละรอบ

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี


แผนภาพ 7.2.14 แนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา



การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย นักเรียนหญิงมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่างร้อยละ 1-4 นักเรียนชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 3-8 นักเรียนชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 7 ปี

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

แผนภาพ 7.2.15 แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือน พบว่าในรอบปีนี้นักเรียนมีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งในกลุ่มนักเรียนชาย และในกลุ่มนักเรียนหญิง นักเรียนหญิงมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อยู่ระหว่างร้อยละ 31-36 ส่วนนักเรียนชาย อยู่ระหว่างร้อยละ 40-62 นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 5 ปี



พฤติกรรมการใช้สารเสพติด


แผนภาพ 7.2.16 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในรอบปีที่ผ่านมา



พฤติกรรมการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าในรอบปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มนักเรียนชาย นักเรียนหญิงมีการใช้ สารเสพติดร้อยละ 1-5 นักเรียนชายมีการใช้สารเสพติดร้อยละ 7-13 นักเรียนชายมีการใช้สารเสพติดมากกว่านักเรียนหญิงอย่างชัดเจนในรอบ 6 ปี

เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


แผนภาพ 7.2.17 แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์



หมายเหตุ: คิดสัดส่วนในกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

การมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่าเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีแนวโน้มลดลง ทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 15-37 นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อยู่ระหว่างร้อยละ 20-47 นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิงเล็กน้อย

แผนภาพ 7.2.18 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




หมายเหตุ: คัดสรรส่วนในกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และหลังดื่ม

น้อยกว่านักเรียนชาย ยกเว้นในปี พ.ศ.2551 ที่นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนชาย ส่วนในปี พ.ศ. 2552 นักเรียนหญิง-ชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งใกล้เคียงกัน สำหรับปีนี้นักเรียนชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิงประมาณ 1 เท่า

เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด


แผนภาพ 7.2.19 แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด



การมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีจำนวนน้อยมาก จึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นแนวโน้มได้อย่างชัดเจนมากนัก นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่านักเรียนหญิง นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ร้อยละ 2-23 ส่วนในปี พ.ศ. 2552 มีแนวโน้มมากขึ้นแตกต่างในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา แต่ในปีพ.ศ. 2553 มีแนวโน้มใกล้เคียงกันกับ 3-5 ปีที่ผ่านมา



แผนภาพ 7.2.20 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
หลังเสพยาเสพติด



การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีน้อยมาก ซึ่งไม่สามารถเห็นแนวโน้มได้ ในปี พ.ศ. 2551 มีนักเรียนชายเพียง 1 คนเท่านั้นที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

หมายเหตุ: จำนวนของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีจำนวนน้อยมากเพียง 1 – 2 รายเท่านั้น (ยกเว้นในปี พ.ศ. 2552 มีนักเรียนหญิง จำนวน 2 ราย และนักเรียนชาย จำนวน 6 ราย และปี พ.ศ. 2553 เป็นนักเรียนหญิง จำนวน 7 ราย และนักเรียนชาย จำนวน 28 ราย)

7.3 แนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ในรอบ 5 ปี

การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และดำเนินการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมทุกๆ ปี รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี ในแต่ละปีได้มีการปรับเปลี่ยนข้อคำถามบ้างเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และบริบทที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีรวมทั้งปรับเปลี่ยน

วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (paper based survey) เป็นการตอบแบบสอบถามแบบหน้าเว็บ (web-based survey)

การนำเสนอแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีเป็นการนำเสนอในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ.2553

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์


ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS เป็นรายข้อ พบว่า ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ จำนวน 5 ข้อ ตามเกณฑ์ของ UNGASS มีแนวโน้มลดลงในทุกข้อ อย่างไรก็ตามเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เป็นความรู้ที่

นักเรียนสามารถตอบได้ถูกต้องในสัดส่วนที่สูงในทุกๆ ปี ส่วนเรื่องการติดต่อโดยยุงเป็นพาหะ และการรับประทานอาหารร่วมกัน ยังมีสัดส่วนตอบได้ถูกต้องน้อยทั้งๆ ที่มีการรณรงค์เรื่องนี้มาโดยตลอดเวลา

ตาราง 7.3.1 แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง

ข้อที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2552	พ.ศ.2553
1	การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคเอดส์	89.0	87.5	87.4
2	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์	62.9	67.6	63.7
3	คนที่เรามองเห็นว่ามียุงกัดหรือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีอาจเป็นคนที่มีเชื้อเอดส์	63.0	63.8	62.3
4	ยุงสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คน	45.8	44.1	37.3
5	การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถติดเชื้อเอดส์	43.5	44.2	39.4

แผนภาพ 7.3.1 แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อตามตัวชี้วัด UNGASS



นักเรียนที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ได้ถูกต้องทั้ง 5 ข้อ พบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิง และในกลุ่มนักเรียนชาย และในแต่ละปี ทั้งนักเรียนหญิง-ชายสามารถตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อตามเกณฑ์ของ UNGASS อยู่ระหว่าง 5-16




ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ พบว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนหญิง และลดลงเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนชาย ในภาพรวมนักเรียนมีประสบการณ์ทางเพศประมาณ ร้อยละ 21-43 นักเรียนหญิงมีประสบการณ์ทางเพศอยู่ระหว่างร้อยละ 16-39 ส่วนนักเรียนชายมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้วอยู่ระหว่างร้อยละ 26-51 นักเรียนชายมีประสบการณ์ทางเพศมากกว่า


นักเรียนหญิง มาโดยตลอด ยกเว้นในรอบปีนี้ (พ.ศ. 2553) ที่นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน โดยในภาพรวมในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีแนวโน้มการมีประสบการณ์ทางเพศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนหญิงจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมากกว่านักเรียนชาย

แผนภาพ 7.3.2 แนวโน้มของประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 7 ปี



เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

แผนภาพ 7.3.3 เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรัก หรือแฟน



เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าในกลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มสูงขึ้นในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา และลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2552 ส่วนในกลุ่มนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรัก หรือแฟน มีแนวโน้มสูงขึ้น ยกเว้นในปี พ.ศ.2550 ที่มีแนวโน้มลดลงมากกว่าในรอบปีอื่นๆ

สำหรับปี พ.ศ. 2553 นักเรียนชายมีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนสูงขึ้น แต่ลดลงในกลุ่มนักเรียนหญิง ทำให้ในรอบปีนี้มีนักเรียนหญิง-ชายมีสัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรัก/แฟนใกล้เคียงกัน

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 พบว่านักเรียนหญิงมีคู่นอนครั้งแรกที่เป็นคูรักหรือแฟน ร้อยละ 88 – 95 ในกลุ่มนักเรียนชาย พบว่ามีคู่นอนครั้งแรกที่เป็นคูรักหรือแฟน ร้อยละ 75 – 90 นักเรียนชายมีคู่นอนครั้งแรกเป็นผู้หญิงที่เป็นคูรักหรือแฟนน้อยกว่านักเรียน


หญิง อย่างไรก็ตามนักเรียนชายมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงที่เป็นคูรักหรือแฟนมากขึ้นในทุกๆ ปี ยกเว้นในปี พ.ศ. 2552 ที่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ในกลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์กับคูรักน้อยลงในปี พ.ศ. 2553



ตาราง 7.3.2 แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก กับบุคคลประเภทต่างๆ

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2550		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2552		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คู่รัก/แฟน	92.9	81.6	87.7	84.4	91.4	86.2	94.5	83.2	90.1	89.9
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	0	7.5	0	9.4	5.2	4.8	2.1	7.0	2.6	8.3
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	1.0	6.0	4.9	1.6	1.1	2.1	0.7	0	1.0	1.0
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	1.5	na	0.8	na	4.3	0	2.2	-	-
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	6.1	3.5	7.4	3.9	2.3	2.7	2.7	7.6	6.3	2.9

แผนภาพ 7.3.4 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก




การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่าในรอบปีที่มีการใช้ถุงยางอนามัยสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนหญิงและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนชาย นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกใกล้เคียงกันกับนักเรียนชายในรอบ 7 ปี สำหรับกลุ่มนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัย

เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ระหว่าง ร้อยละ 25-57 ส่วนนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ระหว่างร้อยละ 38-66 โดยภาพรวมแล้วการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกค่อนข้างคงที่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน)

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา


แผนภาพ 7.3.5 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่อรักหรือแฟน



แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้นเล็กน้อย นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งร้อยละ 9-19 ส่วนนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่อรัก

หรือแฟนร้อยละ 15-30 นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อรักหรือแฟนมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 7 ปี

แผนภาพ 7.3.6 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย




การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคยในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้น ทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่านักเรียนหญิง ยกเว้นในปี พ.ศ. 2551 ที่นักเรียนหญิง-ชาย มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งใกล้เคียงกัน นักเรียนหญิงมีการ

ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง อยู่ระหว่างร้อยละ 20-40 ส่วนกลุ่มนักเรียนชายใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง อยู่ระหว่างร้อยละ 35-53




แผนภาพ 7.3.7 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน



นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผินมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้น แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งจึงมีลักษณะไม่สม่ำเสมอ นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผินแตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละปี กล่าวคือ ตั้งแต่ร้อยละ 10 จนถึง 100 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชาย มีการใช้ถุงยาง-


อนามัยทุกครั้งกับผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน อยู่ระหว่างร้อยละ 42 – 67 โดยเฉพาะในรอบปี พ.ศ. 2553 ที่มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนที่รู้จักกันผิวเผินน้อยกว่าในรอบปีอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผินมากกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิง ยกเว้นในปีพ.ศ. 2549

แผนภาพ 7.3.8 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกัน



การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกัน มีแนวโน้มลดลง ทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิง และในกลุ่มนักเรียนชาย นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เพศเดียวกันมากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิง นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งอยู่ระหว่างร้อยละ 3-56 ส่วนนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งอยู่ระหว่างร้อยละ 0-25


แผนภาพ 7.3.9 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
กับผู้หญิงขายบริการทางเพศ



สำหรับนักเรียนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนน้อยมากเช่นกันในทุกๆ ปี ดังนั้นแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งอาจไม่ชัดเจนนัก ในปี พ.ศ. 2552 มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ 100% แต่มีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2553

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

แผนภาพ 7.3.10 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด




ในรอบปีนี้เพศสัมพันธ์ในครั้งล่าสุดมีแนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยลดลงในกลุ่มนักเรียนชาย ส่วนนักเรียนหญิงมีแนวโน้มสูงขึ้น นักเรียนชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 7 ปี สำหรับนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดอยู่

ระหว่างร้อยละ 25-57 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 38 - 66




เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

แผนภาพ 7.3.11 แนวโน้มของเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน



เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียนชาย ส่วนในกลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มลดลง นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิงทุกปี นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 1-4 ส่วนนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน ร้อยละอยู่ระหว่าง 3-6


แผนภาพ 7.3.12 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน



การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน นั้นมีแนวโน้มที่ขึ้นๆ ลงๆ ไม่มีรูปแบบชัดเจนเนื่องจากจำนวนนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนมีจำนวนไม่มากนักในแต่ละรอบ

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


แผนภาพ 7.3.13 แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์



อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่าในรอบปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย นักเรียนหญิงมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ระหว่าง ร้อยละ 1-14 ส่วนกลุ่มนักเรียนชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อยู่ระหว่างร้อยละ 2-12

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

แผนภาพ 7.3.14 แนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบ 6 ปี




การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงทั้งนักเรียนหญิง-ชาย นักเรียนชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 7 ปี ยกเว้นในปี พ.ศ. 2550 ที่มีสัดส่วนเท่าๆ กัน ทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิง-ชาย นักเรียนหญิงมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี อยู่ระหว่างร้อยละ 2-7 ส่วนนักเรียนชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีอยู่ระหว่างร้อยละ 2-19



พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


แผนภาพ 7.3.15 แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์



การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งนักเรียนหญิงและชาย นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาอยู่ระหว่างร้อยละ 59-67 ส่วนนักเรียนหญิงมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 42-60 นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิงในรอบ 5 ปี

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด

แผนภาพ 7.3.16 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติด




การใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มการเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายสูงขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนชาย ส่วนกลุ่มนักเรียนหญิงแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง นักเรียนชายมีการใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 6 ปี นักเรียนหญิงมีการใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่างร้อยละ

1-10 ส่วนนักเรียนชายมีการใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ ระหว่างร้อยละ 4-21 (คิดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา)

เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


แผนภาพ 7.3.17 แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์



การมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีแนวโน้มลดลง นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 17-40 ในรอบปี พ.ศ. 2553 มีสัดส่วนน้อยกว่าทุกๆ ปี ส่วนนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 18 -42

นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใกล้เคียงกับนักเรียนชายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553)

แผนภาพ 7.3.18 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




ในกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้นทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิงและในกลุ่มนักเรียนชาย นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 8-29 ส่วนนักเรียนชายมีการใช้ถุงยาง

อนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 7-26 นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิง ยกเว้นในปี พ.ศ. 2550 กับปี พ.ศ. 2552 ที่นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย



เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด


แผนภาพ 7.3.19 แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด



การมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ามีแนวโน้มลดลงในกลุ่มนักเรียนหญิง ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดอยู่ระหว่างร้อยละ 0-21 ส่วนนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดอยู่ระหว่างร้อยละ 3 - 20 นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่า

กลุ่มนักเรียนหญิงในรอบ 4 ปี ยกเว้นในปี พ.ศ. 2552 นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย

แผนภาพ 7.3.20 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด



การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ามีแนวโน้มไม่สม่ำเสมอ นักเรียนชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิง ทั้งนี้เนื่องจากมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดไม่ชัดเจน

7.4 แนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรทั่วไป ในรอบ 3 ปี

การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มประชากรทั่วไปในครั้งนี้เป็นรอบที่ 3 โดยครั้งแรกได้ทำการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2549

ในการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้กำหนดกำหนดอายุผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุระหว่าง

15-29 ปี ส่วนในปี พ.ศ. 2551 กับปี พ.ศ. 2553 ได้ขยายกลุ่มอายุของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 15-49 ปี ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2553 จึงมีอายุเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2549 ประมาณ 10 ปี

ตาราง 7.4.1 อายุของกลุ่มประชากรทั่วไป ในรอบ 3 ปี

ลักษณะประชากร	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	ชาย	หญิง
จำนวน	548	541	589	557	493	509
อายุเฉลี่ย	20.6	20.5	32.4	30.4	32.3	31.9
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	4.3	4.4	10.2	10.2	10.0	10.0
อายุน้อยสุด - อายุสูงสุด	15 - 29		15 - 49		15-49	

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS จำนวน 5 ข้อ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกันในรอบ 2 ปีก่อนมีแนวโน้มลดลงในทุกข้อ ในภาพรวมมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องในระหว่างร้อยละ 62-90

ในรอบปี พ.ศ. 2553 มีแนวโน้มที่


ตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทั้ง 5 ข้อลดลง โดยภาพรวมกลุ่มประชากรทั่วไปสามารถตอบได้ถูกต้องทั้ง 5 ข้ออยู่ระหว่างร้อยละ 34-41 โดยกลุ่มผู้หญิงสามารถตอบได้ถูกต้องทั้ง 5 ข้อ มากกว่ากลุ่มผู้ชายทั้ง 2 รอบ



ตาราง 7.4.2 ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง

ข้อ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	พ.ศ. 2551		รวม	พ.ศ. 2553		รวม
		หญิง	ชาย		หญิง	ชาย	
1	การใช้ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้	89.5	90.8	90.1	90.7	87.7	89.3
2	การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพียงคนเดียวและคนนั้นก็ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	83.4	79.7	81.6	82.0	74.1	78.0
3	บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้	78.4	70.0	74.3	74.3	68.8	71.5
4	ยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้	66.0	63.9	65.0	61.0	62.9	62.0
5	กินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	73.7	71.5	72.0	69.5	71.4	70.4

แผนภาพ 7.4.1 ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง



เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

สำหรับในรอบปี พ.ศ. 2553 ได้มีการเปลี่ยนข้อความคู่เพศสัมพันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ คู่เพศสัมพันธ์ที่เป็นบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคยเป็น “เพื่อน/กิ๊ก” ส่วนคนที่รู้จักกันผิวเผินเป็น “คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก” ส่วนคนที่เป็นเพศเดียวกันไม่มีคำถามในส่วนนี้ แต่เพิ่ม “คนที่รู้จักกันทาง Internet/โทรศัพท์” ซึ่งเป็นข้อความสำหรับคู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรก/ในรอบปี และในครั้งล่าสุดด้วย จึงอาจทำให้ความเข้าใจของผู้ตอบคำถามไม่ตรงกันกับในรอบปีก่อนหน้านี้ด้วย

กลุ่มประชากรทั่วไปที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้ว พบว่าในรอบปีนี้กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนลดลงเล็กน้อย กับคูนอนประเภทอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนกลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนสูงขึ้น

กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนน้อยกว่าในกลุ่มผู้หญิงอย่างชัดเจนในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ตาราง 7.4.3 แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	93.1	67.2	97.3	67.9	94.5	75.0
เพื่อนหรือกิ๊ก	3.1	13.2	1.5	16.6	1.9	11.6
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	1.4	10.0	0.8	4.7	2.8	5.6
คนที่รู้จักกันผ่าน Internet/ โทรศัพท์	2.4	5.3	0.4	1.1	3.0	7.6
ผู้ขายบริการทางเพศ	na	4.1	na	9.5	-	0.3



เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนทั้งกลุ่มผู้หญิง และกลุ่มของผู้ชาย กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี น้อยกว่ากลุ่มผู้ชาย


ในกลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปีอยู่ระหว่างร้อยละ 2-7 ส่วนในกลุ่มผู้ชายอยู่ระหว่างร้อยละ 5-17

อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในกลุ่มผู้หญิง และผู้ชาย ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่ากลุ่มผู้ชาย อย่างไรก็ตามตามฐานอายุของกลุ่มประชากรทั่วไปในรอบปี พ.ศ. 2549 มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ถ้าจะเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2553 ที่มีฐานอายุของกลุ่มตัวอย่างเท่ากันก็พบว่าค่าเฉลี่ยของอายุที่มีเพศสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน

ตาราง 7.4.4 แนวโน้มอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
9 – 14 ปี	6.9	17.0	3.7	7.9	1.8	5.0
15 – 19 ปี	65.3	71.4	45.0	60.0	43.4	55.4
20 ปีขึ้นไป	27.8	11.6	51.3	32.1	54.8	39.6
อายุเฉลี่ย	18.2	17.3	20.2	18.4	20.8	19.3
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2.7	2.5	4.4	3.7	4.8	4.3

แผนภาพ 7.4.2 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก



การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่าในรอบปี มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยสูงขึ้น ทั้งกลุ่มผู้หญิง และผู้ชาย และมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผู้ชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่ากลุ่มผู้หญิงเล็กน้อย

การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกรอบ 3 ปี ในกลุ่มผู้หญิงอยู่ระหว่างร้อยละ 32-46 ส่วนในกลุ่มผู้ชายอยู่ระหว่างร้อยละ 38-47

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคูรักรหรือแฟนลดลงเล็กน้อย แต่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ สูงขึ้น

กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับคูรักรหรือแฟนในรอบปีที่ผ่านมา น้อยกว่าในกลุ่มผู้หญิง

แต่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคนที่รู้จักกันคุ้นเคย คนที่รู้จักกันผิวเผิน และกับคนที่ เป็นเพศเดียวกันสูงกว่าในกลุ่มผู้หญิง เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับผู้หญิงที่ขาย บริการทางเพศมีแนวโน้มลดลงในทุกปี

ตาราง 7.4.5 แนวโน้มเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับบุคคลประเภทต่างๆ

เพศสัมพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมา	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรักร/แฟน	95.1	86.5	98.9	91.3	94.4	93.1
เพื่อนหรือกิ๊ก	8.5	41.6	2.1	24.3	7.2	20.9
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	3.9	35.6	1.6	14.5	6.0	15.2
คนที่รู้จักกันผ่านInternet/โทรศัพท์	6.0	11.7	0.9	3.6	1.6	7.7
ผู้ขายบริการทางเพศ	na	18.0	na	10.8	na	7.4

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับคูรักรหรือแฟน มีการใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้งอยู่ระหว่างร้อยละ 12-14 ซึ่งมีความใกล้เคียงกัน ในรอบ 3 ปี ส่วนกลุ่มผู้ชาย

มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักรหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 16-19

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนที่เป็นคูรักรหรือแฟน มีสัดส่วนน้อยกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ ผู้ชายมีการใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้งมากกว่ากลุ่มผู้หญิง



ตาราง 7.4.6 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อเพศสัมพันธ์ กับบุคคลประเภทต่างๆ

การใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	13.8	15.9	12.2	19.0	13.3	17.2
เพื่อนหรือกิ๊ก	50.0	43.9	33.3	56.4	34.8	42.5
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	45.5	42.0	57.1	56.7	31.6	49.1
คนที่รู้จักกันผ่านInternet/โทรศัพท์	0	28.2	20.0	53.3	33.3	57.5
ผู้ขายบริการทางเพศ	na	58.3	na	80.0	na	55.6

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด


เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่ากลุ่มผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟนสูงขึ้น กับคู่นอนประเภทอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์

ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟนมากกว่ากลุ่มผู้ชาย ค่อนข้างชัดเจน สำหรับกลุ่มผู้ชายเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับผู้ขายบริการทางเพศ พบว่ามีแนวโน้มลดลงมาก

ตาราง 7.4.7 แนวโน้มเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด กับคู่นอนประเภทต่างๆ

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	95.1	75.1	98.9	86.5	95.3	88.0
เพื่อนหรือกิ๊ก	0.7	9.6	0.2	7.0	1.3	4.6
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	1.1	7.2	0	1.9	0.3	0.9
คนที่รู้จักกันผ่านInternet/โทรศัพท์	3.2	5.1	0.7	1.2	1.6	3.2
ผู้ขายบริการทางเพศ	na	30.0	na	3.4	-	1.7

แผนภาพ 7.4.3 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย




การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย พบว่าในรอบปีนี้มีแนวโน้มลดลงในกลุ่มผู้ชาย แต่มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยสูงขึ้นในกลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้ชายมีการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายมากกว่ากลุ่มผู้หญิงประมาณ 1 เท่า

กลุ่มผู้หญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายอยู่ระหว่างร้อยละ 21-28 ส่วนในกลุ่มผู้ชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยอยู่ระหว่างร้อยละ 34-46

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

แผนภาพ 7.4.4 แนวโน้มของเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน




เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่าในรอบปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ชาย ส่วนในกลุ่มผู้หญิงมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงจากรอบที่แล้ว กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนมากกว่ากลุ่มผู้หญิง

กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินหรือสิ่งของอยู่ระหว่างร้อยละ 1-4 ส่วนในกลุ่มผู้ชายอยู่ระหว่างร้อยละ 3-8




แผนภาพ 7.4.5 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน



การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งลดลงทั้งในกลุ่มผู้หญิง และกลุ่มผู้ชาย อย่างไรก็ตามจำนวนของผู้ที่มีเพศสัมพันธ์มีไม่มากนักในแต่ละปี (ในรอบปีนี้มีจำนวน 25 รายเท่านั้น) จึงเห็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยชัดเจนมากนัก

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แผนภาพ 7.4.6 แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์




อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย ในปี พ.ศ. 2549 และปีพ.ศ.2553 กลุ่มผู้หญิงมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้อยกว่ากลุ่มผู้ชาย ส่วนใน ปี พ.ศ. 2551 กลุ่มผู้หญิง และกลุ่มผู้ชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน

กลุ่มผู้หญิงมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ระหว่างร้อยละ 4-9 ส่วนในกลุ่มผู้ชายอยู่ระหว่างร้อยละ 4-14

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

แผนภาพ 7.4.7 แนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา




การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย ในรอบ 2 ปี ผู้หญิงมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มผู้ชาย

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีอยู่ระหว่างร้อยละ 21-32 ในกลุ่มผู้หญิง ส่วนในกลุ่มผู้ชายอยู่ระหว่างร้อยละ 26-28 ซึ่งค่อนข้างมีแนวโน้มคงที่

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

แผนภาพ 7.4.8 แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มลดลง ทั้งกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย กลุ่มผู้ชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มผู้หญิงประมาณ 1 เท่าตัว

ในกลุ่มผู้หญิงมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 40-44 ส่วนในกลุ่มผู้ชายอยู่ระหว่างร้อยละ 51-72



พฤติกรรมการใช้สารเสพติด

แผนภาพ 7.4.9 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติด




การใช้สารเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ กัญชา/กระท่อม ยาบ้า เฮโรอีน โคเคน ยาไอ้ ทินเนอร์/กาว เป็นต้น พบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย กลุ่มผู้หญิงมีการเสพยาเสพติดน้อยกว่ากลุ่มผู้ชายค่อนข้างชัดเจนในรอบ 3 ปี

การเสพยาเสพติดในกลุ่มผู้หญิงอยู่ระหว่างร้อยละ 3-6 ส่วนในกลุ่มผู้ชายอยู่ระหว่างร้อยละ 12-22

เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

แผนภาพ 7.4.10 แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มผู้หญิงอย่างชัดเจน

เพศสัมพันธ์หลังดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มผู้หญิงอยู่ระหว่างร้อยละ 13-41 และในกลุ่มผู้ชายอยู่ระหว่างร้อยละ 27-66

หมายเหตุ: คัดสรรเฉพาะคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

แผนภาพ 7.4.11 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่าในรอบปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มผู้หญิง ส่วนในกลุ่มผู้ชาย มีสัดส่วนเท่ากันกับในรอบที่ผ่านมา กลุ่มผู้ชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงกว่ากลุ่มผู้หญิงในรอบ 3 ปี

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในกลุ่มผู้หญิงอยู่ระหว่างร้อยละ 12-22 และในกลุ่มผู้ชายอยู่ระหว่างร้อยละ 25-30

เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด

แผนภาพ 7.4.12 แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด




หมายเหตุ: คัดสรรเฉพาะคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และเคยเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าในรอบปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ในกลุ่มผู้ชาย ส่วนในกลุ่มผู้หญิงมีแนวโน้มลดลงจากรอบปีที่แล้ว ในปี พ.ศ. 2551 กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่าในกลุ่มผู้ชาย อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสพยาเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์มีจำนวนไม่มากนัก ในรอบปีนี้มีจำนวน 28 รายเท่านั้นที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด



แผนภาพ 7.4.13 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด



การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ามีแนวโน้มที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากมีจำนวนน้อย

7.5 แนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ ในรอบ 5 ปี

อายุของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการในแต่ละปีมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2547 ได้กำหนดอายุผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วง 15-29 ปี ส่วนในปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2553 ได้ขยายกลุ่มอายุ จาก 15-29 ปี เป็น 15-49 ปี

ดังนั้นอายุเฉลี่ยของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการจึงมีความแตกต่างกันใน 2 ช่วงที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบในช่วงที่ 2 (3 ปีหลัง) ในรอบปีนี้คนงานมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าในรอบ 2 ปีก่อนหน้านี้

ตาราง 7.5.1 อายุเฉลี่ยของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่สำรวจในแต่ละปี

อายุ	พ.ศ. 2545	พ.ศ. 2546	พ.ศ. 2547	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2553
อายุเฉลี่ย	24.2	24.4	22.9	28.1	29.5	31.1
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	3.1	2.9	3.2	7.2	8.1	8.1
อายุน้อยที่สุด	15	18	15	15	15	17
อายุมากที่สุด	29	29	29	49	49	49

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ความรู้เรื่องโรคเอดส์ พบว่ามีแนวโน้มตอบได้ถูกต้องสูงขึ้นเล็กน้อย ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ได้ มีแนวโน้มคงที่ ส่วนเรื่องคนที่มีความแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้ และยังเป็นพาหะในการนำเชื้อเอชไอวี มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนเรื่องการรับประทานอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้ มีแนวโน้มตอบได้ถูกต้องลดลง

ตาราง 7.5.2 ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง

ข้อ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	พ.ศ. 2551		รวม	พ.ศ. 2553		รวม
		หญิง	ชาย		หญิง	ชาย	
1	การใช้ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้	90.4	94.5	92.5	91.9	91.2	91.6
2	การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพียงคนเดียวและคนนั้นก็ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	80.8	77.3	79.1	82.3	76.8	79.9
3	บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้	74.9	71.1	73.0	79.3	78.1	78.8
4	ยังเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้	54.3	62.1	58.2	62.1	65.9	63.7
5	กินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	78.8	75.8	77.3	72.4	75.8	73.8
ตอบถูกทุกข้อ		34.5	36.7	35.6	37.4	38.0	37.7



เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ในรอบปี พ.ศ. 2553 ได้มีการเปลี่ยนคำถามประเภทของคู่นอนจากคนที่รู้จักกันคุ้นเคยเป็น “เพื่อนหรือกิ๊ก” บุคคลที่รู้จักกันผิวเผินเป็น “คนที่เพิ่งคนกันครั้งแรก” และตัดคู่นอนที่เป็นเพศเดียวกันออก โดยเปลี่ยนเป็น คู่นอนที่รู้จักกันทาง Internet หรือทางโทรศัพท์แทน

กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์มาก่อน พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงมีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟน ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละปี กล่าวคือ อยู่ในระหว่างร้อยละ 95 – 100 (ในปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2547 ไม่ได้ถามคู่นอนที่เป็นบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย)

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟน

ส่วนกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่างร้อยละ 68 – 79 ของพนักงานในสถานประกอบการหญิงมีสัดส่วนมากกว่าพนักงานในสถานประกอบการชายอย่างเห็นได้ชัดเจนในทุกๆ ปี

สำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของพนักงานในสถานประกอบการชายกับหญิงขายบริการทางเพศไม่มากนัก อยู่ระหว่างร้อยละ 4-8 เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันมีประมาณร้อยละ 1 ในรอบ 5 ปี ส่วนเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคนที่รู้จักกันทาง Internet/โทรศัพท์ ในปีนี้ยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก

ตาราง 7.5.3 แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกกับบุคคลประเภทต่างๆ

คู่เพศสัมพันธ์	พ.ศ. 2545		พ.ศ. 2546		พ.ศ. 2547		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2550		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	95.1	72.6	99.6	75.8	97.9	78.6	97.4	68.1	95.6	72.5	96.1	76.3	9.6	76.3
เพื่อนหรือกิ๊ก	na	na	na	na	na	na	1.2	16.9	2.6	15.0	1.1	11.4	1.1	11.4
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	1.0	17.4	0.4	15.9	1.2	16.4	0.5	7.6	1.3	5.6	2.6	6.3	2.6	6.3
คนที่รู้จักกันผ่าน Internet/โทรศัพท์	1.5	0.7	na	na	0.9	1.0	0.9	1.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5
ผู้ขายบริการทางเพศ	na	8.2	na	5.9	na	3.9	na	6.3	na	6.3	0	5.6	0	5.6


การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยอยู่ระหว่างร้อยละ 21 – 40 ในปี พ.ศ.2553 มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกสูงที่สุด

สำหรับกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ระหว่างร้อยละ

37 – 46 ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมามีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่เปลี่ยนแปลงเลย

อย่างไรก็ตาม จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าพนักงานในสถานประกอบการหญิง มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยกว่าพนักงานในสถานประกอบการชาย ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา

แผนภาพ 7.5.1 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก



เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

การสำรวจพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาในรอบ 3 ปีแรก (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547) ไม่ได้แยกประเภทคู่นอนที่เป็นบุคคลรู้จักกันคุ้นเคย จึงมีประเภทคู่นอนอยู่ 4 ประเภทเท่านั้น ส่วนในปี พ.ศ. 2549 กับปี พ.ศ. 2551 มีประเภทคู่นอน 5 ประเภท และในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการปรับเปลี่ยนประเภทคู่นอนอีกครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้นในการวิเคราะห์แนวโน้มจะเปรียบเทียบอาจมีรายละเอียด

ที่แตกต่างกันอยู่บ้างในแต่ละรอบของการศึกษา

กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่รักหรือแฟนอยู่ระหว่าง ร้อยละ 86 – 100 มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับผู้ชายที่เพิ่มรู้จักกันครั้งแรกสูงขึ้นเล็กน้อย

กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชายพบว่า มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่รักหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 89 – 99 และกับ



ผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศอยู่ระหว่าง ร้อยละ 7-13 ในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชายมีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมากับผู้หญิงขายบริการลดลงเล็กน้อย

ในรอบ 6 ปีที่สำรวจพฤติกรรมทางเพศ

ของพนักงานในสถานประกอบการชายมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่เป็นคู่อริหรือแฟนน้อยกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงเล็กน้อย แต่เพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทอื่นๆ เพศชายจะมีสัดส่วนมากกว่าเพศหญิงในทุกปี

ตาราง 7.5.4 แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับคู่อริหรือแฟนประเภทต่างๆ

คู่อริหรือแฟน	พ.ศ. 2545		พ.ศ. 2546		พ.ศ. 2547		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คู่อริ/แฟน	86.4	89.2	98.1	93.8	99.7	98.8	99.0	97.5	98.6	94.9	98.6	96.1
เพื่อนหรือกิ๊ก	na	na	na	na	na	na	5.0	28.4	6.5	23.4	6.0	28.2
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	3.4	9.5	6.1	26.7	2.2	24.0	1.0	17.0	0.6	15.8	4.8	15.0
คนที่รู้จักกันผ่าน Internet/โทรศัพท์	na	na	2.4	3.1	1.6	2.1	2.1	3.0	2.0	2.1	1.9	6.1
ผู้ขายบริการทางเพศ	na	10.4	na	12.8	na	9.3	na	10.1	na	8.6	1.9	7.4

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อริหรือแฟนประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อริหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 4-11 สำหรับกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชาย พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อริหรือแฟนในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่างร้อยละ 11-20

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งระหว่างพนักงานในสถาน

ประกอบการชายและหญิงพบว่าพนักงานในสถานประกอบการชาย มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่าพนักงานหญิงในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่ได้มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนในแต่ละประเภทของคู่นอน แต่พอที่จะประเมินได้ว่าพนักงานในสถานประกอบการ มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประจำ (คู่อริ/แฟน) น้อยกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ

ตาราง 7.5.5 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง กับคูเพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

การใช้ถุงยาง- อนามัย(ทุกครั้ง)	พ.ศ. 2545		พ.ศ. 2546		พ.ศ. 2547		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	5.3	10.7	8.2	13.2	7.0	16.9	4.2	13.5	10.8	20.3	11.3	13.7
เพื่อนหรือกิ๊ก	na	na	na	na	na	na	26.3	42.9	26.1	54.5	16.0	35.5
คนที่เพิ่งพบกัน ครั้งแรก	16.7	56.5	23.1	50.7	0	57.7	25.0	44.8	50.0	52.9	10.0	40.4
คนที่รู้จักกันผ่าน Internet/โทรศัพท์	na	na	2.4	3.1	40.0	16.7	12.5	33.3	0	11.1	25.0	43.5
ผู้ขายบริการทางเพศ	na	96.0	na	69.7	na	90.0	na	82.5	na	83.8	12.5	53.6

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าคู่นอนของกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงที่เป็นคูรักหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 89-98 สำหรับคู่นอนครั้งล่าสุดที่เป็นคู่นอนประเภทอื่นๆ มีเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น

ในกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชาย พบว่ามีคู่นอนครั้งล่าสุดที่เป็นคูรักหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 86-91 มีคู่นอนประเภทผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (เพื่อนหรือกิ๊ก) และคู่นอนครั้งล่าสุดที่เป็นผู้ขายบริการทางเพศ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนน้อยมาก

ตาราง 7.5.6 แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด กับคูเพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ


ประเภทคู่นอน	พ.ศ. 2546		พ.ศ. 2547		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	96.2	86.4	98.4	91.3	97.9	89.4	98.6	88.9	98.0	89.6
เพื่อนหรือกิ๊ก	na	na	na	na	1.8	6.1	0	7.2	1.0	8.0
คนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก	0.5	7.0	0.6	5.7	0.3	1.5	0	2.3	0.5	1.4
คนที่รู้จักกันผ่าน Internet/โทรศัพท์	2.4	0.8	0.9	0.9	0.3	1.0	1.1	0.2	-	0.8
ผู้หญิงขายบริการ	na	2.7	na	2.1	na	2.0	na	1.4	0.5	0.3



การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ครั้งล่าสุด พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิง มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยสูงขึ้น พนักงานในสถานประกอบการหญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 13-25 ส่วนกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ

ชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด อยู่ระหว่างร้อยละ 26-33 พนักงานในสถานประกอบการชาย มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมากกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงค่อนข้างชัดเจนในรอบ 5 ปี

แผนภาพ 7.5.2 แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด




เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่างร้อยละ 1-3 และกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน อยู่ระหว่างร้อยละ 2-5 ในปี พ.ศ. 2553 มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลก-

กับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนสูงขึ้นในกลุ่มเพศชายแต่ลดลงเล็กน้อยในกลุ่มเพศหญิง กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่าในกลุ่มผู้หญิง ยกเว้นในปี พ.ศ. 2551 ที่มีสัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน ทั้งกลุ่มผู้หญิงและผู้ชายสัดส่วนใกล้เคียงกัน

แผนภาพ 7.5.3 แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน
ในรอบปีที่ผ่านมา




อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การมีปัสสาวะแสบขัด มีตุ่มหนองที่อวัยวะเพศ เป็นต้น พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6-15

ส่วนกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชาย มีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ อยู่ระหว่างร้อยละ 4-10 ในปี พ.ศ. 2553 อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยทั้งในเพศหญิง และเพศชาย พนักงานในสถานประกอบการเพศหญิง มีแนวโน้มอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเพศชาย ในรอบ 5 ปี

แผนภาพ 7.5.4 แนวโน้มอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในรอบปีที่ผ่านมา






การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่างร้อยละ 26-37 ส่วนกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีอยู่ระหว่างร้อยละ 28-36 ในปี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2549

พนักงานในสถานประกอบการหญิงมีสัดส่วนการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชาย แต่ในปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2553 พนักงานในสถานประกอบการชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิง

แผนภาพ 7.5.5 แนวโน้มการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา




พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงมีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ลดลง ปี พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 2547 เป็นพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 65-66 ส่วนในปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2553 เป็นพฤติกรรมของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 44-52

สำหรับกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชาย พบว่ามีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาลดลง การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของพนักงานในสถานประกอบการชายในรอบ 5 ปี อยู่ระหว่างร้อยละ 81-88

กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิง


แผนภาพ 7.5.6 แนวโน้มพฤติกรรมการตีมีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 5 ปี



หมายเหตุ: พ.ศ. 2546 – 2547 พฤติกรรมการตีมีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
พ.ศ. 2549 – 2553 พฤติกรรมการตีมีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด

แผนภาพ 7.5.7 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในรอบ 4 ปี



ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงมีการใช้สารเสพติดอยู่ระหว่างร้อยละ 1-3 ส่วนกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชายอยู่ระหว่างร้อยละ 15-18 เพศหญิงมีการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาน้อยกว่าเพศชายค่อนข้างชัดเจน



เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และใช้สารเสพติด

เพศสัมพันธ์หลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นทั้งกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิง และชาย พนักงานในสถานประกอบการหญิง มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อยู่ระหว่างร้อยละ 18-57 และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายอยู่ระหว่างร้อยละ 45-66

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 3-14 สำหรับกลุ่มพนักงาน ในสถานประกอบการชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 16-22 เพศชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

เมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มผู้หญิงในรอบ 5 ปี

เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ากลุ่มพนักงานในสถานประกอบการหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดประมาณร้อยละ 13-32 ในรอบปี พ.ศ. 2553 มีสัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดน้อยกว่าปีอื่นๆ อย่างชัดเจนทั้งเพศหญิง และเพศชาย ส่วนกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการชาย มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดร้อยละ 13-41 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีสัดส่วนไม่มากนัก


สำหรับแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด อาจดูแนวโน้มไม่ชัดเจน เพราะจำนวนผู้ใช้สารเสพติดมีจำนวนไม่มากนัก ทำให้รูปแบบของพฤติกรรมไม่ชัดเจน

ตาราง 7.5.7 แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ
เสพยาเสพติด

พฤติกรรม	พ.ศ. 2546		พ.ศ. 2547		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551		พ.ศ. 2553	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์*	26.0	55.5	31.0	54.4	17.9	44.8	48.5	64.0	56.9	65.7
เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด*	21.1	23.3	32.3	20.2	12.5	12.8	20.0	40.6	2.5	3.8
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	4.9	16.1	11.1	21.3	3.3	17.1	11.5	18.1	14.0	22.1
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	25.0	16.2	0	22.7	29.0	27.3	0	14.3	0	13.3

หมายเหตุ: * คัดสรรส่วนเฉพาะกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

บรรณานุกรม



- กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักงานมัย. (2552). สรุปสถานการณ์เอดส์กรุงเทพมหานครปี 2552 สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2552 จาก <http://203.155.220.217/aids/statistics/stat-1.htm>
- คำนวน อึ้งชูศักดิ์ (มปท). หลักวิชาและการประยุกต์ระบาดวิทยาสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข. นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
- สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (2545). การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 7 กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2545. นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
- “ ” (2546). การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 7 กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2546. นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
- “ ” (2547). การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 5 กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2547. นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
- “ ” (2548). การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 5 กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2548. นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
- “ ” (2549). การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์การติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 4 กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2549. นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน.
- “ ” (2550). การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์การติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 6 กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2550. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง
- “ ” (2551). การศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมที่สัมพันธ์การติดเชื้อเอชไอวีใน 5 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ปี 2551. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง
- “ ” (2552). การศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ใน 7 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ปี 2552. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2552). จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2552 จาก <http://203.157.15.4/index.php?page=5061>

UNAIDS (2009). 2008 Report on the global AIDS epidemic. Retrieved 8 December, 2009, from http://data.unaids.org/pub/Report/2009/2009_epidemic_update_en.pdf

The Behavioral Surveillance Survey of 5 Target Group in Bangkok, 2010



ASEAN Institute for Health Development
MAHIDOL UNIVERSITY

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ (02) 44 19040-3 ต่อ 45 โทรสาร (02) 44 19044
E-MAIL : tepyc@mahidol.ac.th