

รอบที่ 7

การฝึกฝนและเรียนรู้จากพฤติกรรม
ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี
ใน 5 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ปี 2551



โดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ กรมควบคุมโรคและสำนักงาน กสท โทรคมนาคม



การศึกษาแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ
การติดเชื้อเอชไอวีใน 5 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ปี 2551

The Behavioral Surveillance Survey of
5 Target Groups in Bangkok, 2008

ผู้เขียน

รศ.พญ. ศิริกุล อิศรานุกรักษ์

นางสาวบังอร เทพเทียน

ผศ.สมศักดิ์ วงศาवास

Authors

Assoc. Prof. Sirikul Isaranurug

Ms. Bang-on Thepthien

Asst. Prof. Somsak Wongsawass

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ศิริกุล อิศรานุกรักษ์

การศึกษาแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ใน 5 กลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย ปี 2551 = The Behavioral Surveillance Survey of 5 Target Groups in
Bangkok, 2008/ ศิริกุล อิศรานุกรักษ์, บังอร เทพเทียน, สมศักดิ์ วงศาवास นครปฐม: สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551

200 หน้า

1. โรคเอดส์ - - ไทย - - กรุงเทพมหานคร - - วิจัย. 2. โรคเอดส์ - - ปัจจัยเสี่ยง. 3. พฤติกรรม
ทางเพศ I. บังอร เทพเทียน II. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
III. The Behavioral Surveillance Survey of 5 Target Groups in Bangkok, 2008

ลิขสิทธิ์ กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

จำนวนพิมพ์ 300 เล่ม

จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0 2441 9870, 0 2441 9040 ต่อ 45, 54

โทรสาร 0 24419044

www.aihd.mahidol.ac.th

ออกแบบปก นางสาวปิยฉัตร ตระกูลวงษ์

จัดรูปเล่ม นางสาวปรีดา ตาสี

นางสุภัทรา อินทร์ไพบูลย์

การศึกษานโยบายของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ
การติดเชื้อเอชไอวีใน 5 กลุ่มประชากรในมาช ปี 2551

The Behavioral Surveillance Survey of
5 Target Groups in Bangkok, 2008

ผู้อำนวยการโครงการ

รศ.พญ. ศิริกุล อิศรานุรักษ์

พญ. ปิยธิดา สมุทรประภูต

นักวิจัยหลัก

นางสาวบังอร เทพเทียน

นางสาวปิยฉัตร ตระกูลวงษ์

นางสาวปรินดา ตาสี

นางสุภัทรา อินทร์ไพบูลย์

ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวกมลวรรณ รักแผน

นางสาวมนฤดี วงศ์แก้ว

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวอุบลรัตน์ ธนรุจิวงศ์

คำนำ

การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในครั้งนี้ เป็นรอบที่ 7 ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังในประชากร 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ปวช. ปีที่ 2 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของประชากรที่เฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรมการใช้สารเสพติด การเฝ้าระวังนี้จึงมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

หากมีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ที่จะเป็นประโยชน์ต่อรายงานฉบับนี้ คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับเพื่อนำมาปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

พฤศจิกายน 2551

กิตติกรรมประกาศ

กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาการสาธารณสุข อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆ โรงเรียนที่เป็นพื้นที่ศึกษาที่กรุณาให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวก ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มนักเรียนเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่ง

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ที่อำนวยความสะดวก ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลของกลุ่มประชากรทั่วไป และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่การศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลและความร่วมมือ เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณคุณเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาล จากสำนักงานเขตต่างๆ ที่อำนวยความสะดวก ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานในสถานประกอบการที่เป็นพื้นที่การศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ และความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บข้อมูลของกลุ่มนี้

และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมให้โครงการนี้ดำเนินการจนได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการวางแผนดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครต่อไป

คณะผู้วิจัย

พฤศจิกายน 2551

สารบัญ

คำนำ

กิตติกรรมประกาศ

บทสรุปผู้บริหาร	ก
-----------------	---

■ บทที่ 1 บทนำ	1
----------------	---

■ บทที่ 2 คนงานในสถานประกอบการ	11
--------------------------------	----

■ บทที่ 3 ประชากรทั่วไป	37
-------------------------	----

■ บทที่ 4 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2	61
-------------------------------------	----

■ บทที่ 5 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	81
--	----

■ บทที่ 6 บทสรุปผลการสำรวจ	113
----------------------------	-----

■ บทที่ 7 แนวโน้มพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	133
---	-----

บรรณานุกรม

สารบัญ

■ บทที่ 1

ตาราง 1.1	จำนวนตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล	5
ตาราง 1.2	ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล	5

■ บทที่ 2

ตาราง 2.1	พื้นที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูล	12
ตาราง 2.2	อายุของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ	15
ตาราง 2.3	ภูมิลำเนาของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ	15
ตาราง 2.4	ระยะเวลา (ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครของกลุ่มคนงาน ในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ	16
ตาราง 2.5	ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ	16
ตาราง 2.6	สถานภาพสมรสของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ	17
ตาราง 2.7	ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคู่ครองในกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ	17
ตาราง 2.8	ตำแหน่งของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ	18
ตาราง 2.9	ร้อยละของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง จำแนกตามเพศ	19
ตาราง 2.10	ร้อยละของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ จำแนกตามอายุและประสบการณ์ทางเพศ	20
ตาราง 2.11	ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามเพศ	21
ตาราง 2.12	ประเภทของคู่อุปสรรคสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามเพศ	22
ตาราง 2.13	อายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามเพศ	22
ตาราง 2.14	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	23
ตาราง 2.15	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามอายุ	23
ตาราง 2.16	เหตุผลของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย	24
ตาราง 2.17	จำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ	26

■ บทที่ 2

ตาราง 2.18	ประเภทของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	26
ตาราง 2.19	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ	27
ตาราง 2.20	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ	28
ตาราง 2.21	การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย กับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ	29
ตาราง 2.22	เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ	29
ตาราง 2.23	การมีอาการผิดปกติ และการปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็น โรคทางเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ	30
ตาราง 2.24	การใช้ถุงยางอนามัยจากตู้จำหน่ายอัตโนมัติ และการซื้อถุงยางอนามัย มาใช้เอง จำแนกตามเพศ	31
ตาราง 2.25	การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	31
ตาราง 2.26	พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติด จำแนกตามเพศ	32
ตาราง 2.27	ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการเสพยาเสพติด จำแนกตามเพศ	33
ตาราง 2.28	การใช้ถุงยางอนามัยกับการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำแนกตามเพศ	33
ตาราง 2.29	การใช้ถุงยางอนามัยกับการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด จำแนกตามเพศ	34
ตาราง 2.30	การเสพยาเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ	35

■ บทที่ 3

ตาราง 3.1	พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	38
ตาราง 3.2	อายุของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ	40
ตาราง 3.3	ภูมิลำเนาของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ	40
ตาราง 3.4	ระยะเวลา (ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มประชากรทั่วไป	41
ตาราง 3.5	การศึกษาของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ	41
ตาราง 3.6	ลักษณะการอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ	42

■ บทที่ 3

ตาราง 3.7	อาชีพของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ	42
ตาราง 3.8	รายได้ต่อเดือนของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ	43
ตาราง 3.9	ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ ได้ถูกต้อง	44
ตาราง 3.10	ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ ได้ถูกต้อง จำแนกตามกลุ่มอายุ	44
ตาราง 3.11	ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ	45
ตาราง 3.12	อายุของการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ	46
ตาราง 3.13	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก	47
ตาราง 3.14	เหตุผลของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย	47
ตาราง 3.15	สัดส่วนของคนในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา	49
ตาราง 3.16	ประเภทของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	50
ตาราง 3.17	จำนวนของประเภทคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	50
ตาราง 3.18	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ	51
ตาราง 3.19	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ	52
ตาราง 3.20	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายสุด จำแนกตามเพศ	53
ตาราง 3.21	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งสุดท้ายสุด	53
ตาราง 3.22	เหตุผลของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย	54
ตาราง 3.23	การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนในภาพรวม จำแนกตามเพศ	55
ตาราง 3.24	การมีอาการผิดปกติ และการปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่า จะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ	56
ตาราง 3.25	ความสะดวกในการซื้อถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ	56
ตาราง 3.26	การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี จำแนกตามเพศ	57
ตาราง 3.27	พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการเสพสารเสพติด จำแนกตามเพศ	57
ตาราง 3.28	ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติด จำแนกตามเพศ	58

■ บทที่ 3

ตาราง 3.29	การมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ	59
ตาราง 3.30	การมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ	59
ตาราง 3.31	การเสพยาเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำของกลุ่มประชากรทั่วไป	60

■ บทที่ 4

ตาราง 4.1	อายุและระยะเวลา (ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	63
ตาราง 4.2	ลักษณะของการพักอาศัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	64
ตาราง 4.3	ระดับการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	64
ตาราง 4.4	การใช้เวลาว่างของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	65
ตาราง 4.5	ร้อยละของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง	66
ตาราง 4.6	ความถี่ของการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	69
ตาราง 4.7	สถานที่ใช้ Internet เป็นประจำในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	69
ตาราง 4.8	การมีคูรักรหรือแฟนทาง Internet ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	70
ตาราง 4.9	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และคู่นอนครั้งแรก ของกลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	71
ตาราง 4.10	อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2	71
ตาราง 4.11	เหตุผลของกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	72
ตาราง 4.12	จำนวนคู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ของกลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ	73
ตาราง 4.13	การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ	73
ตาราง 4.14	เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของกลุ่มนักเรียน จำแนกตามเพศ	74
ตาราง 4.15	เหตุผลของกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้าย	74
ตาราง 4.16	เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ	75
ตาราง 4.17	การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ จำแนกตามเพศ	76
ตาราง 4.18	ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของกลุ่มนักเรียน จำแนกตามเพศ	78

■ บทที่ 4

ตาราง 4.19	เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และหลังการเสพยาเสพติด และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ	79
ตาราง 4.20	วิธีการเสพยาเสพติด จำแนกตามเพศ	80

■ บทที่ 5

ตาราง 5.1	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษา	88
ตาราง 5.2	อายุเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	88
ตาราง 5.3	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	89
ตาราง 5.4	ลักษณะการพักอาศัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	89
ตาราง 5.5	ระดับการศึกษาของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	90
ตาราง 5.6	การมีคู่วัยหรือแฟนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	91
ตาราง 5.7	การใช้เวลาว่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	91
ตาราง 5.8	ร้อยละการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	93
ตาราง 5.9	การตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด UNGASS ได้ถูกต้อง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	94
ตาราง 5.10	พฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	94
ตาราง 5.11	เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	96
ตาราง 5.12	อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	97

■ บทที่ 5

ตาราง 5.13	ประเภทคู่มือ และการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	100
ตาราง 5.14	การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่มือประเภทต่างๆ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	101
ตาราง 5.15	จำนวนคู่มือ (คน) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	101
ตาราง 5.16	เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย และการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	102
ตาราง 5.17	สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	105
ตาราง 5.18	การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	106
ตาราง 5.19	การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาเรื่องเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	107
ตาราง 5.20	การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	108
ตาราง 5.21	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	109
ตาราง 5.22	พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และความถี่ในการใช้สารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ	110
ตาราง 5.23	การมีเพศสัมพันธ์หลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และหลังเสพยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	112

■ บทที่ 6

ตาราง 6.1	จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ดำเนินการสำรวจ ในปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2551	114
ตาราง 6.2	จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ดำเนินการสำรวจในปี พ.ศ. 2551 จำแนกตามเพศ	115
ตาราง 6.3	อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2551	115
ตาราง 6.4	ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง ในภาพรวม	116

■ บทที่ 6

ตาราง 6.5	ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง จำแนกตามเพศ	117
ตาราง 6.6	อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในภาพรวม	120
ตาราง 6.7	การมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ	122
ตาราง 6.8	ประเภทของคู่นอนสำหรับเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	123
ตาราง 6.9	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	124
ตาราง 6.10	ประเภทของคู่นอนสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย จำแนกตามเพศ	125
ตาราง 6.11	วิธีการเสพยาเสพติด ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา	131
ตาราง 6.12	การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และหลังเสพยาเสพติด	132

■ บทที่ 7

ตาราง 7.1	อายุเฉลี่ยของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่สำรวจในแต่ละปี	135
ตาราง 7.2	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกกับบุคคลประเภทต่างๆ	135
ตาราง 7.3	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ	137
ตาราง 7.4	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง กับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา	138
ตาราง 7.5	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย กับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ	138
ตาราง 7.6	แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเสพยาเสพติด	143
ตาราง 7.7	แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง จำแนกตามเพศ	144
ตาราง 7.8	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบ 2 ปี	146
ตาราง 7.9	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่นอนประเภทต่างๆ	147
ตาราง 7.10	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ	147
ตาราง 7.11	แนวโน้มเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบ 2 ปี	148
ตาราง 7.12	แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง	153
ตาราง 7.13	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ในรอบ 4 ปี	154
ตาราง 7.14	แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง จำแนกตามเพศ	162

■ บทที่ 7

ตาราง 7.15	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก กับบุคคลประเภทต่างๆ	164
ตาราง 7.16	อายุของกลุ่มประชากรทั่วไป ในรอบ 2 ปี	172
ตาราง 7.17	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	172
ตาราง 7.18	แนวโน้มอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	173
ตาราง 7.19	แนวโน้มเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับบุคคลประเภทต่างๆ	174
ตาราง 7.20	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อเพศสัมพันธ์ กับบุคคลประเภทต่างๆ	174
ตาราง 7.21	แนวโน้มเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย กับคู่นอนประเภทต่างๆ	175

สารบัญแผนภาพ

■ บทที่ 1

แผนภาพ 1.1	แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลก	7
แผนภาพ 1.2	สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในประเทศจำแนกตามเพศ ในปี พ.ศ. 2527 – สิงหาคม พ.ศ. 2551	8
แผนภาพ 1.3	สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในประเทศจำแนกตามอายุ ในปี พ.ศ. 2527 – สิงหาคม พ.ศ. 2551	8
แผนภาพ 1.4	ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ในประเทศจำแนกตามปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ. 2551	9
แผนภาพ 1.5	สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จำแนกตามเพศ ในปี พ.ศ. 2527 – สิงหาคม พ.ศ. 2551	9
แผนภาพ 1.6	สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จำแนกตามอายุ ในปี พ.ศ. 2527 – สิงหาคม พ.ศ. 2551	10
แผนภาพ 1.7	ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ. 2551	10

■ บทที่ 4

แผนภาพ 4.1	การมีคูรักรหรือแฟนของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2	65
แผนภาพ 4.2	การตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ (7 ข้อ)	67
แผนภาพ 4.3	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS (ตอบข้อ 1-5 ถูกทุกข้อ)	67
แผนภาพ 4.4	พฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา	68
แผนภาพ 4.5	การมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมา	76
แผนภาพ 4.6	การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	77
แผนภาพ 4.7	การเสพยาเสพติดประเภทผิดกฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา	78

■ บทที่ 6

แผนภาพ 6.1	ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ ในภาพรวม	118
แผนภาพ 6.2	ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ จำแนกตามเพศ	119
แผนภาพ 6.3	ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในภาพรวม	119
แผนภาพ 6.4	ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ	120
แผนภาพ 6.5	การมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี จำแนกตามเพศ	121
แผนภาพ 6.6	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ	122
แผนภาพ 6.7	สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย จำแนกตามเพศ	125
แผนภาพ 6.8	สัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน จำแนกตามเพศ	126
แผนภาพ 6.9	สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง จำแนกตามเพศ	127
แผนภาพ 6.10	อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ	128
แผนภาพ 6.11	การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	128
แผนภาพ 6.12	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	129
แผนภาพ 6.13	พฤติกรรมการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ	130

■ บทที่ 7

แผนภาพ 7.1	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก	136
แผนภาพ 7.2	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	139
แผนภาพ 7.3	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน ในรอบปีที่ผ่านมา	139
แผนภาพ 7.4	แนวโน้มอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมา	140
แผนภาพ 7.5	แนวโน้มการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา	141
แผนภาพ 7.6	แนวโน้มพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรอบ 4 ปี	141
แผนภาพ 7.7	แนวโน้มพฤติกรรมใช้สารเสพติด ในรอบ 3 ปี	142

■ บทที่ 7

แผนภาพ 7.8	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ Internet และการใช้ Internet เพื่อหาคูรักหรือแฟน ในรอบปีที่ผ่านมา	143
แผนภาพ 7.9	แนวโน้มของการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อตามเกณฑ์ของ UNGASS ในรอบ 2 ปี	145
แผนภาพ 7.10	แนวโน้มประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 2 ปี	145
แผนภาพ 7.11	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก โดยความสมัคร ในรอบ 2 ปี	145
แผนภาพ 7.12	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ในรอบ 2 ปี	146
แผนภาพ 7.13	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	148
แผนภาพ 7.14	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน	148
แผนภาพ 7.15	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	149
แผนภาพ 7.16	แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในรอบ 2 ปี	149
แผนภาพ 7.17	แนวโน้มของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ในรอบ 2 ปี	149
แผนภาพ 7.18	แนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา	150
แผนภาพ 7.19	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	150
แผนภาพ 7.20	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	150
แผนภาพ 7.21	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมาย ในรอบ 2 ปี	151
แผนภาพ 7.22	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา ในรอบ 2 ปี	151
แผนภาพ 7.23	แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ในรอบ 2 ปี	151
แผนภาพ 7.24	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ในรอบ 2 ปี	152
แผนภาพ 7.25	แนวโน้มของการมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	153
แผนภาพ 7.26	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	154
แผนภาพ 7.27	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟน	155
แผนภาพ 7.28	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	155

บทที่ 7

แผนภาพ 7.29	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	155
แผนภาพ 7.30	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน	156
แผนภาพ 7.31	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการทางเพศ	156
แผนภาพ 7.32	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	156
แผนภาพ 7.33	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	157
แผนภาพ 7.34	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	157
แผนภาพ 7.35	แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	158
แผนภาพ 7.36	แนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา	158
แผนภาพ 7.37	แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	159
แผนภาพ 7.38	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในรอบปีที่ผ่านมา	159
แผนภาพ 7.39	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	160
แผนภาพ 7.40	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	160
แผนภาพ 7.41	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	161
แผนภาพ 7.42	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	161
แผนภาพ 7.43	แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อตามตัวชี้วัด UNGASS	163
แผนภาพ 7.44	แนวโน้มของประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 5 ปี	163
แผนภาพ 7.45	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	164
แผนภาพ 7.46	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหรือแฟน	165
แผนภาพ 7.47	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	165
แผนภาพ 7.48	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	166

บทที่ 7

แผนภาพ 7.49	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกัน	166
แผนภาพ 7.50	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการทางเพศ	166
แผนภาพ 7.51	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	167
แผนภาพ 7.52	แนวโน้มของเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	167
แผนภาพ 7.53	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	167
แผนภาพ 7.54	แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	168
แผนภาพ 7.55	แนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบ 5 ปี	168
แผนภาพ 7.56	แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	169
แผนภาพ 7.57	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติด	169
แผนภาพ 7.58	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	170
แผนภาพ 7.59	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	170
แผนภาพ 7.60	แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	171
แผนภาพ 7.61	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	171
แผนภาพ 7.62	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	173
แผนภาพ 7.63	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	175
แผนภาพ 7.64	แนวโน้มของเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	176
แผนภาพ 7.65	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน	176
แผนภาพ 7.66	แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	177
แผนภาพ 7.67	แนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา	177
แผนภาพ 7.68	แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	178
แผนภาพ 7.69	แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติด	178
แผนภาพ 7.70	แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	179
แผนภาพ 7.71	แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	179

■ บทที่ 7

แผนภาพ 7.72 แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด 180

แผนภาพ 7.73 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด 180

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับกองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการมาเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 30,292 ราย และมีกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่ม

ผลสรุปของการสำรวจพฤติกรรมที่

สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในปี พ.ศ. 2551 มีด้วยกัน 5 กลุ่ม จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 5,759 ราย เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ส่วนกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป มีอายุเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มนักเรียนอย่างชัดเจน

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ พบว่ากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างชัดเจนในทุกข้อ รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป ตามลำดับความสามารถของกลุ่มตัวอย่างที่

สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ UNGASS พบว่ากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน รองลงมาคือกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป ตามลำดับ

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ในกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ทางเพศมาแล้ว อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ากลุ่มนักเรียนมีอายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก น้อยกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการ

และกลุ่มประชากรทั่วไปค่อนข้างชัดเจน แต่ในภาพรวมแล้ว อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดน้อยกว่า 20 ปี กลุ่มตัวอย่างมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยที่สุดประมาณ

8 – 9 ปีเท่านั้น กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี พบว่าผู้ชายมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มผู้หญิง

คู่เพศสัมพันธ์ในครั้งแรก พบว่ากลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนในสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มผู้หญิงค่อนข้างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรกของผู้ชายก็ยังเป็นคูรักหรือแฟนมากกว่าผู้หญิงคนอื่นๆ หรือว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศ ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยมาก

การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่าผู้ชายมีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกมากกว่าในกลุ่มผู้หญิง

เพศสัมพันธ์ในวัย

ประเภทคู่นอนของกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่นอนที่ไม่ใช่คูรักหรือแฟนในสัดส่วนมากกว่ากลุ่มผู้หญิง และผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่นอนหลายๆ ประเภทมากกว่า กลุ่มผู้หญิงค่อนข้างชัดเจน

การใช้ถุงยางอนามัย กับคู่นอนประเภท

ต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าผู้หญิงมีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีน้อยกว่าผู้ชาย กลุ่มนักเรียนมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่าในกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป นอกจากนี้มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทคูรัก/แฟนน้อยกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ อย่างชัดเจน

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

คู่นอนครั้งล่าสุด พบว่าผู้หญิงเกือบทั้งหมดมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟน ส่วนคู่นอนคนอื่นๆ มีสัดส่วนที่น้อยมาก สำหรับในกลุ่มผู้ชายพบว่า มีคู่นอนครั้งล่าสุดเป็นคูรักหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 74 – 90 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่คูรัก หรือแฟนมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่

5 กลุ่มประชากรทั่วไป กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ตามลำดับ สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับผู้หญิงขายบริการทางเพศมีสัดส่วนที่น้อยมาก สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่ามีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 21 – 65

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงิน

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงิน ตอบแทนในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนมากกว่ากลุ่มผู้หญิง อย่างไรก็ตาม การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่ง-

ของหรือเงินตอบแทนมีสัดส่วนไม่มากนัก คือ ประมาณร้อยละ 1 – 13 เท่านั้น และมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งอยู่ระหว่างร้อยละ 20 – 100 ผู้หญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย ยกเว้นกลุ่มประชากรทั่วไป

การวินิจฉัยที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา คิดสัดส่วนกับกลุ่มตัวอย่างทุกคน (ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีเพศสัมพันธ์เท่านั้น) พบว่า กลุ่มผู้ชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใน

รอบปีที่ผ่านมามากกว่ากลุ่มผู้หญิง และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีอยู่ระหว่างร้อยละ 2 – 36 และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการและ

กลุ่มประชากรทั่วไปมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มนักเรียนอย่างชัดเจน และกลุ่มผู้ชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มผู้หญิง

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้ชายมีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมามากกว่ากลุ่มผู้หญิง

อย่างชัดเจน กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมามากกว่ากลุ่มนักเรียน

พฤติกรรมการเสพยาเสพติด

พฤติกรรมการเสพยาเสพติด หมายถึง การเสพยาเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาบ้า เฮโรอีน โคเคน กัญชา เป็นต้น ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 1 – 19 กลุ่มผู้ชายมีการเสพยาเสพติดมากกว่ากลุ่มผู้หญิง

วิธีการเสพยาเสพติดโดยการฉีดสารเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำ คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีประมาณ 1% ที่เสพยาเสพติดโดยการฉีด กลุ่มผู้ชายมีการเสพยาเสพติดโดยวิธีการ

ฉีดมากกว่าในกลุ่มผู้หญิง

จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการสำรวจในรอบปี พ.ศ. 2551 มีผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการเสพยาเสพติด จำนวน 9 ราย เท่านั้น (มีการใช้อุปกรณ์การเสพยาเสพติดร่วมกับบุคคลอื่น และไม่มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนำมาใช้ต่อ)

เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และหลังเสพยาเสพติดมีสัดส่วนไม่มากนัก และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมีสัดส่วนไม่มากนักเช่นกัน

แนวโน้มพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี

ในรอบนี้เป็นการติดตามแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 คนงานในสถานประกอบการ และประชากรทั่วไป ของกรุงเทพมหานคร

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ได้ติดตามแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และเฝ้าติดตามต่อเนื่องเป็นรอบที่ 7 ส่วนในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เริ่มติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์

กับการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และเฝ้าติดตามต่อเนื่องเป็นรอบที่ 2 สำหรับกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ เริ่มติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และเฝ้าติดตามต่อเนื่องมาอีก 3 ปี จนปี พ.ศ. 2548 ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการทุก 2 ปี กลุ่มประชากรทั่วไป ได้เริ่มติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และเฝ้าติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ทุก 2 ปี

กลุ่มคนงานในสถานประกอบการในระชนวัย

อายุของคนงานในสถานประกอบการมีความแตกต่างกันในรอบ 5 ปี กล่าวคือในปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547 ได้กำหนดอายุผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วง 15 – 29 ปี ส่วนในปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2551 ได้ขยายกลุ่มอายุจาก 15 – 29 ปี เป็น 15 – 49 ปี ดังนั้นอายุเฉลี่ยของคนงานในสถานประกอบการจึงมีความแตกต่างกัน

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คนงานหญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยกว่าคนงานชายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจน

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าคนงานชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆ รอบปีที่ผ่านมามากกว่าคนงานหญิงในรอบ 5 ปี การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่ได้มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามคนงานมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประจำ (คูรัก/แฟน) น้อยกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายสุดพบว่าคนงานชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายสุดมากกว่ากลุ่มคนงานหญิงค่อนข้างชัดเจนในรอบ 4 ปี

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงิน

ตอบแทนพบว่า คนงานชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่าผู้หญิง

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่าคนงานหญิงมีแนวโน้มอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่าคนงานชายในรอบ 4 ปี

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าคนงานหญิงมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมามากกว่าคนงานชายในรอบ 3 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2551 คนงานชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่าคนงานหญิง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่าคนงานชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าคนงานหญิง

พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าคนงานหญิง มีการใช้สารเสพติดน้อยกว่าเพศชายค่อนข้างชัดเจน

เพศสัมพันธ์หลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น

สำหรับแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ไม่ชัดเจนมากนักเพราะจำนวนผู้ที่เสพยาเสพติดมีจำนวนไม่มากนัก ทำให้รูปแบบของพฤติกรรมไม่ชัดเจนมากนัก

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในรอบ ๒ ปี

การติดตามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ พบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์มากขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ของUNGASS พบว่าสูงขึ้นเล็กน้อย และนักเรียนชายสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องน้อยกว่านักเรียนหญิง

ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์พบว่า มีแนวโน้มลดลง นักเรียนชายมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 2 ปี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกพบว่า มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยความสมัครใจมากขึ้นอย่างชัดเจน นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยความสมัครใจมากกว่านักเรียนหญิง การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่อรักหรือแฟน และกับบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันสูงขึ้น กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน และผู้หญิงขายบริการทางเพศมีแนวโน้มลดลง การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่เพศสัมพันธ์

ประเภทต่างๆ พบว่านักเรียนหญิงมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้นเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่อรักหรือแฟน ส่วนนักเรียนชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อรักหรือแฟนน้อยลง เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดพบว่า มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยสูงขึ้น

แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มลดลง

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิง

พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มการเสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมาสูงขึ้น ส่วนนักเรียนหญิงมีแนวโน้มเท่าเดิม นักเรียนชายมีการเสพยาเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมายมากกว่านักเรียนหญิง

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในรอบ ๕ ปี

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์พบว่านักเรียนสามารถตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน และนักเรียนสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อตามตัวชี้วัดของ UNGASS มีแนวโน้มสูงขึ้น

ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกพบว่านักเรียนมีเพศสัมพันธ์สูงขึ้นเล็กน้อย

การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกพบว่ามีแนวโน้มลดลง นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกใกล้เคียงกันในรอบ 5 ปี

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนหญิง แต่ลดลงในกลุ่มนักเรียนชาย

การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์

ครั้งล่าสุดน้อยกว่านักเรียนชายในรอบ 5 ปี

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน พบว่ามีแนวโน้มลดลง นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 5 ปี

นักเรียนที่มีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย นักเรียนชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 5 ปี

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือน พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 3 ปี

พฤติกรรมการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย นักเรียนชายมีการใช้สารเสพติดมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 4 ปี

กลุ่มนักเรียนไฮสคูล ระดับปว.ว.2 ในชนบท

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ พบว่ากลุ่มนักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องมากขึ้น และนักเรียนที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ UNGASS พบว่ามีแนวโน้มมากขึ้น นักเรียนชายสามารถตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อมากกว่านักเรียนหญิง

ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ พบว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นมาก นักเรียนชายมีประสบการณ์ทางเพศมากกว่านักเรียนหญิง

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่านักเรียนชายมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงที่เป็นคูรักรหรือแฟนมากขึ้น ขณะที่ในกลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มเท่าเดิม การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ามีแนวโน้มลดลง

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งลดลง

เพศสัมพันธ์ในครั้งล่าสุดมีแนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยลดลง นักเรียนชาย

มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 5 ปี

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนมากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิงเล็กน้อย

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิงในรอบ 3 ปี การใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มการเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายลดลงในกลุ่มนักเรียนชาย ส่วนกลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง นักเรียนชายมีการใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 4 ปี

กลุ่มประชากรทั่วไปในรุ่น 2 ปี

ในการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอายุผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุระหว่าง 15 – 29 ปี ส่วนในปี พ.ศ. 2551 ได้ขยายกลุ่มอายุของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 15 – 49 ปี ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2551 จึงมีอายุเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2549 ประมาณ 10 ปี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนทั้งกลุ่มผู้หญิง และกลุ่มของผู้ชาย กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี น้อยกว่ากลุ่มผู้ชาย

การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ามีแนวโน้มลดลง กลุ่มผู้ชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่ากลุ่มผู้หญิงเล็กน้อย

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้ม การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนที่เป็นคู่อีกหรือแฟน มีสัดส่วน

น้อยกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ ผู้ชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่ากลุ่มผู้หญิง การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่ามีแนวโน้มลดลง ผู้ชายมีการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2 เท่า

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่ามีแนวโน้มลดลง ส่วนการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้ชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าผู้หญิงประมาณ 1 เท่าตัว แต่การใช้สารเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มลดลง ผู้หญิงมีการเสพยาเสพติดน้อยกว่าผู้ชายค่อนข้างชัดเจนในรอบ 2 ปี

Executive Summary

This behavioral surveillance survey on the risk of infection with HIV in Bangkok has been conducted regularly by the Division of HIV/AIDS Control, Department of Health Bangkok Metropolitan Administration, and the ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, as a joint research project. The research started in 2002 has involved a total of 30,292 respondents across a total of 11 societal categories.

In 2008, the survey was conducted on 5 different groups, namely: 8th graders and 11th graders from secondary schools; 2nd year vocational school students; groups of factory workers; and a group from the general population. Data was collected from a total of 5,759 respondents. As expected, the mean age of the 8th graders' group was significantly lower than the ages of the other groups. On the other hand, the average age of the groups of factory workers, and the general population, was significantly higher than that of the students.

Level of Knowledge about HIV/AIDS

In relation to individual knowledge concerning HIV/AIDS, the findings indicated that 8th graders were less likely to answer the survey questions correctly, when compared with other groups across most items. In contrast, the general population group and the factory worker groups displayed a greater knowledge of HIV/AIDS related issues as measured by the number of correct answers to survey questions.

Using the UNGASS criteria, the percentage of those sampled who gave all correct answers were counted in each group. The findings showed that the lowest group was that of the 8th graders (7%) followed by the vocational school group (13%), the 11th graders (19.7%), the factory worker groups (35.7%) and finally, the general population group (38.7%).

Results concerning Sexual Initiation

Among those who were sexually active during the survey, the average age at the time of their first sexual intercourse was lower among the student groups than both the factory worker and general population groups. Overall, the average age of sexual initiation was less than 20 years old, with a minimum age of 8-9 years old. Males were significantly more likely than females to have had their first sexual intercourse before the age of 15.

Males from all 5 groups were also significantly less likely to have had their first sexual intercourse with their regular partner or spouse. Instead, sexual initiation was with sex workers in 1.8% to 9.5% of the cases, or with acquainted sex partners in 5.6% to 20% of the cases. In addition, males in 3 different groups (vocational students, factory workers and the general population) were more likely to have practiced safe sex than female peers.

Sexual behavior in the past year

When asked about their sexual behaviour over the preceding year, it was found that males were less likely to have had sex with a regular partner or spouse than females across all groups. Males also tended to have had sex with multiple types of partner, including persons who were merely acquaintances and with sex workers. Men who had had sex with men made up 4% of the group of the general population, but 19.6% of 8th graders groups.

Further, when queried about condom use in the past year, consistent condom use by females was less than by males. In the student groups, consistent condom use was higher than in either the factory worker groups or in the general population group. However, when classified by type of partner, it was found that consistent condom use was considerably lower between boyfriends/girlfriends and married couples. Further, less than one third of the men who had had sex with men in the student groups regularly used condoms.

Having sex in exchange or money or gifts

With regard to sex in exchange for money or gifts, it was found that this was more common for males than females. Overall, the percentage was low ranging from 1% to 13%, although condom use varied greatly from 20% to 100%. Females

Vocational school students and factory workers, reported a higher percentage of condom use than males, while condom use by females in the general population group was reported at 20%.

Suspicion of having a sexually transmitted infection

The survey found that males in all groups were more concerned than females that they might acquire a sexually transmit-

ted infection. The factory worker group reported a higher percentage of suspicion they may have an STI.

Having HIV blood test

Overall, the percentage of those who had had an HIV blood test ranged from 2% to 6% and was highest in the factory worker

groups and general population group. In general, a higher the percentage of males who had had blood tests than females.

Substance use over the past year

Substance use in this study means illicit use of heroin, cocaine, marijuana, methamphetamines and other drugs, during the past year. Prevalence of illicit drug use across the 5 different groups ranged from 1% to 19% with males more likely to have used illicit drugs than their female peers.

Intravenous drug injection was reported at 1%, and the proportion of use by males was higher than by females. Out of all the respondents, only 9 respondents were

at risk of acquiring HIV/AIDS through sharing needles or syringes without cleaning.

Having sexual intercourse after drinking or using illicit drugs was also reported at low levels in all groups. However, in all groups, rarely less than one-third of males consistently used condoms. There were even some reports of 8th graders having sex under the influence of alcohol, as well as substance use among 8th graders.

Trend of behavioral surveillance related to HIV/AIDS infection

All five groups were subjected to behavior surveillance.

Surveillance of 11th graders and vocational school students was conducted from 2002 to 2008. Surveillance of 8th

graders was conducted in 2007 and 2008.

Surveillance of the general population group occurred in 2006 and 2008. Surveillance of the groups of factory workers was undertaken in 2002, 2003, 2004, 2005 and 2008.

Factory workers

In 2006 and 2008, the age range of the factory workers surveyed was 15 to 49 years, and their average age was higher than in previous years.

Condom use by females for first time sexual experience was higher than in the previous 5 years.

Consistent condom use by males was more frequent than with females. Consistent condom use for sex with their lovers and spouses was less frequent than with other types of sexual partner.

Condom use for the most recent year sexual experience was increasing. However male workers used condoms more than female workers over the past 4 years.

There was a slight increase in the number of workers who had had sex in return for gifts or money. Male workers were more likely to do this than female workers.

The incidence of symptoms that could indicate a sexual transmitted disease was found to have decreased. Female workers were more likely to indicated sexual transmitted infection symptoms than male workers over the past 4 years.

Seeking voluntary blood test for HIV declined, as in the previous 4 years. Female workers were more likely to seek voluntary HIV blood testing than male workers over the past 3 years except in 2008.

Alcohol consumption was increasing among female workers and was steady among male workers, who were more likely to have consumed alcohol over the past month than female workers. Sex after alcohol and consistent condom use increased slightly. Substance abuse behavior was found to be decreasing.

School 8th graders

Knowledge of HIV/ AIDS increased slightly in 2008. Male students were less likely to correctly answer AIDS questions than female students.

Overall, the trend of being sexual experienced was declining. Male secondary school students were more sexually active than female students over the past two year. The first voluntary sex experience was sharply increasing, and males were more likely to have had first sex than females. Condom use at the first sexual intercourse was slightly increasing.

Sex between boyfriend/girlfriend and same sex partners was increasing. Acquainted partner, unacquainted partners and sex worker partner slightly declined. Consistent condom use with boyfriends was found to be increasing among female 8th

grader. In contrast, consistent condom use was decreasing among male 8th graders having sex with girlfriends. Overall, condom use by 8th graders was found to be increasing.

There was slight decreasing in students who had had sex in exchange for goods or money, students indicated sexually transmitted infections, and students who had had a sexual problem in the past year.

Alcohol consumption in the past 1 month was found to be slightly decreasing. Male students were more likely to have drink alcohol in the past one month than female students. Substance abuse by male students increased in the past year, but remained stable with females. However female students were less likely to substance abuse than male students.

School 11th graders

Knowledge of HIV/AIDS increased slightly.

Overall, in this group, the trend of being sexually experienced was slightly increasing. Condom use at the first sexual intercourse was decreasing. The trend of condom use at the first sexual intercourse by male students was similar to female

students over the past 5 years.

Consistent condom use by females increased but decreased by males. Overall, it was found that condom use was slightly increasing, although condom usage by females was less than by males over the past 5 years.

There was a decrease in students

who had had sex in return for gifts or money. Male students were more likely to do this than female students over the past 5 year.

Symptoms that could indicate a sexually transmitted disease and seeking voluntary HIV blood testing in the past year were increased slightly. Male students were more likely to seek voluntary HIV blood testing than female students over the past 4

years.

In the past 1 month, Alcohol consumption found to be increasing. More male students drank alcohol in the past one month than female students over the past 3 years. Substance abuse in the past year was found to be slightly increasing. Male students were more likely to substance use in the past one year than female students over the past 4 years.

Vocational school students

Knowledge of HIV/ AIDS increased. Male students were less likely to correctly answer AIDS questions than female students.

Overall, in this group, the trend of being sexually experienced was sharply increasing. Males were more sexually active females.

The first sex experience with boyfriend/girlfriend or lover among male students was increasing, while female students were stable. The trend of condom use at the first sexual intercourse was decreasing.

Consistent condom use in the past year was decreasing. Most recent condom use among vocational school students, it was found that condom use was decreasing. However male students were more likely to use condoms than female

students over the past 5 years.

There was a slight decrease in students who had had sex in return for gifts or money. Male students were more slightly likely to do this than female students. Symptoms that could indicate a sexually transmitted disease, and voluntary HIV blood testing, in the past year were slightly increasing.

In the past 1 month, alcohol consumption was found to be increasing. Male students were more likely to drink alcohol in the past one month than female students over the past 3 years. Substance use in the past year found to be decreasing among males students, while female students were a stable. Male students were more likely to substance use in the past one year than female students over the past 4 year.

General population

The age range of the general population group in 2006 was to 15 – 29 years of age, but in 2008 the age range was increased to 15 – 49 years of age. In 2008, therefore, the average age of respondents was higher in 2008 than in 2006.

Both males and females were found to be decreasingly likely to have had their first sexual intercourse experience before the age of 15 years. females were also less likely to have had their first sexual intercourse experience before the age of 15 years than males.

Condom use at the first sexual intercourse decreased and males were slightly less likely to use condoms than females.

The consistent condom use for sexual intercourse in the past year between spouses and lovers was less than with other





types of sexual partner.

It was found that males in the past year were more likely to use condoms consistently than females. Most recent condom use among general populations, it was found that condom use was decreasing. However males were twice as likely to use condoms than females. There was decrease in sex in return for gifts or money, and in symptoms that could indicate a sexually transmitted. Seeking a voluntary blood test for HIV in the past year increased.

In the past 1 month Alcohol consumption was found to be increasing. Males were more likely to drink alcohol in the past one month than females. Substance abuse in the past year was found to be decreasing. Females were less likely to substance abuse in the past one year than males over the past 2 years.

๑

บทนำ



หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ที่ประเทศไทยได้พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นรายแรก จึงได้มีความพยายามพัฒนาระบบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ปัญหาเอดส์ได้อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง และทันเวลา ดังนั้นการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเครื่องมือที่สำคัญชิ้นหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามสถานการณ์ด้านพฤติกรรมในประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีกลุ่มประชากรในการเฝ้าระวัง 7 กลุ่มเป้าหมาย ในครั้งแรก และดำเนินการสำรวจในปี พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 2547 ในประชากรกลุ่มเป้าหมายเดิม

ในปี พ.ศ. 2548 กองควบคุมโรคเอดส์ได้มีการพัฒนากลุ่มเป้าหมายของระบบการเฝ้าระวังออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชากรทั่วไปที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างน้อยกับกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อ

การติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างมาก แล้วทำการเฝ้าระวังในแต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมาย 2 ปีต่อครั้ง โดยกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2 จะดำเนินการสำรวจพฤติกรรมทุกปี


ในปี พ.ศ. 2548 ได้เริ่มดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากใน 6 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 หญิงบริการทางเพศ ผู้ติดยาเสพติด โดยมีกลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มชายรักชาย เป็นกลุ่มประชากรที่เพิ่มเข้ามาในระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเป็นครั้งแรก ส่วนในปี พ.ศ. 2549 ได้ดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างน้อยใน 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2 กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ โดยเพิ่มกลุ่มประชากรทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการเฝ้าระวังพฤติกรรม ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ด้านพฤติกรรมในกลุ่มต่างๆ ได้มากขึ้น และในปี พ.ศ. 2550 ได้พิจารณา

เพิ่มกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในระบบการเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลุ่ม เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่พบว่าอายุของการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนนั้นมีอายุน้อยลง ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะดำเนินการสำรวจพฤติกรรมเพื่อทราบถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มดังกล่าว

สำหรับในปี พ.ศ. 2551 นี้ จึงได้สำรวจประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างน้อยดังเช่นในปี พ.ศ.2549 ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจพฤติกรรมมี 2 ประเภทคือ แบบสอบถาม (paper-based survey) และการสำรวจพฤติกรรมด้วยแบบสอบถามบนหน้าเว็บ(web-based survey) ซึ่งการสำรวจพฤติกรรมบนหน้า web นั้นสามารถดำเนินการสำรวจได้เฉพาะในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 เท่านั้น ส่วนกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป ได้ใช้แบบสอบถาม (paper-based survey) เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรม เช่นเดียวกับการเฝ้าระวังในปีที่ผ่านมา

กระบวนการวิจัย



วัตถุประสงค์

เพื่อทราบแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของประชากรที่เฝ้าระวัง

รูปแบบการดำเนินการ เครื่องมือการวิจัย

1. แบบสอบถามบนหน้าเว็บ

(Web Survey)

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กรอกข้อมูลบนหน้าเว็บแบบสอบถามมีจำนวน 5 หน้า คือ

หน้าที่ 1 ข้อมูลด้านประชากร

หน้าที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้
Internet

หน้าที่ 3 ข้อมูลความรู้เรื่องโรคเอดส์

หน้าที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เพศ

หน้าที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
สารเสพติด

นักเรียนจะต้องตอบคำถามบนหน้าเว็บให้ครบทุกข้อ แล้วส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน

2. แบบสอบถาม

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่ม

เป้าหมายเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเองอย่างอิสระ ข้อมูลที่ได้มาคณะผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ (ไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ สถานที่) ก่อนที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะลงมือกรอกแบบสอบถามคณะผู้วิจัยได้อธิบาย และทำความเข้าใจในแบบสอบถามทุกครั้ง ซึ่งแบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากร

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมทาง
เพศสัมพันธ์และพฤติกรรม
การใช้สารเสพติด

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมทั้ง 2 แบบ ในครั้งนี้ จะมีการแยกกลุ่มเพศหญิงและเพศชายแบบสอบถามในแต่ละเพศจะต่างชุดกัน

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ในการสำรวจครั้งนี้ กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ชาย-หญิง) กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ชาย-หญิง) กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปี 2

(ชาย, หญิง) กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ (ชาย, หญิง) และกลุ่มประชากรทั่วไป (ชาย, หญิง) ทั้งหมดสามารถอ่านออกเขียนได้ กลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น 5,759 ราย ดังรายละเอียดในตาราง 1.1

ตาราง 1.1	จำนวนตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล	
กลุ่มประชากร	จำนวนตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณ	จำนวนตัวอย่างที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ชาย, หญิง)	1,000	1,250
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ชาย, หญิง)	1,000	1,183
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ชาย, หญิง)	1,000	1,158
กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ (ชาย, หญิง)	1,000	1,022
กลุ่มประชากรทั่วไป (ชาย, หญิง)	1,000	1,146
รวม	5,000	5,759

ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล

ตาราง 1.2	ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล					
กลุ่มเป้าหมาย	ปี พ.ศ. 2551					
	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ชาย, หญิง)				←-----→		
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ชาย, หญิง)				←-----→		
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ชาย, หญิง)				←-----→		
กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ (ชาย, หญิง)	←-----→					
กลุ่มประชากรทั่วไป (ชาย, หญิง)		←-----→				

หมายเหตุ: --- ใช้แบบสอบถามหน้า web
 ———— ใช้แบบสอบถาม

ผลค้นพบ

ได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการ
กำหนดทิศทางและแนวทาง และประเมินผลการ

ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในส่วนของการแบบสอบถามที่ใช้กระดาษ
คำตอบ คณะผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลทุกฉบับ เมื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องในขั้นต้นก่อนที่จะนำไป
ลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูลในลำดับต่อไป ใน
ส่วนแบบสอบถามบนหน้า web นั้น คณะผู้วิจัย
ได้ทำการประมวลผลบนหน้า web เป็นระยะๆ
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเป็นไปได้
ในการทำระบบ Online Survey มาใช้ในระบบ
การเฝ้าระวังพฤติกรรม หลังจากการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรม Epi Info, โปรแกรม Minitab และ
โปรแกรม SPSS ร่วมกัน โดยสถิติที่ใช้ส่วนใหญ่จะ
นำเสนอข้อมูลด้วยความถี่ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

การนำเสนอภาพรวมของประชากรทั้ง 5
กลุ่มของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ ในปี พ.ศ.
2551 ที่จะนำเสนอเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมใน
ประชากรกลุ่มต่างๆ กัน โดยการแยกวิเคราะห์ใน
กลุ่มเพศหญิง-ชายด้วย (สัดส่วนของเพศหญิง-
ชายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จะมีสัดส่วนที่ไม่
แตกต่างกันไม่มากนัก)


สถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบัน สถานการณ์โรคเอดส์ในระดับโลก

จากรายงานของ UNAIDS ประจำปี พ.ศ.2550 พบว่า มีผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 33 ล้านคน ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป เป็นจำนวนถึงประมาณ 30.8 ล้านคน และสัดส่วนของผู้ป่วยเอดส์นั้นจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง นอกจากนั้นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี พบว่ามีจำนวนประมาณ

2 ล้านคน จากรายงานดังกล่าว พบว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี พ.ศ. 2550 จำนวนประมาณ 2.7 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี มากถึงประมาณ 2.3 ล้านคน มีผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี ในปี พ.ศ. 2550 จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านคน และนอกจากนั้น แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลกมีจำนวนค่อนข้างคงที่

แผนภาพ 1.1

แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลก




ที่มา: http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/Global_report.asp.

สืบค้นข้อมูลเมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย

แผนภาพ 1.2

สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในประเทศจำแนกตามเพศ
ในปี พ.ศ. 2527 – สิงหาคม พ.ศ. 2551




เมื่อจำแนกผู้ป่วยเอดส์ตามเพศแล้ว จะเห็นว่าเพศชายยังคงเป็นผู้ป่วยเอดส์สูงกว่าผู้หญิงประมาณ 2 เท่า แนวโน้มผู้ป่วยเอดส์ในทั้งกลุ่มเพศชายและเพศหญิง มีลักษณะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551

ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แผนภาพ 1.3

สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในประเทศจำแนกตามอายุ
ในปี พ.ศ. 2527 – สิงหาคม พ.ศ. 2551



ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


จำนวนผู้ป่วยเอดส์เมื่อจำแนกตามอายุ จะพบว่าส่วนใหญ่ หรือประมาณสองในสาม เป็นกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ที่อายุระหว่าง 30 – 49 ปี รองลงมาคือผู้ป่วยเอดส์ที่มีอายุระหว่าง 15 – 29 ปี อายุมากกว่า 50 ปี และอายุ 0-14 ปี ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม จะเห็นว่าผู้ป่วยเอดส์ในกลุ่มอายุ 30 – 49 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี ในขณะที่กลุ่ม

ผู้ป่วยเอดส์ที่มีอายุ 15 – 29 ปี และกลุ่มอายุที่มีอายุ 0-14 ปี มีแนวโน้มลดลง

ซึ่งมีข้อมูลสรุปว่ากลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยเอดส์ในกลุ่มที่มีอายุ 30 ปี น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับเชื้อเอชไอวี มาตั้งแต่อายุ 15-29 ปี เพราะกว่าจะเป็นผู้ป่วยเอดส์ก็จะมีระยะเวลา 7-10 ปี ดังนั้นกล่าวได้ว่ากลุ่มอายุ 15-29 ปี เป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อเอชไอวีสูงที่สุด

แผนภาพ 1.4

ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ในประเทศจำแนกตามปัจจัยเสี่ยง
ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ. 2551




สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในประเทศจำแนกตามปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2551 พบว่า การติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง การฉีดยาเสพติดเข้าเส้นโลหิต การติดเชื้อจากมารดา และปัจจัยอื่น ๆ ตามลำดับ

สถานการณ์โรคเอดส์ในกรุงเทพมหานคร

แผนภาพ 1.5

สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จำแนกตามเพศ
ในปี พ.ศ. 2527 – สิงหาคม พ.ศ. 2551




ในกรุงเทพฯ มีผู้ป่วยเอดส์เพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบผู้ป่วยเอดส์ในปี พ.ศ. 2550 แล้วพบว่าในเพศชายมีแนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ผู้หญิงมีแนวโน้มของการเป็นผู้ป่วยเอดส์ลดลงเล็กน้อย

ที่มา: กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

แผนภาพ 1.6

สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จำแนกตามอายุ ในปี พ.ศ. 2527 – สิงหาคม พ.ศ. 2551




ที่มา: กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเอดส์ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ในขณะที่กลุ่ม 15-29 ปี และกลุ่มอายุ 30-49 ปี มีแนวโน้มลดลง

เมื่อจำแนกผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ตามอายุจะพบว่ากลุ่มอายุ 30-49 ปี เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเอดส์มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างชัดเจน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-29 ปี อายุมากกว่า 50 ปี และกลุ่มอายุ 0-14 ปี ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มจะพบว่า กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ที่มีอายุ 0-14 ปี และ

แผนภาพ 1.7



ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพฯ จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ. 2551



สัดส่วนผู้ป่วยเอดส์จำแนกตาม ปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2551 พบว่า การติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง การฉีดยาเสพติดเข้าเส้นโลหิต และการติดเชื้อจากมารดา ตามลำดับ

2

คณงานในสถานประกอบการ



2

คณวณในสถานประกอบการ

การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการในปี พ.ศ. 2551 เป็นการสำรวจในรอบที่ 4

พื้นที่ในการสำรวจในปี พ.ศ.2551 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามลักษณะภูมิศาสตร์ของ

กรุงเทพมหานคร ที่แบ่งกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 12 โซน ในแต่ละโซนผู้วิจัยเลือกเขตพื้นที่มาจำนวน 1-2 เขต (ยกเว้นในโซนที่ 8, 9 ที่ไม่สามารถดำเนินการสำรวจได้เนื่องจากสถานประกอบการไม่สะดวกให้ดำเนินการสำรวจในช่วงเวลาดังกล่าว) ดังมีรายละเอียดดังนี้

ตาราง 2.1

พื้นที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูล

โซน	ลักษณะพื้นที่	เขตพื้นที่ในแต่ละโซน	เขตที่สุ่มเลือกได้	สถานประกอบการ
1	เขตอนุรักษ์เมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ ศูนย์กลางการบริหารราชการ (เขตดุสิต) ย่านธุรกิจ พาณิชยกรรมเฉพาะ (สำเพ็ง พาหุรัด เยาวราช) แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม	พระนคร ป้อมปราบ สัมพันธวงศ์ ดุสิต	สัมพันธวงศ์	ภัตตาคารเคนตัน ภัตตาคารแซงกริลล่า ภัตตาคารแวนฟ้า Gift Shop
2	เขตศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค	ปทุมวัน สาทร บางรัก วัฒนา	สาทร	บริษัท ขวานทองการทอ จำกัด บริษัท ยู่หลิม จำกัด
3	เขตเศรษฐกิจใหม่ แหล่งจ้างงาน ย่านการค้าบริการ และที่อยู่อาศัย	จตุจักร บางซื่อ พญาไท ดินแดง ห้วยขวาง ราชเทวี	ห้วยขวาง	บริษัท ที.ไอ.เคมีคอลส์ จำกัด

ตาราง 2.1		พื้นที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ)		
โซน	ลักษณะพื้นที่	เขตพื้นที่ในแต่ละโซน	เขตที่สุ่มเลือกได้	สถานประกอบการ
4	เขตเศรษฐกิจใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รองรับการขยายตัวของย่าน CBD เดิม และ วงแหวนอุตสาหกรรม	คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา พระโขนง บางนา	บางนา	บริษัท แฟรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด, บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์ การอาหาร จำกัด
5	เขตอนุรักษ์เมืองเก่ากรุงธนบุรี แหล่งวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม	ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย คลองสาน บางพลัด	คลองสาน บางพลัด	บริษัท โกลเด้น แพคตอรี บริษัท วิแอนด์พี จิวเวลรี่ จำกัด หจก. เบลด้า จิวเวลรี่ จำกัด บริษัท แสงทอง เอ็มปรอย เดอรี่
6	เขตเศรษฐกิจการจ้างงานใหม่ และที่อยู่อาศัย หนาแน่นมาก รองรับศูนย์คมนาคม (ศูนย์ ตากสิน) ศูนย์ธุรกิจพาณิชยกรรม และศูนย์ ราชการของกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	ภาษีเจริญ จอมทอง ราชบุรีบูรณะ	ราชบุรีบูรณะ	บริษัท P.E.T. (Thailand) จำกัด หจก. ฮงเส็ง การทอ จำกัด
7	เขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง (Transition Zone) ด้านตะวันออกตอนเหนือ	บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม ลาดพร้าว	ดอนเมือง	TTL industries public company limited บริษัท อินแทค แอพาเรล จำกัด
8	เขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง (Transition Zone) ด้านตะวันออกตอนใต้	บางกะปิ คันนายาว วังทองหลาง บึงกุ่ม สะพานสูง สวนหลวง	ไม่สามารถ เก็บข้อมูลได้ ในเวลา ที่กำหนด	ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ ในเวลาที่กำหนด
9	เขตเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดี	คลองสามวา หนองจอก	ไม่สามารถ เก็บข้อมูลได้ ในเวลา ที่กำหนด	ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ ในเวลาที่กำหนด
10	เขตศูนย์ชุมชนชานเมืองรองรับสนามบิน สุวรรณภูมิ	ลาดกระบัง มีนบุรี ประเวศ	มีนบุรี ลาดกระบัง	บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด บริษัท เกลต้า จำกัด บริษัท ยูนิชั่น จำกัด

ตาราง 2.1		พื้นที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ)		
โซน	ลักษณะพื้นที่	เขตพื้นที่ในแต่ละโซน	เขตที่สุ่มเลือกได้	สถานประกอบการ
11	เขตเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดี ผสมผสานพื้นที่เกษตรกรรม	ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางแค หนองแขม	ตลิ่งชัน หนองแขม	โรงพิมพ์ อำนวยสาส์น บริษัท รุ่งแสงฟ้า บริษัท ฟาร์อีส อุตสาหกรรม ปิ่นด้าย จำกัด
12	เขตเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ	บางขุนเทียน	บริษัท มิกซ์สตาร์ จำกัด

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ในขั้นตอนแรกผู้วิจัยสุ่มเลือกเขตที่อยู่ในโซนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในแต่ละโซนมา จำนวน 1-2 เขต จากนั้นสุ่มเลือกสถานประกอบการที่อยู่ในแต่ละเขตมาจำนวน 2 สถานประกอบการ แล้วทำการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจำนวน 40 ราย โดยสุ่มเลือกกลุ่มคนงานในสถานประกอบการทั้งเพศหญิง และเพศชาย ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน ในบางครั้งเมื่อสุ่มเลือกสถานประกอบการได้แล้ว แต่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เช่น มีพนักงานจำนวนน้อย หรือมีพนักงานที่เป็นเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น หรือทางสถานประกอบการไม่สะดวกในวัน/เวลา ดังกล่าว ก็ต้องมีการสุ่มเลือกสถานประกอบการตัวอย่างหลายครั้ง

การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการในปี พ.ศ. 2551 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 10-29 มีนาคม พ.ศ. 2551 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ประสานงาน

กับสำนักงานเขตพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ประสานงานกับสถานประกอบการให้กับนักวิจัย ในวันที่ลงเก็บข้อมูลด้วยทุกครั้ง

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป็นผู้ที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยทั้งหมด ก่อนที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง นักวิจัยได้อธิบายวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือกับผู้ตอบแบบสอบถามให้ตอบตามความเป็นจริง รวมทั้งให้ตอบทุกข้อคำถาม โดยรับรองว่าคำตอบที่ได้จะไม่มีการนำไปเปิดเผยเป็นรายบุคคล หรือรายงานสถานประกอบการเด็ดขาด

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 1,022 ราย จากทั้งหมด 24 สถานประกอบการ เป็นเพศหญิง และเพศชายในจำนวนเท่ากัน ผลการสำรวจข้อมูลจะนำเสนอเป็น 3 ส่วน คือ

1. ข้อมูลลักษณะประชากร
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
3. ข้อมูลด้านพฤติกรรม

รวมค่าเฉลี่ย

อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุน้อยที่สุดเท่ากับ 15 ปี เพศหญิงและชาย ประมาณ 30 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.1 มีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 49 ปี และ

ตาราง 2.2 อายุของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ					
	จำนวน	ค่าเฉลี่ยอายุ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	อายุน้อยที่สุด	อายุมากที่สุด
หญิง	503	29.9	8.4	16	49
ชาย	507	29.0	7.8	15	49
รวม	1,010	29.5	8.1	15	49

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) ของกลุ่มคนงาน ที่มีภูมิลำเนาในภาคกลาง และภาคเหนือ มีในสถานประกอบการ พบว่าส่วนใหญ่มีภูมิลำเนามาจากจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาเป็นคนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนคนงานในสถานประกอบการ

ตาราง 2.3 ภูมิลำเนาของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ						
ภูมิลำเนา	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล	111	23.3	84	17.6	195	20.4
ภาคกลาง	61	12.8	55	11.4	116	12.1
ภาคเหนือ	66	13.8	69	14.4	135	14.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	224	47.0	250	52.2	474	49.6
ภาคใต้	15	3.1	21	4.4	36	3.8

ระยะเวลาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการพบว่าในภาพรวมกลุ่มคนงานในสถานประกอบการจะอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ค่ามัธยฐาน

เท่ากับ 9 ปี กลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่เป็นเพศหญิง เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนานกว่าคนงานในสถานประกอบการที่เป็นเพศชาย

ตาราง 2.4

ระยะเวลา(ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ

ระยะเวลาที่เข้ามาอาศัยในกรุงเทพมหานคร	จำนวน	Percentile 25	มัธยฐาน (ปี)	Percentile 75
หญิง	479	4.25	10	21.0
ชาย	491	3.21	7.4	15.4
รวม	970	3.60	9	20.0

กลุ่มคนงานในสถานประกอบการเกือบครึ่งหนึ่งจบการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ประมาณหนึ่งในสี่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา กลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาคือ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งจบการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีมีประมาณร้อยละ 9, 11.0 และ 10.6 ตามลำดับ กลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มากกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิง ระดับการศึกษานั้นกลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงมีส่วนมากกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย

ตาราง 2.5

ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ

ระดับการศึกษา	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้เรียนหนังสือ	3	0.6	-	-	3	0.3
ประถมศึกษา	139	27.7	117	22.9	256	25.3
มัธยมศึกษา	204	40.6	262	51.4	466	46.0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	47	9.4	47	9.2	94	9.3
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	55	11.0	42	8.2	97	9.6
ปริญญาตรี	53	10.6	41	8.0	94	9.3
สูงกว่าปริญญาตรี	1	0.2	1	0.2	2	0.2

สถานภาพสมรสของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่แล้ว พบว่าแต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคู่ของตนเอง มีประมาณหนึ่งในสี่ที่อยู่ร่วมกันกับคู่โดยที่ไม่ได้แต่งงานกัน คนงานในสถานประกอบการที่เป็นโสดและไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีประมาณร้อยละ 17 ในขณะที่เป็นโสดและเคยมีเพศสัมพันธ์มีประมาณร้อยละ 10

มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยก ประมาณร้อยละ 4 เมื่อวิเคราะห์กลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิง พบว่ามีสถานภาพสมรส แต่งงาน และอยู่ร่วมกัน มีสถานภาพที่เป็นโสด และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งที่เป็นหม้าย/หย่า/แยกมากกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย

ตาราง 2.6 สถานภาพสมรสของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ

สถานภาพสมรส	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โสด และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	126	24.7	51	10.0	177	17.3
โสด และเคยมีเพศสัมพันธ์	24	4.7	76	14.8	100	9.8
แต่งงานและอยู่กินด้วยกัน	242	47.5	217	42.4	459	44.9
อยู่กินด้วยกันเฉยๆ โดยไม่แต่งงาน	91	17.8	152	29.7	243	23.8
หย่า/แยก	23	4.5	15	2.9	38	3.7
หม้าย	4	0.8	1	0.2	5	0.5

ลักษณะการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่มีคู่ครอง (ทั้งแต่งงานและไม่ได้แต่งงาน)พบว่าคนงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่ (เกือบร้อยละ 80) มีคู่ครองอยู่ร่วมกันทุกวัน คนงานในสถานประกอบการที่มีคู่ครอง

และอยู่ร่วมกันเป็นบางครั้งบางคราว มีประมาณร้อยละ 16 และที่เหลืออยู่ร่วมกันกับคู่ครองเฉพาะวันหยุดสัปดาห์ เมื่อวิเคราะห์กลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศชาย – เพศหญิง จะพบว่ามีสัดส่วนของการอยู่ร่วมกันของคู่ครองไม่ต่างกัน

ตาราง 2.7 ลักษณะการอยู่ร่วมกันของคู่ครองในกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ

การอยู่ร่วมกัน	หญิง (n = 333)		ชาย (n = 369)		รวม (n = 702)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทุกวัน	264	79.3	292	79.1	556	79.2
เฉพาะวันหยุด	17	5.1	26	7.0	43	6.1
เป็นบางครั้งบางคราว	51	15.3	49	13.3	100	14.2
ไม่ตอบ	1	0.3	2	0.5	3	0.4

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม และตำแหน่งอื่นๆ มีสัดส่วนไม่มากนัก ส่วนราย-
พนักงานทั่วๆ ไปของสถานประกอบการ มี ได้ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยประมาณคือ
ประมาณ ร้อยละ 10 ที่เป็นหัวหน้างาน/แผนก 6,500 บาท ต่อเดือน

ตาราง 2.8

ตำแหน่งของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม
จำแนกตามเพศ

ตำแหน่ง	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พนักงานทั่วไป	457	90.0	443	86.9	900	88.4
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด/ปลอดภัย	4	0.8	1	0.2	5	0.5
หัวหน้าแผนก	44	8.7	53	10.4	97	9.5
นักวิชาการ	2	0.4	4	0.8	6	0.6
ผู้จัดการ	1	0.2	9	1.8	10	1.0
รายได้ต่อเดือน (ค่ามัธยฐาน)	6,500		6,500		6,500	
Percentile 25	5,200		5,400		5,200	
Percentile 75	8,000		8,000		8,000	

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

จากการสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ จำนวน 5 ข้อ พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93) สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในข้อที่ 1 ได้ถูกต้องมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ข้อที่ 5 ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์แยกเพศหญิง - เพศชาย จะพบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศหญิงมีสัดส่วนที่ตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ในข้อที่ 2 ข้อที่ 3 และข้อที่ 5 มากกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศชาย ส่วนกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อมีประมาณ 1 ใน 3 โดยเพศชายมีสัดส่วนของการตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อมากกว่ากลุ่มเพศหญิงเล็กน้อย

ตาราง 2.9

ร้อยละของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง จำแนกตามเพศ

ข้อ	ความรู้เรื่องเอดส์	หญิง (n = 510)		ชาย (n = 512)		รวม (n = 1,022)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	การใช้ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้	461	90.4	484	94.5	945	92.5
2	การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี และคู่นอนนั้นไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	412	80.8	396	77.3	808	79.1
3	บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้	382	74.9	364	71.1	746	73.0
4	ยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้	277	54.3	318	62.1	595	58.2
5	กินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	402	78.8	388	75.8	790	77.3
ตอบถูกทุกข้อ		176	34.5	188	36.7	364	35.6

เมื่อวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่มีอายุน้อยระหว่าง 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ น้อยกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อประมาณร้อยละ 45 ในกลุ่มอายุ 30-34 ปี เป็นกลุ่มที่สามารถตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง ในสัดส่วนมากที่สุด

คือ ร้อยละ 48

เมื่อวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของกลุ่มที่เคยกับกลุ่มไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม สามารถตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่เคยมีเพศสัมพันธ์ และกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีประมาณ 1 ใน 3 ที่สามารถตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ

ตาราง 2.10

ร้อยละของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ จำแนกตามอายุและประสบการณ์ทางเพศ

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	จำนวน	ตอบถูกทุกข้อ	
		จำนวน	ร้อยละ
กลุ่มอายุ			
15 – 19 ปี	97	19	19.6
20 – 24 ปี	218	55	25.2
25 – 29 ปี	254	92	36.2
30 – 34 ปี	179	85	47.5
35 – 39 ปี	133	53	39.8
40 – 44 ปี	64	29	45.3
45 – 49 ปี	65	29	44.6
ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์			
เคย	845	299	35.4
ไม่เคย	177	65	36.7

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน พบว่าส่วนใหญ่แล้ว (ร้อยละ 95) มีเพศสัมพันธ์โดยการสมัครงใจ มีประมาณร้อยละ 5 ที่มีเพศสัมพันธ์โดยการถูก

บังคับ เมื่อวิเคราะห์กลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศหญิง-เพศชาย พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่มีเพศสัมพันธ์โดยการถูกบังคับ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

ตาราง 2.11 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามเพศ						
เพศสัมพันธ์	หญิง (n = 510)		ชาย (n = 512)		รวม (n = 1,022)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์						
เคยมี	384	75.3	461	90.0	845	82.7
ไม่เคยมี	126	24.7	51	10.0	177	17.3
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก						
ถูกบังคับ	34	8.9	12	2.6	46	5.4
สมัครงใจ	350	91.1	447	97.0	797	94.3

คู่แรกครั้งแรกของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83) มีเพศสัมพันธ์กับคู่อริหรือแฟน รองลงมาเป็นบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน และบุคคลที่ขายบริการทางเพศ ตามลำดับ ส่วนการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน มีเพียงจำนวน 2 รายเท่านั้น เมื่อวิเคราะห์กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ

เพศหญิง และเพศชาย พบว่าเพศหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่อริหรือแฟน เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 96) ส่วนกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก กับคู่อริหรือแฟน ร้อยละ 73 กับผู้หญิงที่รู้จักคุ้นเคย ร้อยละ 15 สำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขายบริการทางเพศและกับผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 6

ตาราง 2.12		ประเภทของคู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามเพศ				
ประเภทคู่ครอง	หญิง (n = 384)		ชาย (n = 461)		รวม (n = 845)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คูรัก/แฟน	367	95.6	334	72.5	701	83.0
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	10	2.6	69	15.0	79	9.3
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	5	1.3	26	5.6	31	3.7
ผู้ขายบริการทางเพศ	1	0.3	29	6.3	30	3.6
เพศเดียวกัน	1	0.3	1	0.2	2	0.2

อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่แล้ว (ร้อยละ 48) มีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 15 – 19 ปี มีกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เมื่ออายุต่ำกว่า 15 ปี ประมาณร้อยละ 5 และมีร้อยละ 11 ที่มีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกเมื่ออายุ 40 ปี หรือมากกว่า ในช่วงอายุ 30 – 39 ปี เป็นช่วงอายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยมาก

ตาราง 2.13		อายุของการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ				
อายุ	หญิง (n = 384)		ชาย (n = 461)		รวม (n = 845)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
9 – 14 ปี	5	1.3	35	7.6	40	4.7
15 – 19 ปี	145	37.8	260	56.4	405	47.9
20 – 24 ปี	149	38.8	96	20.8	245	29.0
25 – 29 ปี	43	11.2	17	3.7	60	7.1
30 – 34 ปี	2	0.5	2	0.4	4	0.5
35 – 39 ปี	1	0.3	1	0.2	2	0.2
40 ปีขึ้นไป	39	10.2	50	10.8	89	10.5
ค่าเฉลี่ย	20.4		18.2		19.2	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	3.7		3.1		3.5	
อายุต่ำสุด	9		9		9	
อายุมากที่สุด	45		35		45	

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีร้อยละ 37 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก แล้วมีการใช้ถุงยางอนามัย

กลุ่มคนงานเพศชาย มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่ากลุ่มคนงานเพศหญิง

ตาราง 2.14 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก						
การใช้ถุงยางอนามัย	หญิง (n = 384)		ชาย (n = 461)		รวม (n = 845)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ใช้	112	29.2	201	43.6	313	37.0
ไม่ใช้	272	70.8	260	56.4	532	63.0

เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่มีอายุก่อนข้างน้อย มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยในครั้งแรกสูงกว่ากลุ่มที่มีอายุค่อนข้างมาก กลุ่มที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยในครั้งแรกน้อยกว่ากลุ่มอายุที่น้อยกว่า 30 ปี

ตาราง 2.15 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามอายุ			
กลุ่มอายุ	จำนวน (n = 838)	ใช้ถุงยางอนามัย	
		จำนวน	ร้อยละ
15 – 19 ปี	36	21	58.3
20 – 24 ปี	179	87	48.6
25 – 29 ปี	229	85	37.1
30 – 34 ปี	162	51	31.5
35 – 39 ปี	120	32	26.7
40 – 44 ปี	56	15	26.8
45 – 49 ปี	56	18	32.1

เหตุผลของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าได้แต่งงานกันแล้วเป็นสามี-ภรรยาแล้ว รองลงมาคือไม่ได้เตรียม หรือพกถุงยางอนามัยไว้ตลอดเวลา ซึ่งเหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัย ในกลุ่ม

หญิง-ชายจะแตกต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือ กลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงจะให้เหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยในเรื่องของความไว้วางใจใจคู่ครองของตน ในขณะที่กลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายจะให้เหตุผลเกี่ยวกับความรู้สึก และอารมณ์ของการใช้ถุงยางอนามัย

ตาราง 2.16

เหตุผลของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย

เหตุผล	จำนวน (n = 532)	ร้อยละ
ไม่ตอบ	237	44.5
แต่งงาน/กับภรรยา/กำลังแต่งงาน/เป็นสามี-ภรรยา/อยู่กับภรรยาเลย/เป็นสามี/เข้าเรือนหอ/มีกับคนที่แต่งงานด้วย/คนนั้นเป็นสามีของเรา/แต่งงานครั้งแรก	57	10.7
ไม่มี/หาไม่ได้/ตึกมากแล้ว/ไม่ได้หามาก่อน/ไม่ได้พกถุงยาง/ไม่ได้เตรียมไว้/หาไม่ทัน/ไม่ได้ซื้อ/ไม่กล้าซื้อ/ไม่มีติดตัว/หายาก/หาไม่ได้/รู้เท่าไม่ถึงการณ์/ไม่มีเวลาซื้อ	36	6.8
มีความเสี่ยงน้อยมาก/รู้จักผู้หญิงคนนั้นดีมาก/มั่นใจแฟน/มั่นใจว่าไม่เป็น/แฟนไม่เคยเที่ยวผู้หญิง/อยู่ต่างจังหวัดไม่เคยเที่ยว/แฟนไม่เคยยุ่งกับใคร/มั่นใจซึ่งกันและกัน/มั่นใจว่าไม่ติดเชื้อ/ไว้วางใจกันและกัน/ไม่มีคู่นอนหลายคน/ไม่คิดว่าเขาจะเป็นโรค/มีคู่นอนคนเดียว/แฟนไม่เคยเที่ยวกลางคืน/เชื่อถือได้	31	5.8
ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนี้/ฉุกเฉิน/ไม่มีและเร่งรีบ/วัยรุ่นใจร้อน/ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน/ไม่ได้ตั้งใจรีบร้อน/ไม่ทันตั้งตัว/สถานการณ์คับขัน/คิดไม่ทัน/ไม่คิดว่าจะได้/กะทันหัน/คิดไม่ถึง/คิดไม่ถึง/คิดไม่ทัน	26	4.9
แฟน (คู่รัก)/มีแฟนคนเดียว/คบคนเดียวตลอด/เป็นแฟนคนแรกและใกล้ชิดกัน	24	4.5
กินยาคุมกำเนิด	17	3.2
ยังไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น/ไม่เคยทั้งคู่/ครั้งแรก/ผู้หญิงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์/เปิดบริสุทธิ์/บริสุทธิ์ทั้งคู่	13	2.4
ช่วงนั้นยังไม่ระบาด/ความรู้เรื่องเอดส์ยังไม่เข้าถึง/ยังไม่มีโรคเอดส์/ช่วงนั้นยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องโรคเอดส์/ยังไม่มีข่าวเรื่องโรคเอดส์	13	2.4
ไม่ทราบ/ไม่รู้/ไม่รู้จัก/ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบรายละเอียด/ไม่รู้เรื่อง	12	2.3
ดูใจมานาน/เรารู้จักกันสัปดาห์/คบกันมาหลายปี/คู่รักที่อยู่กันด้วยกัน/คิดที่จะอยู่กินร่วมกัน/ดูใจกัน/ ระยะเวลา/รู้จักกันเป็นแฟนคบหากันมานาน/เรารักกัน	12	2.3
ไม่ได้อารมณ์/มันไม่มัน/ไม่ชอบ/ไม่เข้าใจ/ขี้เกียจ	10	1.9
อยากมีลูก/พร้อมจะมีบุตร/เป็นคู่รักพร้อมที่จะมีบุตรด้วยกัน	9	1.7

ตาราง 2.16 เหตุผลของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย (ต่อ)		
เหตุผล	จำนวน (n = 532)	ร้อยละ
ถูกบังคับ/ไม่สมัครใจ/ไม่เต็มใจมีเพศสัมพันธ์/ถูกขืนใจ แต่เขาก็รับผิดชอบ	6	1.1
รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่/ไม่จำเป็น/ไม่อยากจะใช้	5	0.9
ใช้ไม่เป็น/ไม่เคย	5	0.9
ผู้ชายเมา	4	0.8
แฟนทำการตรวจเลือดแล้วปลอดภัย/ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน/ตรวจร่างกายแล้ว	4	0.8
ลืมน	3	0.6
ไม่เป็นที่นิยม/กลัวไม่ดี	2	0.4
เด็กด้วยกันทั้งคู่/ไม่รู้ตอนนั้นเด็กมาก	2	0.4
เป็นคนที่บ้านใกล้กัน/ย้อนไป 10 ปี ไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือให้ความรู้การตรวจเลือดก่อนแต่งงาน	2	0.4
รักเดียวใจเดียว	1	0.2
ผู้หญิงด้วยกัน	1	0.2

ผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นที่ผ่านมา

กลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อน (n = 845) พบว่ามีประมาณ ร้อยละ 7 ที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และในจำนวนนี้จะไม่นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปี มีจำนวน 787 ราย เป็นเพศชาย 431 ราย และเป็นเพศหญิง 356 ราย

จำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมาของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ พบว่าโดยเฉลี่ย

ประมาณ 1.5 คน ผู้ที่มีคู่นอนมากที่สุดเท่ากับ 20 คน เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของจำนวนคู่นอนน้อยกว่าเพศชาย

เมื่อวิเคราะห์จำนวนคู่นอนตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 – 24 ปี เป็นกลุ่มที่มีคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่า 1 คนขึ้นไป มากกว่ากลุ่มอายุที่มากกว่า รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป มีคู่นอนมากกว่า 1 คนขึ้นไป ร้อยละ 18 ส่วนในกลุ่มอายุ 25 – 34 ปี มีคู่นอนมากกว่า 1 คน ขึ้นไป ร้อยละ 16

ตาราง 2.17		จำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ					
ลักษณะประชากร	จำนวน	จำนวนคู่นอนในรอบปี					
		1 คน		มากกว่า 1 คนขึ้นไป		ไม่ตอบ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพศ							
หญิง	356	277	77.8	38	10.7	41	11.5
ชาย	431	244	56.6	114	26.5	73	16.9
อายุ							
15 – 24 ปี	418	270	64.6	91	21.8	57	13.6
25 – 34 ปี	262	180	68.7	42	16.0	40	15.3
35 ปีขึ้นไป	107	71	66.4	19	17.8	17	15.9
ค่าเฉลี่ย		เฉลี่ย = 1.2 คน		เฉลี่ย = 1.9 คน		รวม = 1.6 คน	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		เฉลี่ย = .57		เฉลี่ย = 1.44		รวม = 1.86	

ประเภทของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการเกือบทั้งหมดมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีกับคู่นอนที่เป็นคนรักหรือแฟนของตนเอง มีประมาณร้อยละ 16 มีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักกันคุ้นเคย ประมาณร้อยละ 10 ที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักกันผิวเผิน กลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่มีเพศสัมพันธ์

กับผู้ชายบริการทางเพศประมาณร้อยละ 5 และมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเพศเดียวกันร้อยละ 2 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่คู่อรักหรือแฟนมากกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงค่อนข้างชัดเจน

ตาราง 2.18		ประเภทของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ					
ประเภทของคู่นอน*		หญิง (n = 356)		ชาย (n = 431)		รวม (n = 787)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คู่อรัก/แฟน		351	98.6	409	94.9	760	96.6
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย		23	6.5	101	23.4	124	15.8
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน		2	0.6	68	15.8	70	8.9
ผู้ชายบริการทางเพศ		3	0.8	37	8.6	40	5.1
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน**		7	2.0	9	2.1	16	2.0

หมายเหตุ: * สามารถตอบคำถามได้มากกว่า 1 ประเภท

** การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันในกลุ่มชาย หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่มีการสอดใส่ทางทวารหนัก

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการมีการใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้งกับคู่นอนประเภทที่เป็นผู้ขายบริการทางเพศมากที่สุด รองลงมาคือ กับคู่นอนที่รู้จักกันผิวเผิน คู่นอนที่

รู้จักกันคุ้นเคย คู่นอนที่เป็นคู่อริหรือแฟน และคู่นอนที่เป็นเพศเดียวกัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยค่อนข้างมาก คือ มากกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป

ตาราง 2.19		สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ							
ประเภทคู่นอน*	จำนวน	การใช้ถุงยางอนามัย							
		ทุกครั้ง		บางครั้ง		ไม่ใช่เลย		ไม่ตอบ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คู่อริ/แฟน	760	121	15.9	165	21.7	425	55.9	49	6.4
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	124	61	49.2	28	22.6	16	12.9	19	15.3
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	70	37	52.9	18	25.7	4	5.7	11	15.7
ผู้ขายบริการทางเพศ	40	31	77.5	3	7.5	1	2.5	5	12.5
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน**	16	1	6.3	3	18.8	6	37.5	6	37.5

หมายเหตุ: * สามารถตอบคำถามได้มากกว่า 1 ประเภท

** การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันในกลุ่มชาย หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่มีการสอดใส่ทางทวารหนัก

เมื่อวิเคราะห์การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งจำแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายที่รู้จักกันผิวเผินมีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายที่รู้จักกันคุ้นเคย และกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่อริหรือแฟน ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากที่สุด รองลงมาคือ

กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคย กับผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน กับคู่อริหรือแฟน และกับผู้ขายด้วยกัน ตามลำดับ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มคนงานในสถานประกอบการทั้งหญิง-ชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนที่ไม่ใช่คู่อริหรือแฟน (คู่นอนชั่วคราว) มากกว่าคู่นอนที่เป็นคู่อริหรือแฟน (คู่นอนประจำ) ยกเว้นในกลุ่มที่มีคู่นอนเป็นเพศเดียวกันที่มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งค่อนข้างน้อยมาก

ตาราง 2.20		สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ											
ประเภทคู่นอน**		การใช้ถุงยางอนามัย*											
		หญิง (n = 356)						ชาย (n = 431)					
		ทุกครั้ง		บางครั้ง		ไม่ใช้เลย		ทุกครั้ง		บางครั้ง		ไม่ใช้เลย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คูรัก/แฟน		38	10.8	72	20.5	218	62.1	83	20.3	93	22.7	207	50.6
บุคคลที่รู้จักกัน คุ้นเคย		6	26.1	5	21.7	4	17.4	55	54.5	23	22.8	12	11.9
บุคคลที่รู้จักกัน ผิวเผิน		1	50.0	0	0	1	50.0	36	52.9	18	26.5	3	4.4
ผู้ขายบริการ ทางเพศ		0	0	2	66.7	0	0	31	83.8	1	2.7	1	2.7
บุคคลที่มีเพศ เดียวกัน***		0	0	2	28.6	4	57.1	1	11.1	1	11.1	2	22.2

หมายเหตุ: * ไม่แสดงค่าร้อยละของผู้ที่ไม่ตอบคำถามนี้

** สามารถตอบคำถามได้มากกว่า 1 ประเภท

*** การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันในกลุ่มชาย หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่มีการสอดใส่ทางทวารหนัก

บทสรุปและข้อค้นพบ

สำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของกลุ่ม
คนงานในสถานประกอบการ พบว่าส่วนใหญ่
(ร้อยละ 93) มีเพศสัมพันธ์กับคูรัก/แฟน มี
ประมาณร้อยละ 4 ที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่
รู้จักกันคุ้นเคย ที่เหลือประมาณร้อยละ 1 ที่มี
เพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน ผู้ที่ขาย-
บริการทางเพศ และบุคคลที่มีเพศเดียวกัน เมื่อ
วิเคราะห์ประเภทคู่นอนในครั้งล่าสุด จำแนกตาม
เพศพบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิง
เกือบทั้งหมดมีเพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟน

ในขณะที่กลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายมี
ร้อยละ 89 ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือ
แฟน อีกร้อยละ 11 ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับ
บุคคลอื่นๆ

การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์
ครั้งล่าสุด พบว่ามีร้อยละ 27 ที่ใช้ถุงยางอนามัย
กลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายใช้ถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด มากกว่ากลุ่ม
คนงานในสถานประกอบการหญิง

ตาราง 2.21 การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย กับคู่นอนประเภตต่างๆ จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย	หญิง (n = 356)		ชาย (n = 431)		รวม (n = 787)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเภตคู่นอน						
คูรัก/แฟน	351	98.6	383	88.9	734	93.3
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	0	0	31	7.2	31	3.9
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	0	0	10	2.3	10	1.3
ผู้ขายบริการทางเพศ	1	0.3	6	1.4	7	0.9
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	4	1.1	1	0.2	5	0.6
การใช้ถุงยางอนามัย						
ใช้	74	20.8	140	32.5	214	27.2
ไม่ใช้	282	79.2	291	67.5	573	72.8

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนในสถานประกอบการ

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีกลุ่มคนงานในสถานประกอบการประมาณร้อยละ 3 ที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน โดยเป็นกลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศหญิง-เพศชายในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง พบว่ามีผู้ที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน แต่ไม่ตอบคำถามการใช้ถุงยางอนามัยมากคือ เกือบครึ่งหนึ่ง ซึ่งมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

ตาราง 2.22 เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์	หญิง (n = 356)		ชาย (n = 431)		รวม (n = 787)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน						
มี	10	2.8	10	2.3	20	2.5
ไม่มี	346	97.2	421	97.7	767	97.5
การใช้ถุงยางอนามัย*						
ทุกครั้ง	4	40.0	3	30.0	7	35.0
บางครั้ง	2	20.0	1	10.0	3	15.0
ไม่ใช้	1	10.0	0	0	1	5.0
ไม่ตอบ	3	30.0	6	60.0	9	45.0

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน

ผลการวินิจฉัยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น การมีปัสสาวะแสบขัด มีแผลที่อวัยวะเพศ การมีหนองไหลจากอวัยวะเพศ เป็นต้น พบว่ามีประมาณร้อยละ 6 โดยเป็นกลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศหญิงมากกว่าคนงานในสถานประกอบการเพศชายเล็กน้อย

การปฏิบัติตนเมื่อพบว่าตนเองมีอาการที่ผิดปกติ กลุ่มคนงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่จะไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล รองลง

มาคือ การซื้อยามารับประทานเอง และปรึกษากับคู่นอนหรือแฟนในสัดส่วนที่เท่ากัน มีประมาณร้อยละ 10 ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อพบอาการผิดปกติ

เมื่อวิเคราะห์จำแนกตามเพศหญิง-เพศชาย พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศหญิงส่วนใหญ่เมื่อพบอาการผิดปกติจะไปรักษาที่สถานพยาบาล ในขณะที่กลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศชายจะไปรักษาที่สถานพยาบาลกับซื้อยารับประทานเองในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ตาราง 2.23

การมีอาการผิดปกติ และการปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ

อาการผิดปกติ/การปฏิบัติตน	หญิง (n = 510)		ชาย (n = 512)		รวม (n = 1,022)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อาการผิดปกติ						
มี	33	6.5	25	4.9	58	5.7
ไม่เคยมี	477	93.5	487	95.1	964	94.3
การปฏิบัติ*						
ปรึกษาเพื่อน	2	6.1	2	8.0	4	6.9
ปรึกษาญาติพี่น้อง	1	3.0	0	0	1	1.7
ปรึกษาแฟน/คู่นอน	5	15.2	3	12.0	8	13.8
ซื้อยามากินเอง	2	6.1	6	24.0	8	13.8
ไปรักษาตามสถานพยาบาล	18	54.5	7	28.0	25	43.1
ไม่ได้ทำอะไรเลย	3	9.1	3	12.0	6	10.3
ไม่ตอบ	2	6.1	4	16.0	6	10.3

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยมีอาการผิดปกติ

ดูขงขณณมัย

ความสะดวกในการซื้อขงขณณมัยจากตู้จำหน่ายขงขณณมัยอัตโนมัติ พบว่ากลุ่มคณงานในสถานประกอบการมีความสะดวกที่จะซื้อขงขณณมัยจากตู้จำหน่ายขงขณณมัยอัตโนมัติประมาณร้อยละ 40 และมีความสะดวก

ที่จะซื้อขงขณณมัยมาใช้เองร้อยละ 57 กลุ่มคณงานในสถานประกอบการเพศหญิง มีความสะดวกที่จะซื้อขงขณณมัยมาใช้เอง และซื้อขงขณณมัยจากตู้จำหน่ายอัตโนมัติน้อยกว่ากลุ่มคณงานในสถานประกอบการเพศชาย

ตาราง 2.24 การใช้ขงขณณมัยจากตู้จำหน่ายอัตโนมัติ และการซื้อขงขณณมัยมาใช้เอง จำแนกตามเพศ

ขงขณณมัย*	หญิง (n = 509)		ชาย (n = 509)		รวม (n = 1,018)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีความสะดวกที่จะซื้อขงขณณมัยจากตู้จำหน่ายอัตโนมัติ	137	26.9	267	52.5	404	39.7
มีความสะดวกที่จะซื้อขงขณณมัย	218	42.9	355	70.0	537	56.5

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนรวมในกลุ่มที่ไม่เคยใช้ขงขณณมัย แต่ไม่คิดสัดส่วนในกลุ่มที่ไม่ตอบคำถามนี้

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มคณงานในสถานประกอบการร้อยละ 31 ที่เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา โดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

การทราบผลการตรวจเลือดนั้น พบว่าในกลุ่มที่มีการตรวจเลือดมีร้อยละ 71 ที่ทราบผลการตรวจเลือด และมีถึงร้อยละ 29 ที่ไม่ทราบผลการตรวจเลือด กลุ่มคณงานในสถานประกอบการเพศหญิง-เพศชายที่ทราบผลการตรวจเลือดมีสัดส่วนไม่แตกต่างกัน

ตาราง 2.25 การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี	หญิง (n = 510)		ชาย (n = 512)		รวม (n = 1,022)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การตรวจเลือด						
เคย	132	25.9	182	35.5	314	30.8
ไม่เคย	377	74.1	330	64.5	707	69.2
ผลการตรวจเลือด*						
ทราบ	95	72.0	128	70.3	223	71.0
ไม่ทราบ	13	9.8	17	9.3	30	9.6
ไม่ตอบ	24	18.2	37	20.3	61	19.4

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการประมาณ 2 ใน 3 ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยกลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศหญิงอย่าง

เห็นได้ชัดเจน

พฤติกรรมการใช้สารเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาบ้า เฮโรอีน/กัญชา เป็นต้น ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการพบว่ามีประมาณร้อยละ 8 ที่เคยเสพสารเสพติด ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และเกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย

ตาราง 2.26

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติด
จำแนกตามเพศ

พฤติกรรม การใช้สารเสพติด	หญิง (n = 510)		ชาย (n = 512)		รวม (n = 1,022)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา)						
ดื่ม	266	52.3	415	81.1	681	66.7
ไม่ดื่ม	243	47.7	97	18.9	340	33.3
เสพยาเสพติด (ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา)						
เสพ	6	1.2	74	14.5	80	7.8
ไม่เสพ	504	98.0	437	85.5	941	92.2

ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสารเสพติด พบว่าในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มคนงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นบางครั้งบางคราว หรือแล้วแต่โอกาสเท่านั้น มีประมาณ 1 ใน 4 ที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ ซึ่งสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ เป็นกลุ่ม

คนงานในสถานประกอบการเพศชายมากกว่าในกลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศหญิง

สำหรับการใช้สารเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีกลุ่มคนงานในสถานประกอบการประมาณร้อยละ 4 ที่ต้องเสพยาเสพติดเป็นประจำทุกวัน มีประมาณร้อยละ 20 ที่เสพแล้วแต่โอกาส และส่วนใหญ่แล้วจะแค่ทดลองเสพ

ตาราง 2.27		ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการเสพสารเสพติด จำแนกตามเพศ				
ความถี่	เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์			สารเสพติด		
	หญิง (n= 266)	ชาย (n= 415)	รวม (n= 681)	หญิง (n= 6)	ชาย (n= 74)	รวม (n= 80)
ทุกวัน	2.3	7.7	5.6	16.7	2.7	3.8
เป็นประจำ	7.8	25.1	18.4	na	na	na
แล้วแต่โอกาส	41.4	43.9	42.9	16.7	20.3	20.0
นานๆ ครั้ง/ทดลองเสพ	48.5	23.4	33.2	66.7	77.0	76.3

เพศสัมพันธ์หลังจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการเสพสารเสพติด พบว่ากลุ่มที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีเพศสัมพันธ์หลังดื่ม ร้อยละ 58 (คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา) ส่วนในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพสารเสพติดมีร้อยละ 36 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของผู้เสพสารเสพติดมีเพศสัมพันธ์หลังเสพ

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง มีสัดส่วนน้อยมาก คือ ร้อยละ 16 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และร้อยละ 14 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพสารเสพติด สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในกรณีทั้ง 2 นี้ เป็นเพศชายในสัดส่วนสูงกว่าเพศหญิง

ตาราง 2.28		การใช้ถุงยางอนามัยกับการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำแนกตามเพศ				
พฤติกรรม	หญิง (n = 266)		ชาย (n = 415)		รวม (n = 681)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	96	48.5	226	64.0	322	58.4
การใช้ถุงยางอนามัย						
ทุกครั้ง	11	11.5	41	18.1	52	16.1
บางครั้ง	18	18.8	47	20.8	65	20.2
ไม่ใช้เลย	49	51.0	101	44.7	150	46.6
ไม่ตอบ	18	18.8	37	16.4	55	17.1

ตาราง 2.29 การใช้ถุงยางอนามัยกับการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด จำแนกตามเพศ						
พฤติกรรม	หญิง (n = 6)		ชาย (n = 74)		รวม (n = 80)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	1	20.0	28	40.6	29	36.2
การใช้ถุงยางอนามัย						
ทุกครั้ง	0	0	4	14.3	4	13.8
บางครั้ง	0	0	9	32.1	9	31.0
ไม่ใช้เลย	1	100.0	10	35.7	11	37.9
ไม่ตอบ	0	0	5	17.9	5	17.2

การเสพยาเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ พบว่ามีกลุ่มคนงานในสถานประกอบการร้อยละ 1 หรือจำนวน 10 รายเท่านั้น ที่รายงานว่าเคยเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ มีประมาณร้อยละ 7 ที่รายงานว่าเคยใช้สารเสพติดแต่ไม่ใช้วิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ มีร้อยละ 92 ที่รายงานว่าไม่เคยใช้สารเสพติดเลย

ในกลุ่มที่เคยใช้วิธีฉีดสารเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำ พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการเริ่มใช้วิธีการฉีดสารเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 13-23 ปี โดยประมาณครึ่งหนึ่งที่มีการใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น หรือจำนวน 5 คน ใน 10 คนที่เคยใช้วิธีฉีดสารเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำ และในจำนวน 5 คนนี้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้ง จำนวน 2 รายเท่านั้น

ตาราง 2.30 การเสพยาเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ จำแนกตามเพศ



การเสพยาเสพติด โดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ	หญิง (n = 510)		ชาย (n = 512)		รวม (n = 1,022)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคย	2	0.4	8	1.6	10	1.0
อายุ*						
13 ปี	0	0	1	12.5	1	10.0
15 ปี	0	0	1	12.5	1	10.0
17 ปี	0	0	1	12.5	1	10.0
18 ปี	0	0	2	25.0	2	20.0
19 ปี	1	50.0	1	12.5	2	20.0
23 ปี	1	50.0	0	0	1	10.0
ไม่ตอบ	0	0	2	25.0	2	20.0
มีการใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น*(n = 10)	1	50.0	4	50.0	5	50.0
ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้ง** (n = 5)	0	0	2	50.0	2	40.0

หมายเหตุ: * คัดสรรส่วนเฉพาะกลุ่มที่เคยเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ

** คัดสรรส่วนเฉพาะกลุ่มที่เคยเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำและใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับบุคคลอื่น

3

๒/๕๐๖๑๐๕๓๖๗๒



3

ประชากรทั่วไป

การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2551 เป็นรอบที่ 2 (สำรวจครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549) การสำรวจในรอบนี้ ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พื้นที่ที่ทำการสำรวจข้อมูลในรอบปี พ.ศ. 2551 เป็นพื้นที่ที่ได้ทำการสำรวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2549 เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะของการสุ่มเลือกพื้นที่ มีหลายขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มาจำนวน 20 ศูนย์ จาก 68 ศูนย์ (เป็นการสุ่มไว้ในรอบที่แล้ว)

ขั้นตอนที่ 2 สุ่มเลือก 1 ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เป็นตัวอย่างมาจำนวน 2 ชุมชน

ขั้นตอนที่ 3 สุ่มเลือกประชากรทั่วไปที่อยู่ในชุมชนตัวอย่าง ชุมชนละ 30 ราย โดยเป็นเพศหญิง-เพศชายอย่างละครึ่งๆ กัน มีอายุอยู่ระหว่าง 15-49 ปี และอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในส่วนนี้อาสาสมัครของชุมชนในแต่ละชุมชนมีส่วนช่วยในการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามที่ทีมนักวิจัยได้ทำการสุ่มเลือกไว้แล้ว

กลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2551 มีจำนวนทั้งหมด 1,146 ราย เป็นเพศชาย 589 ราย และเป็นเพศหญิง 557 ราย

ตาราง 3.1

พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ศูนย์บริการสาธารณสุข	เขต	ชุมชน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ	ราชเทวี	โค้งรถไฟยมราช, บ้านครัวตะวันตก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์	พญาไท	วัดไผ่ตัน, อุทัยรัตน์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี	ปทุมวัน	ร่วมฤดี, พระเจน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง	ดุสิต	หลังบ้านมนังคศิลา, วัดญวนลำปาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์	ธนบุรี	กุฎีขาว, มัสยิดบ้านสมเด็จ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง	บางนา	เชลียง 1, วงศ์สวัสดิ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย	คลองเตย	บ้านกล้วย, 70 ไร่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์	ยานนาวา	คลองขวาง, วัดช่องลม

ตาราง 3.1

พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ)

ศูนย์บริการสาธารณสุข	เขต	ชุมชน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทน์ ฌิมไพบูลย์	ธนบุรี	ตากสินสัมพันธ์, วัดกันตทาราราม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทน์เที่ยงเนตรวิเศษ	บางคอแหลม	เชิงสะพานกรุงเทพฯ, หลังตลาดเก่า พระยาไกร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล	บางคอแหลม	โรงแก้ว, วัดไผ่เงิน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน พักอุดม	ราชบุรีบูรณะ	รัตนจีนะ, ประคองมิตร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง	บางซื่อ	ยิ้มประยูร, วัดเชิงหวาย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน	จตุจักร	เพชรสยาม, บุษพัฒน์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาาม	บางกอกน้อย	วัดไทยทิศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัตินุทิศ	ลาดกระบัง	เคหะนคร 2
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค	บางแค	ศิริเกษมพัฒนา, ศิริเกษม 1
ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก	บางกะปิ	มัจฉา, วัดกลาง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม	บึงกุ่ม	โพธิ์ทอง, ชูสุวรรณ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 49วัดชัยพฤกษมาลา	ตลิ่งชัน	ริมทางรถไฟชัยพฤกษ์, สะพานผัก คลองศาลเจ้า

การตอบแบบสอบถาม เป็นการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ นักวิจัยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบด้วยความเป็นอิสระ

ยกเว้นมีปัญหาหรือข้อสงสัย นักวิจัยจะเข้าไปช่วยอธิบายและให้ความมั่นใจว่าคำตอบจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคล แต่จะนำเสนอข้อมูลในภาพรวมๆ เท่านั้น

ชุมชนทั่วไป

การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมของคนในชุมชนในรอบปี พ.ศ. 2551 ได้กำหนดผู้ตอบแบบสอบถามให้มีสัดส่วนเพศหญิง-เพศชาย ในจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละชุมชนที่ทำการสำรวจ รวมทั้งได้กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 15-49 ปี

อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม ในรอบปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 31.5 ปี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 10.2 เพศหญิงมีอายุเฉลี่ยมากกว่าเพศชายประมาณ 2 ปี

เมื่อวิเคราะห์เป็นกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่ทำการสำรวจมีสัดส่วนอายุในแต่ละกลุ่มเกือบเท่าๆ กัน เมื่อวิเคราะห์กลุ่มอายุจำแนกตามเพศ พบว่าในกลุ่มที่มีอายุน้อยเพศชายมีสัดส่วนมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย ในกลุ่มอายุที่มากกว่า 35 ปีขึ้นไป เพศหญิงมีสัดส่วน

ตาราง 3.2

อายุของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ

อายุ	หญิง (n = 589)		ชาย (n = 557)		รวม (n = 1,146)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
15 – 19 ปี	82	13.9	108	19.4	190	16.6
20 – 24 ปี	82	13.9	80	14.4	162	14.1
25 – 29 ปี	76	12.9	77	13.8	153	13.4
30 – 34 ปี	81	13.8	85	15.3	166	14.5
35 – 39 ปี	91	15.4	75	13.5	166	14.5
40 – 44 ปี	92	15.6	75	13.5	167	14.6
45 – 49 ปี	85	14.4	57	10.2	142	12.4
ค่าเฉลี่ย	32.4		30.4		31.5	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	10.2		10.1		10.2	

ภูมิลาเนาของกลุ่มประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่าคนส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นคนที่เกิดในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล มีประมาณร้อยละ 17 ที่เกิดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เหลือเกิดในภาค

เหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ภูมิลาเนาของกลุ่มประชากรทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในชุมชน จำแนกตามเพศหญิง – เพศชายแล้วพบว่า มีสัดส่วนไม่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค

ตาราง 3.3

ภูมิลาเนาของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ

ภูมิลาเนา	หญิง (n = 581)		ชาย (n = 553)		รวม (n = 1,134)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล	388	66.8	368	66.5	756	66.7
ภาคกลาง	53	9.1	48	8.7	101	8.9
ภาคเหนือ	32	5.5	29	5.2	61	5.4
ภาคใต้	12	2.1	11	2.0	23	2.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	96	16.5	97	17.5	193	17.0

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าคนในชุมชนมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครประมาณ 23 ปี ค่ามัธย-

ฐาน สำหรับคนในชุมชนที่เป็นเพศหญิงมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครสูงกว่าเพศชายเล็กน้อยประมาณ 3 ปี

ตาราง 3.4

ระยะเวลา (ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มประชากรทั่วไป

ระยะเวลาที่อาศัย อยู่ในกรุงเทพมหานคร	Percentiles 25 (ปี)	ค่ามัธยฐาน (ปี)	Percentile 75 (ปี)
หญิง	17	25	37
ชาย	15	22	33
รวม	16	23	35

กลุ่มประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่แล้วจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาคือ ประถมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าตามลำดับ ส่วนผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยมีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น

เมื่อวิเคราะห์คนในชุมชน จำแนกตามเพศแล้วพบว่าเพศชายจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสัดส่วนที่มากกว่าเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิงมีสัดส่วนของการจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาสูงกว่าในเพศชาย ส่วนระดับการศึกษาอื่นๆ เพศหญิง – เพศชายมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

ตาราง 3.5

การศึกษาของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ

ระดับการศึกษา	หญิง (n = 581)		ชาย (n = 553)		รวม (n = 1,134)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้เรียนหนังสือ	15	2.6	7	1.3	22	1.9
ประถมศึกษา	184	31.3	145	26.2	329	28.9
มัธยมศึกษา	225	38.3	248	44.8	473	41.5
ประกาศนียบัตร	105	17.9	108	19.5	213	18.7
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า	58	9.9	45	8.1	103	9.0

กลุ่มประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีสถานภาพสมรสและอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40) รองลงมาคือ อยู่กันคนเดียว โดยไม่ได้แต่งงาน มีสถานภาพหย่า/แยก หรือเป็นหม้ายประมาณร้อยละ 5 มีประมาณ 1 ใน 4 ที่รายงานว่า ตนเองมีสถานภาพเป็นโสดและไม่เคย

มีเพศสัมพันธ์ แต่คนที่โสดและเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมีประมาณร้อยละ 8 เมื่อวิเคราะห์จำแนกตามเพศแล้ว พบว่าเพศชายมีสถานภาพเป็นโสด แต่มีเพศสัมพันธ์แล้วมากกว่าในเพศหญิง ส่วนเพศหญิงมีสถานภาพสมรสและอยู่กันกับสามีเป็นส่วนใหญ่ หรือเกือบครึ่งหนึ่ง

ตาราง 3.6

ลักษณะการอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรทั่วไป จำแนกตามเพศ

การอยู่ร่วมกัน	หญิง (n = 440)		ชาย (n = 356)		รวม (n = 796)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เป็นประจำทุกวัน	376	85.5	274	77.0	650	81.7
เฉพาะวันหยุด	18	4.1	12	3.4	30	3.8
เป็นบางครั้งบางครั้ง	46	10.5	70	19.7	116	14.6

การประกอบอาชีพของกลุ่มประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่าประมาณ 1 ใน 4 ประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขาย รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน เป็นพนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ ตามลำดับ มีผู้ที่ประกอบอาชีพรับราชการร้อยละ 3 อย่างไรก็ตามมีคนในชุมชน ร้อยละ 29 ที่ไม่ได้ประกอบ

อาชีพ หรือเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน หรือนักศึกษา เมื่อวิเคราะห์จำแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงประมาณ 1 ใน 3 เป็นแม่บ้าน หรือนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ ประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขาย ส่วนในเพศชายประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการเป็นส่วนใหญ่

ตาราง 3.7

อาชีพของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

การประกอบอาชีพ	หญิง (n = 584)		ชาย (n = 551)		รวม (n = 1,135)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/นักเรียน	195	33.4	136	24.7	331	29.2
รับราชการ	24	4.1	15	2.7	39	3.4
พนักงาน/ลูกจ้างในสถานประกอบการ	93	15.9	143	26.0	236	20.8
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	162	27.7	122	22.1	284	25.0
รับจ้างรายวัน	110	18.8	135	24.5	245	21.6

รายได้ต่อเดือนของคนในชุมชนโดยประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน ผู้หญิงจะมีรายได้ต่อเดือนโดยประมาณน้อยกว่าเพศชาย

..

รายได้ต่อเดือนที่ต่ำสุดคือ 500 บาทต่อเดือน และมีผู้มีรายได้สูงสุดคือ 90,000 บาทต่อเดือน

ตาราง 3.8

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

รายได้ต่อเดือน	หญิง (n = 584)		ชาย (n = 551)		รวม (n = 1,135)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่า หรือเท่ากับค่ามัธยฐาน 500 – 7,000 บาท	229	55.7	180	43.9	409	49.8
มากกว่าค่ามัธยฐาน 7,001 – 9,000 บาท	182	44.3	230	56.1	412	50.2
Percentile 25 (บาท)	5,000		6,000		5,000	
มัธยฐาน (บาท)	6,500		8,000		7,000	
Percentile 75 (บาท)	10,000		11,200		10,000	
รายได้ต่ำสุด (บาท)	500		1,500		500	
รายได้สูงสุด (บาท)	90,000		90,000		90,000	

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

จากการสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ จำนวน 5 ข้อ พบว่าคนในชุมชนสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้มากที่สุด รองลงมาคือ การมีคู่นอนคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี ส่วนความรู้เกี่ยวกับ “ยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวี” คนในชุมชนตอบได้ถูกน้อยที่สุดใน

กลุ่มหญิง – กลุ่มชายมีสัดส่วนของความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละข้อ

กลุ่มประชากรทั่วไป ร้อยละ 39 สามารถตอบคำถามได้ถูกทั้ง 5 ข้อ โดยผู้หญิงสามารถตอบคำถามได้ถูกทั้ง 5 ข้อ มีสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มผู้ชาย

ตาราง 3.9		ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง					
ข้อที่	ความรู้เรื่องเอดส์	หญิง (n = 589)		ชาย (n = 557)		รวม (n = 1,146)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	การใช้ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้	527	89.5	506	90.8	1,033	90.1
2	การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี และคู่นอนนั้นไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	491	83.4	444	79.7	935	81.6
3	บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้	462	78.4	390	70.0	852	74.3
4	ยุ่งเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้	389	66.0	356	63.9	745	65.0
5	กินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	434	73.7	398	71.5	832	72.6
ตอบถูกทุกข้อ		242	41.1	202	36.3	444	38.7

เมื่อวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของคนในชุมชนที่สามารถตอบได้ถูกทุกข้อ จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่มีอายุน้อย (กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี) สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อน้อยกว่ากลุ่มอายุที่มากกว่าอย่างชัดเจน กลุ่มอายุ 35-39

ปี เป็นกลุ่มที่สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ อย่างชัดเจน และกลุ่มอายุ 45 – 49 ปี เป็นกลุ่มที่ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ถูกทุกข้อในสัดส่วนรองลงมา

ตาราง 3.10		ร้อยละของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง จำแนกตามกลุ่มอายุ	
กลุ่มอายุ	จำนวน	ตอบถูกทุกข้อ	
		จำนวน	ร้อยละ
15 – 19 ปี	190	38	20.0
20 – 24 ปี	162	49	30.2
25 – 29 ปี	153	64	41.8
30 – 34 ปี	166	65	39.2
35 – 39 ปี	166	91	54.8
40 – 44 ปี	167	68	40.7
45 – 49 ปี	142	69	48.6

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

จากการสำรวจพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ของคนในชุมชน พบว่ากลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์มีร้อยละ 82 เป็นเพศหญิง และเพศชายในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน ดังนั้นในการวิเคราะห์พฤติกรรมทางเพศจะไม่นับรวมกลุ่มคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน

คนในชุมชน ร้อยละ 3 (จำนวน 29 คน) ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเป็นการถูกบังคับ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้หญิงมากกว่ากลุ่มผู้ชาย แต่ถ้าวิเคราะห์ว่าคู่เพศสัมพันธ์ของคนที่มีเพศสัมพันธ์โดยการถูกบังคับ ส่วนใหญ่เป็นคู่รักหรือแฟน (จำนวน 22 คน) กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย (จำนวน 4 คน) บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน (จำนวน 2 คน) และเพศเดียวกัน (จำนวน 1 คน) ตามลำดับ

สำหรับคู่นอนของคนในชุมชน เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่

มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคู่รัก รองลงมาคือ บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน และบุคคลที่มีเพศเดียวกัน ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์คู่นอนครั้งแรกจำแนกตามเพศ พบว่าในกลุ่มเพศหญิงเกือบทั้งหมดมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคู่รัก ส่วนในกลุ่มเพศชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่รักหรือแฟน ประมาณ 2 ใน 3 ร้อยละ 17 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคย ประมาณร้อยละ 10 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับหญิงบริการทางเพศ ร้อยละ 5 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน และอีกร้อยละ 1 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้ชายด้วยกัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเพศชายประมาณ 1 ใน 3 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่รักหรือแฟน

ตาราง 3.11

ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	หญิง (n = 478)		ชาย (n = 464)		รวม (n = 942)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก						
ถูกบังคับ	20	4.2	9	1.9	29	3.1
สมัครใจ	454	95.0	452	97.4	906	96.2
ไม่ตอบ	4	0.8	3	0.6	7	0.7
คู่นอนครั้งแรก						
คู่รัก/แฟน	465	97.3	315	67.9	780	82.8
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	7	1.5	77	16.6	84	8.9
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	4	0.8	22	4.7	26	2.8
ผู้ขายบริการทางเพศ	-	-	44	9.5	44	4.7
เพศเดียวกัน	2	0.4	5	1.1	7	0.7

อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของคนในชุมชน พบว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 19 ปี เพศหญิงจะมีอายุโดยเฉลี่ยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย อายุที่น้อยที่สุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในกลุ่มเพศชาย คือ อายุ 9 ปี และอายุ 12 ปี ในกลุ่มเพศหญิง

เมื่อวิเคราะห์อายุเป็นกลุ่ม พบว่ามีร้อยละ 6 ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี โดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อย่างไรก็ตามคนในชุมชนส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 80) แล้วมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 15-24 ปี

ตาราง 3.12 อายุของการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ

อายุเมื่อมี เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	หญิง (n = 433)		ชาย (n = 432)		รวม (n = 865)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
9 – 14 ปี	16	3.7	34	7.9	50	5.8
15 – 19 ปี	195	45.0	259	60.0	454	52.5
20 – 24 ปี	149	34.4	107	24.8	256	29.6
25 – 29 ปี	52	12.0	27	6.3	79	9.1
30 – 34 ปี	16	3.7	2	0.5	18	2.1
35 – 39 ปี	5	1.2	2	0.5	7	0.8
40 – 44 ปี	0	0	1	0.2	1	0.1
ค่าเฉลี่ย	20.2		18.4		19.3	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	4.35		3.71		4.15	
Min	12		9		9	
Max	38		40		40	

การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยประมาณ 1 ใน 3 เท่านั้น เพศชายใช้ถุงยางอนามัยในสัดส่วนที่สูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย เมื่อ

วิเคราะห์การใช้ถุงยางอนามัยจำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าในกลุ่มที่มีอายุน้อยมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก สูงกว่าในกลุ่มผู้ที่มีอายุมาก

ตาราง 3.13

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก

คุณลักษณะ	จำนวน	การใช้ถุงยางอนามัย	
		จำนวน	ร้อยละ
เพศ			
หญิง	478	155	32.4
ชาย	464	177	38.1
รวม	942	332	35.2
อายุ			
15 – 19 ปี	78	45	57.7
20 – 24 ปี	131	66	50.4
25 – 29 ปี	131	54	41.2
30 – 34 ปี	152	56	36.8
35 – 39 ปี	159	51	32.1
40 – 44 ปี	159	35	22.0
45 – 49 ปี	132	25	18.9

เหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยมีดังต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย)

ตาราง 3.14

เหตุผลของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย

เหตุผล	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ตอบ	222	36.4
ตอนนั้นยังไม่เป็นไร/เมื่อก่อนไม่มีเอดส์/ยังไม่มีเอดส์/เอดส์ยังไม่ระบาดมาก/เหมือนทุกวันนี้/ไม่มีโรคอะไร/ยังไม่มีโรคนี้/ยุคนั้นเชื้อเอดส์ยังไม่มี/สมัยนั้นยังไม่ได้คิด/ยังไม่มีการรณรงค์/ไม่รู้ผลที่จะตามมา/สมัย 30 ปีไม่มีถุงยาง/โรคเอดส์ยังไม่ระบาด/ตอนนั้นยังไม่มีเชื้อ HIV/โรคสมัยนั้นไม่ค่อยมี/สมัยนั้นเอดส์ไม่มี/เมื่อก่อนไม่มีเอดส์/ตอนนั้นเอดส์ยังไม่ระบาด/ยังไม่มีเรื่องเอดส์/สมัยนั้นไม่มี/สมัยก่อนไม่มี/ยังไม่มีเอดส์/โรคเอดส์ยังไม่มี/ตอนนั้นยังไม่มีการแพร่กระจายหรือยังไม่ค่อยเป็นกันมากเหมือนสมัยนี้/เมื่อก่อนไม่มี/ไม่มีโรค HIV/ยังไม่มีเอดส์/ปี 2523 โรคเอดส์ยังไม่น่ากลัวเท่าไร/ตอนนั้นยังไม่มีเชื้อเอดส์/เพราะเมื่อก่อนไม่มีโรคเอดส์/ยังไม่มีโรค/สมัยนั้นถุงยางหายาก/ไม่รู้เรื่องถุงยางอนามัย/ไม่รู้จัก – ไม่มีสื่อให้รู้จัก/เมื่อก่อนเอดส์ยังไม่แพร่ระบาดมาก/ไม่เคยรู้เรื่องเอดส์/โรคเอดส์ยังไม่รู้จัก/ยังไม่มีการรณรงค์ต่อต้าน/ไม่แพร่หลาย/ในขณะนั้นถ้าเป็นโรคก็เป็นโรคที่รักษาให้หายได้	76	12.5

ตาราง 3.14 เหตุผลของกลุ่มประชากรที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย (ต่อ)		
เหตุผล	จำนวน	ร้อยละ
สมัยก่อนไม่มี/แต่งงานกัน/แต่งงานกัน/เป็นสามี-ภรรยา/ร่วมกับสามี/แต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย/เป็นสามีที่แต่งงานกัน/เป็นภรรยา/แต่งงานตามประเพณี	5	9.7
มั่นใจในตัวสามี/แฟนไม่ได้เที่ยว/คุ้นเคยและคุ้นเคย/อยู่ต่างจังหวัด/ไม่คิดจะมีโรค/ไม่ได้มีว/แฟนไม่เคยยุ่งกับใคร/ เชื้อใจแฟน/ไวใจ/เชื้อใจกัน/แฟนไม่มีว/คบกันมา เชื้อใจ/มั่นใจในคู่รัก/ปลอดภัย/ไม่เสี่ยง/เชื้อใจ/ไม่มีความเสี่ยง/มั่นใจในคู่สมรส/รู้สึกว่าเขาไม่เป็นหญิงสาว/ไม่น่าจะมีอะไร/มั่นใจในตนเอง/สามีไม่ได้ยุ่งกับใคร/ไม่คิดว่าคู่รักจะมีเชื้อ/ไม่ยุ่งกับใคร/สามีไม่เข้าชู้กับผู้อื่น	45	7.4
ไม่รู้/ไม่รู้จัก/อายุ/ยังไม่มีความรู้เรื่องถุงยางอนามัย/ไม่ทราบความจำเป็น/รู้เท่าไม่ถึงการณ์	34	5.6
ไม่ได้เตรียมมา/ไม่มี/ไม่ได้พกติดตัวไปด้วย/ไม่มีใช้/หายาก/ไม่ได้ซื้อ/หาไม่ได้/ไม่มีติดตัว	33	5.4
แฟน/สามี/ใครใจ ยินยอมเพราะเป็นคู่รัก/คิดว่าเป็นแฟนกัน	26	4.3
กลัวเสียเวลา/ฉุกเฉิน/ไม่ตั้งใจจะมีเหตุ/ไม่ได้เตรียมการ/คิดว่าปลอดภัยดี/คิดว่าไม่เป็นไร/ไม่มีการเตรียมตัว/ไม่ได้คิดมาก่อน/ไม่ได้คิด/สถานการณ์ฉุกเฉิน/ไม่ทัน/รีบมาก/ไม่ได้ตั้งใจ/ไม่ทราบ ใจร้อน/ยังไม่ทันตั้งตัวว่าจะทำอะไร	20	3.3
ไม่มัน/สะใจ/ไม่ชอบ/ไม่เสีย/ไม่ชอบใช้/ไม่ถึงใจ	16	2.6
ครั้งแรกทั้งสองคน/มีคนเดียว/ผู้หญิงบริสุทธิ์/ต่างคนต่างไม่เคย/เป็นแฟนคนแรก/เป็นคนแรก/บริสุทธิ์/ยังซิง/ยังใหม่อยู่/ครั้งแรก	14	2.3
ใช้ไม่เป็น/ไม่เคยใช้/ไม่เคย	9	1.5
คุมกำเนิด/ปล่อยน้ำเชื้อข้างนอก/กินยาคุม	9	1.5
อยากท้อง/จะมีลูก/ต้องการมีลูก/อยากมีลูกกับสามี/ตั้งใจมีลูก	8	1.3
รู้จักกันมาก่อน/อยู่กินด้วยกัน/คบกันตั้งแต่เด็ก/รู้จักดี/คบกันมานาน	7	1.1
ไม่ยากใช้/ไม่ต้องการ/ไม่ได้สนใจ, เอดส์ไม่ระบาด/ไม่จำเป็นต้องใช้/คิดว่าไม่จำเป็น	6	1.0
ก่อนแต่งงานได้ไปตรวจเลือดแล้ว/ตรวจเลือดแล้ว	4	0.7
ไม่กล้า, ลืมใช้/ลืม	3	0.5
ผู้หญิง/ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย	2	0.3
ถูกบังคับ	1	0.2
ไม่มีเงินซื้อ	1	0.2
ไม่ระบุ/ไม่บอก/ไม่มีเหตุผล	3	0.5
ไม่ดี	1	0.2

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์สัดส่วนของคนในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา คิดเฉพาะคนในชุมชนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา เท่านั้นไม่นับรวมคนเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงมีจำนวนของคนในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีเท่ากับ 853 ราย เป็นเพศชายจำนวน 415 ราย และเพศหญิงจำนวน 438 ราย

จำนวนคู่นอนของคนในชุมชนในรอบ 1

ปีที่ผ่านมา พบว่าในภาพรวมโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 คน ผู้ชายมีประมาณ 2 คน ผู้หญิงมีจำนวน 1 คน เมื่อวิเคราะห์จำนวนคู่นอนจำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุแล้วพบว่าผู้ชายมีคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมาจำนวนมากกว่า 1 รายในสัดส่วนที่มากกว่าผู้หญิง และคนที่มีอายุน้อยมีจำนวนคู่นอนมากกว่า 1 คนในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มคนที่มีความมากกว่าอย่างชัดเจน

ตาราง 3.15

สัดส่วนของคนในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

ลักษณะประชากร	จำนวน	จำนวนคู่นอน					
		1 คน		มากกว่า 1 คนขึ้นไป		ไม่ตอบ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพศ							
หญิง	438	374	85.4	30	6.8	34	7.8
ชาย	415	226	54.5	116	28.0	73	17.6
อายุ							
15 – 24 ปี	198	108	54.5	53	26.8	37	18.7
25 – 34 ปี	267	189	70.8	48	18.0	30	11.2
35 ปีขึ้นไป	388	303	78.1	45	11.6	40	10.3
ค่าเฉลี่ย		ญ = 1.1 คน		ช = 1.9 คน		รวม = 1.5 คน	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		ญ = 0.5 คน		ช = 1.93 คน		รวม = 1.41 คน	
จำนวนมากที่สุด		ญ = 6 คน		ช = 20 คน		รวม = 20 คน	
จำนวนน้อยที่สุด		ญ = 1 คน		ช = 1 คน		รวม = 1 คน	

ประเภทของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95) มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นคูรักหรือแฟน มีประมาณร้อยละ 13 มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย ประมาณร้อยละ 8

มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน ส่วนคนในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคนขายบริการทางเพศ และคนที่มีเพศเดียวกัน ประมาณร้อยละ 5 และ 2 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์จำแนกตามเพศแล้ว พบว่าคนในชุมชน

ที่เป็นเพศหญิงมีเพศสัมพันธ์กับคู่อีกหรือแฟนใน เพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่คู่อีก/แฟน ใน
สัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มผู้ชาย สำหรับเพศชายมี สัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มเพศหญิง

ตาราง 3.16 ประเภทของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

ประเภทของคู่นอน	หญิง		ชาย		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คู่อีก/แฟน	433	98.9	379	91.3	812	95.2
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	9	2.1	101	24.3	110	12.9
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	7	1.6	60	14.5	67	7.9
ผู้ชายบริการทางเพศ	2	0.5	45	10.8	47	5.5
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	4	0.9	15	3.6	19	2.2

เมื่อวิเคราะห์จำนวนของประเภทคู่นอน มากกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัดเจน ในกลุ่มผู้ชาย
ทั้ง 5 ประเภท พบว่าในภาพรวมกลุ่มคนในชุมชน นั้นมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลมากกว่า 1 ประเภท
ส่วนใหญ่รายงานว่า ตนเองมีคู่นอนประเภทใด มากถึง 1 ใน 4 ในขณะที่ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กับ
ประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว ซึ่งเป็นผู้หญิง บุคคลมากกว่า 1 ประเภท ร้อยละ 3 เท่านั้น

ตาราง 3.17 จำนวนของประเภทคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

จำนวนของ ประเภทคู่นอน	หญิง (n = 438)		ชาย (n = 415)		รวม (n = 853)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จำนวน 1 ประเภท	425	97.0	307	74.0	732	85.8
มากกว่า 1 ประเภท	13	3.0	108	26.0	121	14.2

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่มากกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัดเจน ในกลุ่มผู้ชาย
นอนประเภทต่างๆ พบว่าคนในชุมชนที่มี บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย
เพศสัมพันธ์กับผู้ชายบริการทางเพศมีสัดส่วนการ บุคคลที่มีเพศเดียวกัน ส่วนบุคคลที่เป็นคู่อีกหรือ
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงมากที่สุด รองลงมาคือ แฟน มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อย
ที่สุด

ตาราง 3.18

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ

ประเภทคู่นอน**	จำนวน	การใช้ถุงยางอนามัย							
		ทุกครั้ง		บางครั้ง		ไม่ใช้เลย		ไม่ตอบ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คูรัก/แฟน	812	125	15.4	188	23.2	482	59.4	17	2.1
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	110	60	54.5	28	25.5	13	11.8	9	8.2
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	67	38	56.7	12	17.9	4	6.0	13	19.4
ผู้ชายบริการทางเพศ	47	37	78.7	1	2.1	0	0	9	19.1
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน*	19	9	47.4	2	10.5	5	26.3	3	15.8

หมายเหตุ: * การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันในกลุ่มเพศชาย หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์ที่มีการสอดใส่ทางทวารหนัก

** ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

การวิเคราะห์สัดส่วนของการใช้ถุงยาง-
อนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ
พบว่าในกลุ่มเพศหญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยาง-
อนามัยทุกครั้งกับคู่นอนทุกประเภทน้อยกว่าใน

กลุ่มเพศชาย ยกเว้นในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับ
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผินมีสัดส่วนการใช้ถุงยาง-
อนามัยทุกครั้งใกล้เคียงกัน

ตาราง 3.19		สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ												
ประเภทคู่นอน	จำนวน	หญิง						จำนวน	ชาย					
		ทุกครั้ง		บางครั้ง		ไม่ได้เลย			ทุกครั้ง		บางครั้ง		ไม่ได้เลย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้รักงาฟน	433	53	12.2	79	18.2	296	68.4	379	72	19.0	109	28.8	186	49.1
บุคคลที่รู้จักกัน คุ้นเคย	9	3	33.3	3	33.3	2	22.2	101	57	56.4	25	24.8	11	10.9
บุคคลที่รู้จักกันเล็กน้อย	7	4	57.1	0	0	2	28.6	60	34	56.7	12	20.0	2	3.3
ผู้ชายรักทางเพศ	2	1	50.0	0	0	0	0	45	36	80.0	1	2.2	0	0
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	4	1	25.0	0	0	3	75.0	15	8	53.3	2	13.3	2	13.3

หมายเหตุ : * ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันในกลุ่มผู้ชาย หมายถึง ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีลักษณะคล้ายชาย

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่าส่วนใหญ่ คนในชุมชนมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟน มีเพียงร้อยละ 7 ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับบุคคลอื่น เมื่อวิเคราะห์ประเภทของคู่นอน จำแนกตามเพศหญิง – ชาย พบว่าในกลุ่มเพศ

ชายมีเพศสัมพันธ์ในครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟนในสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มเพศหญิง ในขณะที่กลุ่มเพศหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟนเกือบทั้งหมด

ตาราง 3.20 การมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด จำแนกตามเพศ						
ประเภทของคู่นอน	หญิง (n = 438)		ชาย (n = 415)		รวม (n = 853)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คูรัก/แฟน	433	98.9	359	86.5	792	92.8
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	1	0.2	29	7.0	30	3.5
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	0	0	8	1.9	8	0.9
ผู้ขายบริการทางเพศ	1	0.2	14	3.4	15	1.8
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	3	0.7	5	1.2	8	0.9

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุด พบว่าในภาพรวมมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยประมาณร้อยละ 30 ในกลุ่มเพศชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่ากลุ่มเพศ

หญิงอย่างชัดเจน และในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่ากลุ่มที่มีอายุมากอย่างชัดเจนเช่นกัน

ตาราง 3.21 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งล่าสุด			
คุณลักษณะ	จำนวน	การใช้ถุงยางอนามัย	
		จำนวน	ร้อยละ
เพศ			
หญิง	438	90	20.5
ชาย	415	169	40.7
อายุ			
15 – 24 ปี	198	91	46.0
25 – 34 ปี	267	79	29.6
35 ปีขึ้นไป	388	89	22.9
รวม	853	259	30.4

เหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยมีดังต่อไปนี้

ตาราง 3.22 เหตุผลของกลุ่มประชากรทั่วไปที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย		
เหตุผล	จำนวน (n = 594)	ร้อยละ
เป็นแฟน/เป็นคู่รัก/มีแฟนคนเดียว/แฟนผมเอง/มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/มีเพศสัมพันธ์กับแฟนตัวเอง/ คนรัก	64	10.8
เป็นสามี/ภรรยา/เป็นสามี-ภรรยากัน/เป็นสามี อยู่บ้านทุกวัน/อยู่กินกับสามี/มีกับสามีตัวเอง/เป็นคู่ สมรส/เขาเป็นสามีดิฉัน/เป็นสามีคนเดียว/ผัวเมียกัน/อยู่กับคู่สมรส/เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยกันตลอด/ มีครอบครัว/เป็นสามี-ภรรยาอยู่ร่วมกัน/นอนกับสามีตัวเอง/เป็นสามี-ภรรยากัน/เป็นสามีไม่มั่ว/เป็น สามีที่จดทะเบียนแล้ว/เป็นภรรยาไม่เที่ยว	141	23.7
แฟนไม่เคยมีอะไรกับใคร/โสดทั้งคู่	2	0.3
ไม่มี/ไม่มีถุงยาง/ ไม่ได้ซื้อมา/ไม่ได้มีไว้เอง	10	1.7
ไม่มีอารมณ์/เพราะไม่ถึงจุด/ไม่ชอบ/ไม่มัน/ไม่ชอบใช้/ไม่ถนัด	14	2.4
ไม่ต้องการ/ไม่จำเป็น	5	0.8
ใช้ไม่เป็น/ไม่เคยใช้/ไม่เคย/โดยปกติเราไม่ใช้อยู่แล้ว	15	2.5
มั่นใจ/มั่นใจแฟน/มั่นใจว่าแฟนไม่มีเอดส์/คู่รักไม่มีสัมพันธ์กับใคร/สามีไม่สาส์น/คิดว่าสามี ปลอดภัย/ไม่สาส์น/ไว้ใจสามี/แฟนไม่ยุ่งกับผู้หญิงอื่นใด/แฟนไม่ได้ยุ่งกับใคร/แฟนไม่เที่ยว/เชื่อใจ ไว้ใจกัน/มั่นใจในคู่รัก/สะอาด/แฟนที่แต่งงานกันไม่มั่ว/เชื่อใจแฟน/มีกับสามีตัวเองและมั่นใจในตัว สามี/มั่นใจในความปลอดภัย/ไม่เสี่ยง/คิดว่าคู่รักเราปลอดภัย/มีสามีที่ไม่เจ้าชู้/ปลอดภัย	41	6.9
กลัวเสียเวลา	1	0.2
ต้องการมีบุตร/จะมีลูก/ยังไม่เคยมีบุตรเลยก็เลยไม่ควบคุม	4	0.7
ฉีดยาคุม/ทำหมันแล้ว/คุมกำเนิด/กินยาคุมกำเนิด/แฟนฉีดยาคุม/เชื่อตัวเอง/เพิงหมดประจำเดือน	27	4.5
คบหาดูใจพอสมควร/อยู่กินด้วยกัน/คู่รักที่อยู่ร่วมกัน/เพราะอยู่กินด้วยกัน/เป็นแฟนที่คบกันมานาน แล้ว/อยู่กันมานาน/รู้จักดี	11	1.9
ได้ตรวจแล้ว/ไปตรวจโรคทั้งคู่	2	0.3
ลืมซื้อ/ขี้ลืม	3	0.5
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย/หญิงด้วยกัน	2	0.3
ยังเด็ก	1	0.2
ไม่ใช่คนรักก็ใช้/ไม่ได้เที่ยว/เราไม่ได้เที่ยว/ไม่เที่ยวผู้หญิง	7	1.2
ไม่เคยเปลี่ยนคู่นอน/มีคู่นอนคนเดียว และบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน/มีกับคู่รักเพียงคนเดียว/ไม่ได้ นอนกับคนอื่น	6	10.0
เมา	1	0.2
ไม่ตอบ	237	39.9

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงิน ชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา
ตอบแทน พบว่าในภาพรวมแล้ว มีสัดส่วนของ สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
คนในชุมชนมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือ ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามมีผู้ที่ไม่ตอบคำถาม
เงินตอบแทนเพียงร้อยละ 2 หรือจำนวน 16 คน การใช้ถุงยางอนามัยในสัดส่วนที่สูงมาก

ตาราง 3.23	การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนในภาพรวม จำแนกตามเพศ					
เพศสัมพันธ์เพื่อ แลกสิ่งของหรือเงินตอบแทน	หญิง (n = 438)		ชาย (n = 415)		รวม (n = 853)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคย	5	1.1	11	2.7	16	1.9
ไม่เคยมี	433	98.9	404	97.3	837	98.1
การใช้ถุงยางอนามัย						
ทุกครั้ง	1	20.0	5	45.5	6	37.5
บางครั้ง	0	0	1	9.1	1	6.3
ไม่ใช้เลย	0	0	1	9.1	1	6.3
ไม่ตอบ	4	80.0	4	36.4	8	50.0

การผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ สำหรับการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการ
ทางเพศสัมพันธ์ เช่น ปัสสาวะแสบขัด มีแผลที่ ผิดปกติ พบว่าในภาพรวมส่วนใหญ่ไปรักษา
อวัยวะเพศ หรือมีหนองไหลจากอวัยวะเพศ อาการผิดปกติที่สถานพยาบาล รองลงมาคือ ซื้อมา
พบว่าในภาพรวมมีเพียงร้อยละ 4 โดยเพศหญิง ยารับประทานเอง กลุ่มเพศหญิงมีสัดส่วนของ
– เพศชายมีสัดส่วนของการผิดปกติที่สงสัยว่า การไปรักษาที่สถานพยาบาลมากกว่ากลุ่มเพศ
เป็นโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกัน ชายเล็กน้อย

ตาราง 3.24 การมีอาการผิดปกติ และการปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ						
อาการผิดปกติ	หญิง (n = 589)		ชาย (n = 557)		รวม (n = 1,146)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมี	22	3.7	21	3.8	43	3.8
การปฏิบัติ*						
ปรึกษาเพื่อน	0	0	1	4.8	1	2.3
ปรึกษาญาติพี่น้อง	1	4.5	0	0	1	2.3
ปรึกษาแฟน/คู่รัก	1	4.5	1	4.8	2	4.7
ซื้อยามากินเอง	3	13.6	4	19.0	7	16.3
ไปรักษาตามสถานพยาบาล	15	68.2	11	52.4	26	60.5
ล้างน้ำสะอาดบ่อยๆ	0	0	1	4.8	1	2.3
ไม่ตอบ	2	9.1	3	14.3	5	11.6

หมายเหตุ : * ตอบเพียงข้อเดียว

ดูขงานมาจ

ความสะดวกในการซื้อถุงยางอนามัย พบว่าคนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 47 ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัย (ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ และ/หรือไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเลย) คนในชุมชนประมาณ

2 ใน 5 เห็นว่า มีความสะดวกที่จะซื้อถุงยางอนามัยมาใช้ แต่สำหรับการซื้อถุงยางอนามัยจากตู้จำหน่ายอัตโนมัติมีเพียง 1 ใน 4 ที่สะดวกซื้อถุงยางอนามัยจากตู้จำหน่ายอัตโนมัติ

ตาราง 3.25 ความสะดวกในการซื้อถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ						
ความสะดวก	หญิง (n = 589)		ชาย (n = 557)		รวม (n = 1,146)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีความสะดวกในการซื้อถุงยางอนามัย	162	27.5	304	54.6	466	40.7
มีความสะดวกที่จะซื้อถุงยางอนามัยจากตู้จำหน่ายอัตโนมัติ	95	16.1	197	35.4	292	25.5

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าคนในชุมชนมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 28 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย

ในกลุ่มคนที่เคยเจาะเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีประมาณร้อยละ 3 ที่ไม่ทราบผลการตรวจเลือด อย่างไรก็ตามมีผู้ไม่ตอบคำถามค่อนข้างสูงคือ ร้อยละ 17

ตาราง 3.26 การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี จำแนกตามเพศ						
การตรวจเลือด	หญิง (n = 589)		ชาย (n = 557)		รวม (n = 1,146)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การตรวจเลือด						
เคย	177	30.1	147	26.4	324	28.3
ไม่เคย	412	69.9	410	73.6	822	71.7
ผลการตรวจเลือด						
ทราบ	144	81.4	114	77.6	258	79.6
ไม่ทราบ	4	2.3	6	4.1	10	3.1
ไม่ตอบ	29	16.4	27	18.4	56	17.3

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด

พฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ของคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำประมาณ 2 เท่า พบว่า ส่วนใหญ่แล้ว (ร้อยละ 58) มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยเพศชายมีสัดส่วนของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มากกว่าเพศหญิงอย่างชัดเจนประมาณ 2 เท่า

พฤติกรรม การเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่ามีคนในชุมชนร้อยละ 12 ที่มีการเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย เช่น การเสพยาบ้า เฮโรอีน กัญชา โคเคน เป็นต้น เพศชายมีการเสพยาเสพติดมากกว่ากลุ่มเพศหญิงประมาณ 3 เท่า

ตาราง 3.27 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการเสพยาเสพติด จำแนกตามเพศ						
พฤติกรรม การดื่ม และการเสพยาเสพติด	หญิง (n = 589)		ชาย (n = 557)		รวม (n = 1,146)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา)						
ดื่ม	261	44.3	401	72.0	662	57.8
ไม่ดื่ม	328	55.7	156	28.0	484	42.2
เสพยาเสพติด (ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา)						
เคยเสพ	28	4.8	105	18.9	133	11.6
ไม่เคยเสพ	561	95.2	452	81.1	1,013	88.4

เมื่อวิเคราะห์ความถี่ของการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ของกลุ่มคนในชุมชน พบว่ามีการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ในทุกวันค่อนข้างสูงคือ ร้อยละ 18 มีร้อยละ 14 ที่ตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ (2-3 ครั้งต่อสัปดาห์/สัปดาห์ละครั้ง) เพศชายมีการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ทุกวัน หรือตีเป็นประจำ

ประจำในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มเพศหญิง

สำหรับความถี่ของการเสพสารเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีเพียงจำนวน 5 ราย ประมาณร้อยละ 4 ที่ต้องเสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกวัน มีร้อยละ 33 หรือประมาณ 1 ใน 3 ที่เสพสารเสพติดแล้วแต่โอกาส ที่เหลือซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่แค่ทดลองเสพสารเสพติด

ตาราง 3.28 ความถี่ของการตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติด จำแนกตามเพศ						
ความถี่	เครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์			สารเสพติด		
	หญิง (n= 261)	ชาย (n= 401)	รวม (n= 662)	หญิง (n= 28)	ชาย (n= 105)	รวม (n= 133)
ทุกวัน	8.8	24.7	18.4	0	4.8	3.8
เป็นประจำ	6.5	19.5	14.4	na	na	na
แล้วแต่โอกาส	44.4	31.7	36.7	17.9	37.1	33.1
นานๆ ครั้ง/ทดลองเสพ	40.2	24.2	30.5	82.1	58.1	63.2

คนในชุมชนที่มีเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีประมาณครึ่งหนึ่ง (คิดสัดส่วนในกลุ่มที่เคยตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) เพศชายมีส่วนของการมีเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มเพศหญิง

การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพียงร้อยละ 21 เท่านั้น เพศชายมีส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังตีเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง

ตาราง 3.29 การมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ

พฤติกรรมทางเพศ	หญิง (n = 261)		ชาย (n = 401)		รวม (n = 662)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	101	38.7	214	53.4	315	47.6
การใช้ถุงยางอนามัย						
ทุกครั้ง	12	11.9	53	24.8	65	20.6
บางครั้ง	18	17.8	48	22.4	66	21.0
ไม่ใช้เลย	66	65.3	94	43.9	160	50.8
ไม่ตอบ	5	5.0	19	8.9	24	7.6

การมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีสัดส่วนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คือ ประมาณร้อยละ 38 เพศหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่าในกลุ่มเพศชาย

เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ามีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งประมาณร้อยละ 24 เพศหญิงและเพศชายมีสัดส่วนเท่าๆ กัน

ตาราง 3.30 การมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ

พฤติกรรมทางเพศ	หญิง (n = 28)		ชาย (n = 105)		รวม (n = 133)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	13	46.4	38	36.2	51	38.3
การใช้ถุงยางอนามัย						
ทุกครั้ง	3	23.1	9	23.7	12	23.5
บางครั้ง	1	7.7	9	23.7	10	19.6
ไม่ใช้เลย	9	69.2	17	44.7	26	51.0
ไม่ตอบ	0	0	3	7.9	3	5.9

การเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ (ในส่วนนี้ไม่ได้จำกัดกรอบเวลาว่าเป็นการเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำในรอบปีที่ผ่านมา) พบว่ามีคนในชุมชนจำนวน 8 ราย หรือไม่ถึงร้อยละ 1 ที่เคยเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ ในจำนวน 8 รายเป็นเพศชายทั้งหมด

ในจำนวน 8 รายที่เคยเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ พบว่ามีการเริ่มเสพยา

เสพติดโดยวิธีดังกล่าวในช่วงอายุที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล อายุที่เริ่มเสพยาเสพติดโดยวิธีการฉีดน้อยที่สุดเท่ากับ 11 ปีเท่านั้น

มีผู้ใช้อุปกรณ์ในการฉีดเสพยาเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำ จำนวน 5 ราย หรือประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ที่เคยเสพยาเสพติดโดยวิธีการฉีด และในจำนวน 5 รายนี้ มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้ง จำนวน 2 รายเท่านั้น

ตาราง 3.31

การเสพยาเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำของกลุ่มประชากรทั่วไป



การเสพยาเสพติด โดยการฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ	หญิง (n = 589)		ชาย (n = 557)		รวม (n = 1,146)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยเสพยาเสพติดโดยการฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ	0	0	8	1.4	8	0.7
อายุ*						
11 ปี	na		1	12.5	1	12.5
14 ปี	na		1	12.5	1	12.5
15 ปี	na		1	12.5	1	12.5
17 ปี	na		1	12.5	1	12.5
20 ปี	na		1	12.5	1	12.5
24 ปี	na		1	12.5	1	12.5
30 ปี	na		1	12.5	1	12.5
ไม่ตอบ	na		1	12.5	1	12.5
มีการใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น (n= 8)	na		5	62.5	5	62.5
ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้ง**	na		2	40.2	2	40.0

หมายเหตุ: * คัดสรรส่วนเฉพาะกลุ่มที่เคยเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ

** คัดสรรส่วนเฉพาะกลุ่มที่เคยเสพยาเสพติดโดยวิธีฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ และใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับบุคคลอื่น

4

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒



4

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

การศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้ ดำเนินการเป็นครั้งที่ 2 การดำเนินการในครั้งแรก ปี พ.ศ. 2550 นั้น ทำการสุ่มเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดของสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 โรงเรียน ส่วนในปี พ.ศ. 2551 ทำการสุ่มโรงเรียนเพิ่มอีกจำนวน 5 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะได้กระจายกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจำนวน 1,000 ราย เป็นเพศหญิง และเพศชายอย่างละเท่าๆ กัน ดังนั้นในแต่ละโรงเรียนจะเฉลี่ยจำนวนตัวอย่างให้เท่ากันทุกโรงเรียน จะได้กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนละ 60 คน เป็นเพศหญิง 30 คน และเพศชายอีกจำนวน 30 ราย

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) ที่หน่วยข้อมูลจะมีช่วงตัวอย่าง (sampling interval) คือ

$$k = N/n$$

N = จำนวนประชากร

n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 วิธี คือ

1. วิธี Liner systematic random sampling เมื่อ $k = N/n$ เป็นตัวเลขที่ลงตัว (ไม่มีเศษ) เมื่อได้ค่า k แล้ว ทำการสุ่มตัวเลขที่มีค่าในช่วงค่า k เช่น ถ้า $k = 5$ นักวิจัยสุ่มตัวเลข 1-5 โดยใช้ตารางเลขสุ่ม

2. วิธี Circular systematic sampling เมื่อ $k = N/n$ เป็นตัวเลขที่ไม่ลงตัว (มีเศษ) มีวิธีการดังนี้ คือ $N/n = q$ (จำนวนเต็ม) + R (ตัวเลขของจำนวนเต็ม) หลังจากนั้นนักวิจัยเลือกค่า $k = q$ เมื่อ $R \leq n/2$ และเลือก $k = q + 1$ เมื่อ $R > n/2$ แล้วสุ่ม R โดยใช้ตารางเลขสุ่มจาก 1 ถึง k

การดำเนินการเก็บรวบรวมในปี พ.ศ. 2551 อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2551 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกโรงเรียน โดยที่แต่ละโรงเรียนจะเตรียมนักเรียนที่ตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับสถานที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นห้องประชุมของโรงเรียน ทำให้การตอบแบบสอบถามของนักเรียนทุกคนมีความเป็นส่วนตัวและสามารถตอบคำถามด้วยความเป็นอิสระ เพราะนักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองทั้งหมด

รวมค่าเฉลี่ย

กลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2551 มีจำนวนทั้งหมด 1,250 ราย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย

อายุของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเฉลี่ยเท่ากับ 13.8 ปี มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .63 อายุของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุด

เท่ากับ 12 ปี และอายุที่มากที่สุดเท่ากับ 17 ปี ระยะเวลาที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 10 ปี นักเรียนหญิง และนักเรียนชายมีระยะเวลาที่พำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยเท่ากัน

ตาราง 4.1

อายุและระยะเวลา (ปี) ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

ข้อมูลประชากร	เพศ		รวม (n = 1,250)
	หญิง (n = 603)	ชาย (n = 647)	
อายุ			
ค่าเฉลี่ย	13.7	13.8	13.8
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	.61	.64	.63
อายุน้อยที่สุด	13	12	12
อายุมากที่สุด	17	17	17
ระยะเวลาที่อยู่กรุงเทพมหานคร (ปี)			
ค่าเฉลี่ย	10.8	10.8	10.8
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	4.5	4.3	4.4
ระยะเวลาน้อยที่สุด	0.1	0.2	0.1
ระยะเวลามากที่สุด	16.0	17.1	17.08

ลักษณะของการพำนักอาศัย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 82 ที่พำนักอาศัยอยู่กับบิดาและ/หรือมารดา อย่างไรก็ตามมีนักเรียนที่พำนักอาศัยตามลำพังคนเดียว จำนวน 1 ราย และอยู่กับเพื่อนอีก 1 รายเท่านั้น และเป็น

เพศชาย (ในข้อคำถามนี้จะให้ตอบเพียงข้อเดียว โดยที่ถ้านักเรียนอยู่กับบิดา และ/หรือมารดา ก็ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ด้วยก็ตาม แล้วมีการเรียงลำดับความสำคัญของบุคคลที่อยู่อาศัยด้วย)

ตาราง 4.2

ลักษณะของการพักอาศัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

การพักอาศัย	หญิง (n = 603)		ชาย (n = 647)		รวม (n = 1,250)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พ่อแม่	49	81.7	531	82.1	1,023	81.9
ผู้ปกครอง (ญาติ)	104	17.3	102	15.8	206	16.5
พี่น้อง	6	1.0	12	1.9	18	1.4
ลำพังคนเดียว	0	0	1	0.2	1	0.1
อยู่กับเพื่อน	0	0	1	0.2	1	0.1

ระดับการเรียนรู้ (เป็นการสอบถามเกรดเฉลี่ยของเทอมก่อนหน้านั้น คือ เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2550) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งมีระดับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างดี (2.50 – 3.50) มีกลุ่ม

ตัวอย่างร้อยละ 11 ที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก เมื่อวิเคราะห์แยกกลุ่มนักเรียนจำแนกตามเพศ แล้วพบว่านักเรียนหญิงมีระดับผลการเรียนที่ดี ในสัดส่วนมากกว่ากลุ่มนักเรียนชายอย่างชัดเจน

ตาราง 4.3

ระดับการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

ระดับการเรียนรู้	หญิง (n = 603)		ชาย (n = 647)		รวม (n = 1,250)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่า 1.50	7	1.2	50	7.7	57	4.6
1.51 – 2.0	46	7.6	162	25.0	208	16.7
2.01 – 2.5	99	16.4	165	25.5	264	21.2
2.51 – 3.0	149	24.7	140	21.6	289	23.2
3.01 – 3.5	182	30.2	112	17.4	294	23.6
มากกว่า 3.5 ขึ้นไป	120	19.9	16	2.5	136	10.9

งานอดิเรกของกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนจะใช้เวลาร่วมส่วนใหญ่กับการดูภาพยนตร์/โทรทัศน์/ฟังเพลง/อ่านหนังสือทั่วไป รองลงมาคือ ใช้เวลาร่วมกับการเล่นกีฬา/เล่นดนตรี/ออกกำลังกาย อันดับที่ 3 คือ ใช้เวลาร่วมกับการเล่นเกมส์/Internet และใช้เวลาทำงานบ้าน/ช่วยเหลือครอบครัวทำงานตามลำดับ

เมื่อวิเคราะห์การใช้เวลาร่วม จำแนกตามเพศแล้ว พบว่าเพศหญิงมีการใช้เวลาว่างแตกต่างจากเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงจะใช้เวลาร่วมส่วนใหญ่กับการดูภาพยนตร์/โทรทัศน์/ฟังเพลง/อ่านหนังสือทั่วไป รองลงมาคือ ใช้เวลาร่วมทำงานบ้าน/ช่วยเหลือครอบครัวทำงานบ้าน ส่วนเพศชายใช้เวลาว่างกับการเล่นกีฬา/เล่นดนตรี/ออกกำลังกาย รองลงมาคือ เล่นเกมส์/Internet

ตาราง 4.4


การใช้เวลาว่างของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

กิจกรรม	หญิง (n = 603)		ชาย (n = 647)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เล่นกีฬา/เล่นดนตรี/ออกกำลังกาย	60	10.0	232	35.9
เรียนพิเศษ	11	1.8	6	0.9
ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/เสพสารเสพติด	0	0	7	1.1
เล่นการพนัน	1	0.2	3	0.5
เดินตามศูนย์การค้า/Shopping	5	0.8	2	0.3
เล่นเกมส์/Internet	24	4.0	165	25.5
ทำงานเพื่อหารายได้พิเศษ	16	2.7	21	3.3
คุยโทรศัพท์	30	5.0	18	2.8
ทำงานบ้าน/ช่วยเหลือครอบครัวทำงาน	100	16.6	50	7.7
เที่ยวตามสถานบันเทิง	4	0.7	6	0.9
ทำการบ้าน/อ่านหนังสือ	43	7.1	14	2.2
สังสรรค์กับเพื่อนๆ	14	2.3	22	3.4
ดูภาพยนตร์/โทรทัศน์/ฟังเพลง/อ่านหนังสือทั่วไป	286	47.4	89	13.8
นอนหลับ	9	1.5	10	1.5
ตกปลา	0	0	1	0.2

การมีคู่วัยหรือแฟน พบว่ามีนักเรียน มีสัดส่วนการมีคู่วัยหรือแฟนมากกว่าในกลุ่ม
ประมาณ 1 ใน 4 ที่มีคู่วัยหรือแฟน นักเรียนหญิง นักเรียนชาย

แผนภาพ 4.1

การมีคู่วัยหรือแฟนของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2



ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ในส่วนนี้เป็นการสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ จำนวน 7 ข้อคำถาม พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ในประเด็นเกี่ยวกับถุงยางอนามัย (ในข้อที่ 1 และ 6) สูงกว่าข้ออื่นๆ

เมื่อวิเคราะห์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ พบว่าในกลุ่มนักเรียนชายมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาต้านไวรัส การรับประทานอาหารร่วมกัน ทำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้

และคนที่มองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อาจติดเชื้อเอชไอวี ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย ส่วนในกลุ่มนักเรียนหญิงมีความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส การรับประทานอาหารร่วมกัน และยังเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีมาสู่คน ในสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อดูค่าเฉลี่ยของการตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องประมาณ 3-4 ข้อจากทั้งหมด 7 ข้อ

ตาราง 4.5

ร้อยละของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง


ข้อที่	ความรู้เรื่องเอดส์	หญิง (n = 603)	ชาย (n = 647)	รวม (n = 1,250)
1	ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวี	83.3	84.4	83.8
2	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	63.0	59.2	61.0
3	คนที่มองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีอาจเป็นคนที่ติดเชื้อเอชไอวี	50.2	36.3	43.0
4	ยังสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีมาสู่คนได้	43.6	46.2	45.0
5	การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	35.0	33.2	34.1
6	การมีเพศสัมพันธ์กับคูรักที่น่าไว้วางใจ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	72.0	61.5	66.6
7	ในปัจจุบันมียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอชไอวีได้ (ยาต้านไวรัส)	29.9	30.3	30.1
ค่าเฉลี่ยจำนวนข้อที่ตอบถูกต้อง		3.8	3.5	3.6
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.6	1.6	1.6

เมื่อวิเคราะห์ ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ (7 ข้อ) พบว่ามีนักเรียนที่ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทั้ง

7 ข้อ มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น (จำนวน 32 ราย) ซึ่งส่วนใหญ่ นักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง 7 ข้อ เป็นนักเรียนหญิงในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนชาย

แผนภาพ 4.2

การตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ (7 ข้อ)




การวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ในข้อที่ 1-5 ได้ถูกต้องทุกข้อ ร้อยละ 7 หรือ

จำนวน 87 ราย นักเรียนหญิงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS ในสัดส่วนที่สูงกว่านักเรียนชายเล็กน้อย

แผนภาพ 4.3

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ของ UNGASS (ตอบข้อ 1-5 ถูกทุกข้อ)




พฤติกรรมการใช้ Internet

พฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีนักเรียนที่ตอบว่าไม่เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมาประมาณ ร้อยละ 14 หรือจำนวน 175 ราย นักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการไม่เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย

เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่แล้วมีการใช้ Internet เมื่อมีโอกาส หรือนานๆ ครั้ง รองลงมาใช้ Internet 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีการใช้ Internet ในทุกวัน และมีการใช้ Internet สัปดาห์ละครั้ง ตามลำดับ

แผนภาพ 4.4

พฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา



เมื่อวิเคราะห์การใช้ Internet ในกลุ่มนักเรียนหญิง-ชาย พบว่านักเรียนหญิงมีการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมาในสัดส่วนที่น้อยกว่านักเรียนชายเล็กน้อย (ร้อยละ 84 และร้อยละ 88) ความถี่ของการใช้ Internet ในกลุ่มนักเรียนหญิง

ส่วนใหญ่มีการใช้ Internet เมื่อมีโอกาส ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายส่วนใหญ่แล้วมีการใช้ Internet ค่อนข้างบ่อยคือ มีการใช้ Internet ในทุกวัน และมีการใช้ Internet 2-3 ครั้ง/สัปดาห์

ตาราง 4.6 ความถี่ของการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

ความถี่ของการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา	เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา			
	หญิง (n = 505)		ชาย (n = 570)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทุกวัน	56	11.1	174	30.5
2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์	142	28.1	165	28.9
สัปดาห์ละครั้ง	100	19.8	113	19.8
นานๆ ครั้ง/แล้วแต่โอกาส	207	41.0	118	20.7

ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวิเคราะห์สถานที่ที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้ Internet เป็นประจำแล้ว พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งใช้ Internet เป็นประจำที่ร้าน Internet นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประมาณ 1 ใน 4 ใช้ Internet เป็นประจำที่บ้านของตนเอง ประมาณ 1 ใน 5 ใช้ Internet เป็นประจำที่โรงเรียน ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่ใช้ Internet เป็นประจำที่หอพัก ตามศูนย์การค้า และที่บ้านเพื่อนมีสัดส่วนที่น้อยมาก

เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนในแต่ละสถานที่ที่นักเรียนใช้ Internet เป็นประจำ จำแนกตามเพศ พบว่านักเรียนชายถึงร้อยละ 57 ใช้ Internet เป็นประจำที่ร้าน Internet ในขณะที่นักเรียนหญิงมีสัดส่วนร้อยละ 40 ส่วนการใช้ Internet ที่โรงเรียน และที่บ้าน นักเรียนหญิงมีสัดส่วนมากกว่านักเรียนชาย

ตาราง 4.7 สถานที่ใช้ Internet เป็นประจำในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

สถานที่ *	หญิง (n = 504)		ชาย (n = 566)		รวม (n = 1,070)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ที่บ้าน	134	26.6	135	23.9	269	25.1
ร้าน Internet	201	39.9	323	57.1	524	49.0
โรงเรียน	149	29.6	63	11.1	212	19.8
หอพัก	2	0.4	12	2.1	14	1.3
ศูนย์การค้า	5	1.0	5	0.9	10	0.9
บ้านเพื่อน	13	2.6	28	4.9	41	3.8

หมายเหตุ: * ตอบได้เพียงข้อเดียว

การสอบถามเกี่ยวกับการมีคูรักรหรือ คู่รักรหรือแฟนทาง Internet เป็นนักเรียนชายในแฟนที่ติดต่อกันทาง Internet ในรอบปีที่ผ่านมา สัดส่วนที่มากกว่านักเรียนหญิงเล็กน้อยพบว่านักเรียนประมาณ 1 ใน 4 เคยมีการหา

ตาราง 4.8 การมีคูรักรหรือแฟนทาง Internet ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ						
การมีคูรักร/ แฟนทาง Internet *	หญิง (n = 504)		ชาย (n = 570)		รวม (n = 1,074)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคย	126	25.0	160	28.1	286	26.6
ไม่เคย	378	75.0	410	71.9	788	73.4

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ประสพการณ์การมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีนักเรียนที่เคยมีประสพการณ์ทางเพศสัมพันธ์แล้วประมาณร้อยละ 6 เป็นนักเรียนชายในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนหญิง

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าในกลุ่มนักเรียนที่มีประสพการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกด้วยความยินยอมพร้อมใจของตนเองเสียเป็นส่วนใหญ่ มีประมาณร้อยละ 7 ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยถูกบังคับ นักเรียนที่

มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกด้วยการถูกบังคับเป็นนักเรียนหญิงในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนชาย

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับคูรักรหรือแฟนของตนเอง รองลงมาคือ คนที่รู้จักกันคุ้นเคย คนที่มีเพศเดียวกัน ตามลำดับ ส่วนการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักกันผิวเผิน และคนที่ขายบริการทางเพศมีเพียงอย่างละ 1 รายเท่านั้น นักเรียนชายมีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่คูรักรหรือแฟนในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนหญิง

ตาราง 4.9

การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และคู่นอนครั้งแรก ของกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ *	หญิง (n = 603)		ชาย (n = 647)		รวม (n = 1,174)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมีเพศสัมพันธ์	21	3.5	55	8.5	76	6.1
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก						
ถูกบังคับ	3	14.3	2	3.6	5	6.6
สมัครใจ	18	85.7	53	96.4	71	93.4
คู่นอนครั้งแรก						
คูรักหรือแฟน	19	90.5	37	67.3	56	73.7
คนที่รู้จักกันคุ้นเคย	1	4.8	11	20.0	12	15.8
คนที่รู้จักกันผิวเผิน	0	0	1	1.8	1	1.3
คนที่ขายบริการทางเพศ	0	0	1	1.8	1	1.3
ผู้ชายด้วยกัน	1	4.8	5	9.1	6	7.9

หมายเหตุ: * คัดสรรเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าโดยเฉลี่ยมีอายุประมาณ 13 ปี อายุที่นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยที่สุดคือ 8 ปี และอายุมากที่สุดเท่ากับ 15 ปี ในกลุ่มนักเรียนหญิง และนักเรียนชายมีอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกใกล้เคียงกัน

ตาราง 4.10

อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

เพศ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	อายุน้อยที่สุด	อายุมากที่สุด
หญิง (n = 21)	12.95	.67	12	14
ชาย (n = 45)	12.69	1.39	8	15
รวม (n = 66)	12.77	1.21	8	15

การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่านักเรียนมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก ร้อยละ 45 นักเรียนหญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่านักเรียนชาย (ร้อยละ 47.6 และร้อยละ 43.6)

ในกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยครั้งแรก (ประมาณร้อยละ 55) มีเหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัย ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทัศนคติที่มีต่อถุงยางอนามัย และไม่มีความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย

ตาราง 4.11 เหตุผลของกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก		
เหตุผล	จำนวน	ร้อยละ
ราคาแพง / ไม่สนุก/มันไม่ค่อยสนุกเท่าไร/ไม่มัน/ไม่ชอบมาก/ไม่ถนัด	9	21.4
ไม่มี/หาไม่ได้	7	16.7
คับขัน/ซื้อไม่ทัน/รีบ อารมณ์พาไป/ไม่ได้ตั้งใจ	6	14.3
ไม่รู้/ไม่รู้จัก	5	11.9
ลืมซื้อ/ลืม	3	7.1
ไม่มีตังค์	2	4.8
ไม่ได้คิดถึง/ไม่อยากจะ	2	4.8
เขาไม่มีเพศสัมพันธ์กับใคร	1	2.4
ถูกบังคับ	1	2.4
เป็นผู้หญิง	1	2.4
ยังไม่มีน้ำอสุจิ	1	2.4
ไม่ตอบ	4	9.5

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มนักเรียนที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศสัมพันธ์มาก่อน แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 11 ราย หรือประมาณร้อยละ 15 ซึ่งนักเรียนในกลุ่มนี้จะไม่คิดสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนคู่นอนของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 2 ราย นักเรียนหญิง และนักเรียนชายมีจำนวนคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก

ตาราง 4.12 จำนวนคู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกตามเพศ				
เพศ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	จำนวนน้อยที่สุด	จำนวนมากที่สุด
หญิง (n = 19)	1.84	1.34	1	6
ชาย (n = 46)	2.40	1.79	1	9
รวม (n = 65)	2.20	1.65	1	9

เพศสัมพันธ์ของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาจะมีเพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟน รองลงมาคือ บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย บุคคลที่มีเพศเดียวกัน บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน และคนที่ขายบริการทางเพศ ตามลำดับ นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับบุคคลที่เป็นคูรักหรือแฟน ในสัดส่วนที่น้อยกว่านักเรียนหญิง

การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ พบว่าคู่นอนที่เป็นคนขายบริการทางเพศมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากที่สุด รองลงมาคือ คู่นอนที่เป็นบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน คู่นอนที่เป็นบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย คู่นอนที่เป็นคูรักหรือแฟน และคู่นอนที่เป็นคนที่มีเพศเดียวกัน ตามลำดับ

ตาราง 4.13 การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ จำแนกตามเพศ								
เพศสัมพันธ์ในรอบปี	เพศสัมพันธ์				ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง			
	หญิง (n = 19)		ชาย (n = 46)		หญิง (n = 19)		ชาย (n = 46)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คูรัก/แฟน	18	94.7	39	84.8	7	38.9	10	25.6
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	2	10.5	19	41.3	1	50.0	7	36.8
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	2	10.5	10	21.7	0	0	5	50.0
ผู้ขายบริการทางเพศ	0	0	4	8.7	na	na	3	75.0
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	3	15.8	9	19.6	0	0	2	22.2

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของกลุ่มนักเรียน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟน คู่นอนที่มีลำดับรองลงมา คือ คนที่รู้จักกันคุ้นเคย คนที่มีเพศเดียวกัน และ คนที่รู้จักกันผิวเผิน ตามลำดับ ไม่มีนักเรียนคน

ใดที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับผู้ขายบริการทางเพศ สำหรับสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัย พบว่า มีนักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด นักเรียนหญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่ากลุ่มนักเรียนชาย

ตาราง 4.14

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของกลุ่มนักเรียน จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	หญิง (n = 19)		ชาย (n = 46)		รวม (n = 65)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คู่นอนครั้งล่าสุด						
คูรัก/แฟน	18	94.7	34	73.9	52	80.0
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	0	0	7	15.2	7	10.8
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	0	0	1	2.2	1	1.5
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	1	5.3	4	8.7	5	7.7
การใช้ถุงยางอนามัย						
ใช้	12	63.2	23	50.0	35	53.8
ไม่ใช้	7	36.8	23	50.0	30	46.2

ส่วนนักเรียนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ให้เหตุผลดังต่อไปนี้ ตามลำดับ

ตาราง 4.15

เหตุผลของกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุด

เหตุผล	จำนวน	ร้อยละ
ไม่สนุก/ไม่ค่อยสนุก/ไม่มัน/ไม่ชอบมาก/ไม่เชิง/มันสั้นไม่ชอบ	8	26.7
ไม่มี/ขอพี่ไม่ให้	6	20.0
คับขัน/รีบ อารมณ์พาไป	4	13.3
ไม่มีดั่งค์	3	10.0
ไม่รู้	2	6.7
ไม่ยอมใช้	1	3.3
ใช้ไม่เป็น	1	3.3
เขาไม่มีเพศสัมพันธ์กับใคร	1	3.3
เขาออกทัน	1	3.3
ลืมซื้อ	1	3.3
เป็นผู้หญิง	1	3.3
ไม่ตอบ	1	3.3

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

ในรอบปีที่ผ่านมา มีนักเรียนมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน ร้อยละ 9 หรือจำนวน 6 ราย นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน เป็นนักเรียนชายทั้งหมด

การใช้ถุงยางอนามัย พบว่านักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ/เงินตอบแทน มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง จำนวนครึ่งหนึ่ง (3 ราย) ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเลย จำนวน 1 ราย ไม่ตอบว่าใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ จำนวน 1 ราย

ตาราง 4.16 เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ				
มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน และการใช้ถุงยางอนามัย *	หญิง (n=19)		ชาย (n=46)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคย	0	0	6	13.0
ไม่เคย	19	100.0	40	87.0
การใช้ถุงยางอนามัย				
ใช้ทุกครั้ง	na	na	3	50.0
ไม่เคยใช้เลย	na	na	1	16.7
ไม่ตอบ	na	na	2	33.3

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาเท่านั้น


การผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น การมีปัสสาวะแสบขัด มีแผลที่อวัยวะเพศ หรือมีหนองไหลจากอวัยวะเพศ พบว่ามีสัดส่วนน้อยมากเพียง 5 รายเท่านั้น เป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง

การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการผิดปกติ พบว่านักเรียนจำนวน 3 ราย มีการปรึกษากับเพื่อน จำนวน 1 ราย ไปหาหมอที่สถานพยาบาลหรือคลินิก และอีกจำนวน 1 ราย ใช้วิธีการทายาหม่อง

แผนภาพ 4.5

การมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมา



ปัญหาเรื่องเพศ

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีนักเรียนประมาณร้อยละ 3 เคยมีย ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนชายมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศมากกว่า นักเรียนหญิง

การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

เรื่องเพศจะปรึกษากับพ่อแม่/ผู้ปกครอง หรือญาติ พี่น้อง รองลงมาคือ ปรึกษากับเพื่อน ปรึกษากับ แฟนหรือคูรัก หาหนังสืออ่านเอง และปรึกษากับ ครู/อาจารย์ ตามลำดับ มีนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วไม่รู้จะปรึกษากับใคร และ เก็บเอาไว้คนเดียว จำนวน 7 ราย

ตาราง 4.17

การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ จำแนกตามเพศ

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ	หญิง (n = 603)		ชาย (n = 647)		รวม (n = 1,250)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมีย	15	2.5	27	4.2	42	3.4
ไม่เคยมีย	588	97.5	620	95.8	1,208	96.6
การปฏิบัติตน						
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ญาติ	6	40.0	7	25.9	13	31.0
เพื่อน	4	26.7	6	22.2	10	23.8
ครู/อาจารย์	2	13.3	0	0	2	4.8
แฟน/คูรัก	1	6.7	4	14.8	5	11.9
หาหนังสืออ่าน	1	6.7	3	11.1	4	9.5
เก็บไว้คนเดียว	0	0	5	18.5	5	11.9
ไม่รู้จะปรึกษาใคร	0	0	2	7.4	2	4.8
ไม่ตอบ	1	6.7	0	0	1	2.4


การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในสัดส่วนไม่มากนัก กล่าวคือ มีประมาณร้อยละ 3 นักเรียนชายมีสัดส่วนของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่านักเรียนหญิง

ในกลุ่มนักเรียนที่มีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ที่นักเรียนทราบผลการตรวจเลือด มีจำนวน 12 ราย หรือร้อยละ 29 ที่ไม่ทราบผลการตรวจเลือด และอีกประมาณร้อยละ 10 ไม่ตอบว่าทราบผลการตรวจเลือดหรือไม่

แผนภาพ 4.6

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ



พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

พฤติกรรมการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68) ไม่เคยดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นักเรียนชายมีสัดส่วนของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิง

ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นานๆ ครั้ง หรือแล้วแต่โอกาสเท่านั้น มีเพียงร้อยละ 18 ของนักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาค่อนข้างบ่อยคือ ทุกวัน จนถึง 1 ครั้งต่อสัปดาห์

ตาราง 4.18

ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของกลุ่มนักเรียน จำแนกตามเพศ

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	หญิง (n = 603)		ชาย (n = 647)		รวม (n = 1,250)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ดื่ม	172	28.5	228	35.2	400	32.0
ไม่เคยดื่ม	431	71.5	419	64.8	850	68.0
ความถี่ *						
ทุกวัน	3	1.7	19	8.3	22	5.5
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์	5	2.9	25	11.0	30	7.5
1 ครั้งต่อสัปดาห์	6	3.5	14	6.1	20	5.0
แล้วแต่โอกาส	58	33.7	53	23.2	111	27.8
นานๆ ครั้ง	100	58.1	117	51.3	217	54.3

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

พฤติกรรมการเสพยาเสพติด


การเสพยาเสพติดประเภทผิดกฎหมาย ในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ ยาบ้า/กัญชา/เฮโรอีน หรือโคเคน เป็นต้น พบว่านักเรียนร้อยละ 5 ที่เคยเสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนชาย มีสัดส่วนของการเสพยาเสพติดมากกว่า

นักเรียนหญิง

ความถี่ของการเสพยาเสพติด พบว่ามีนักเรียนจำนวน 4 ราย ที่ต้องมีการเสพยาเสพติดทุกวัน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 3 ราย และนักเรียนหญิง จำนวน 1 ราย

แผนภาพ 4.7

การเสพยาเสพติดประเภทผิดกฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา



เพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีเพศสัมพันธ์และใช้สารเสพติด

เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา และเคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนเกือบครึ่งหนึ่งที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นนักเรียนชาย และมีสัดส่วนของ

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยมาก

สำหรับนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังจากเสพยาเสพติด พบว่ามีสัดส่วนที่น้อยมาก รวมทั้งสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งก็น้อยเช่นกัน

ตาราง 4.19 เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และหลังการเสพยาเสพติด และการใช้ถุงยางอนามัย จำแนกตามเพศ

สารเสพติด*	จำนวน	เพศสัมพันธ์		ใช้ถุงยางอนามัย							
				ทุกครั้ง		บางครั้ง		ไม่ใช้เลย		ไม่ตอบ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์											
หญิง	14	5	35.7	1	20.0	1	20.0	3	60.0	0	0
ชาย	38	20	52.6	6	30.0	5	25.0	7	35.0	2	10.0
สารเสพติด											
หญิง	3	0	0	na	na	na	na	na	na	na	na
ชาย	14	3	21.4	1	33.3	0	0	2	66.7	0	0

หมายเหตุ: * คัดสัดส่วนเฉพาะนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

วิธีการเสพยาเสพติด

การใช้สารเสพติดชนิดฉีดโลหิตดำ พบว่ามีนักเรียนจำนวน 6 รายที่เคยเสพยาเสพติดโดยการฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ เมื่อวิเคราะห์ลักษณะการเสพยาที่มีการใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น และไม่ทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนำมาใช้


ต่อ พบว่ามีจำนวนเพียง 1 รายเท่านั้น

นักเรียนที่มีการเสพยาเสพติดโดยการฉีดเข้าเส้นในครั้งแรกเมื่ออายุ 11 – 14 ปีเท่านั้น (ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงอายุของนักเรียนด้วย)

ตาราง 4.20		วิธีการเสพยาเสพติด จำแนกตามเพศ			
การเสพยาโดยฉีด เข้าเส้นโลหิตดำ		หญิง (n = 603)		ชาย (n = 647)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคย		0	0	6	0.9
ไม่เคย		14	2.3	47	7.3
ไม่เคยเสพยาเสพติด		589	97.7	594	91.8
ใช้เป็นครั้งแรกเมื่ออายุ (ปี)					
11		na	na	1	16.7
12		na	na	2	33.3
13		na	na	2	33.3
14		na	na	1	16.7
ใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น					
เคย		na	na	2	33.3
ไม่เคย		na	na	4	66.7
ทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนำมาใช้					
ทุกครั้ง		na	na	1	50.0
บางครั้ง		na	na	1	50.0

5

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
และอาชีวศึกษา 5 ฉบับรวมปี 2



5

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
และอาชีพศึกษา ระดับปวช. ปี 2

การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ใน ปี พ.ศ.2551 เป็นรอบที่ 7 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2551

ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เก็บข้อมูลกับโรงเรียนเดียวกันกับปี พ.ศ. 2550 ทั้งหมด แต่ได้มีการเพิ่มโรงเรียนขยายโอกาสของกรุงเทพมหานคร เข้ามาอีกจำนวน 2 โรงเรียน จึงมีโรงเรียนที่เป็นตัวอย่าง จำนวน 13 โรงเรียน

ส่วนในนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในปี พ.ศ. 2550 เช่นเดียวกัน แต่ได้มีโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ขอยกเว้น เนื่องจากเป็นช่วงที่นักศึกษาต้องออกฝึกงาน จึงได้ทำการสุ่มเลือกโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาที่อยู่ในโซนเดียวกันเข้ามาทดแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 โรงเรียน

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) ที่หน่วยข้อมูลจะมีช่วงตัวอย่าง (sampling interval) คือ

$$k = N/n$$

N = จำนวนประชากร

n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 วิธี คือ

1. วิธี Liner systematic random sampling เมื่อ $k = N/n$ เป็นตัวเลขที่ลงตัว (ไม่มีเศษ) เมื่อได้ค่า k แล้ว ทำการสุ่มตัวเลขที่มีค่าในช่วงค่า k เช่น ถ้า $k = 5$ นักวิจัยสุ่มตัวเลข 1-5 โดยใช้ตารางเลขสุ่ม

2. วิธี Circular systematic sampling เมื่อ $k = N/n$ เป็นตัวเลขที่ไม่ลงตัว (มีเศษ) มีวิธีการดังนี้ คือ $N/n = q$ (จำนวนเต็ม) + R (ตัวเศษของจำนวนเต็ม) หลังจากนั้นนักวิจัยเลือกค่า $k = q$ เมื่อ $R \leq n/2$ และเลือก $k = q + 1$ เมื่อ $R > n/2$ แล้วสุ่ม r โดยใช้ตารางเลขสุ่มจาก 1 ถึง k

ในบางกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถให้นักวิจัยสุ่มตัวอย่างนักเรียนแบบมีระบบได้ เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงต้องมีการสุ่มตัวอย่างนักเรียนเป็นห้องเรียน ดังนั้นนักวิจัยจะสุ่มตัวอย่างนักเรียนเป็นห้องเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่แตกต่างกันออกไปให้ครบตามจำนวนที่ต้องการในแต่ละโรงเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการ รวบรวมข้อมูลจาก Internet โปรแกรมที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมคือ Lime Survey โดยผู้พัฒนาโปรแกรม เพื่อมาใช้กับโครงการนี้คือ

ดร.ปริญ เพ็ญวุฒิ
ขั้นตอนของการทำ Web-based Survey มีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอน ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป

วิธีการตอบคำถามด้วย web-based survey

ขั้นที่ 1 การสมัคร

การเตรียมการสำหรับการตอบคำถาม ด้วย web-based survey นั้น อาจารย์ผู้ประสานงานทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ของแต่ละโรงเรียนที่ตกเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง เมื่อถึงวันเวลาดังหมาย อาจารย์ผู้ประสานงาน จัดนักเรียนให้ตอบแบบสอบถามนี้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถเชื่อมต่อกับ

ระบบอินเทอร์เน็ตได้ และเมื่อนักวิจัยพบกับนักเรียน นักวิจัยแนะนำตัว พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์และวิธีการสำหรับการตอบแบบสอบถาม ต่อจากนั้นนักวิจัยแจกรหัสหรือ Token พร้อมชื่อ Website ที่ใช้สำหรับการตอบแบบสอบถามให้นักเรียนแต่ละคน โดยรหัสหรือ Token ของแต่ละคนที่ได้รับจะไม่ซ้ำกัน เมื่อนักเรียนเข้าสู่ www.aihdmahidol.org แล้วจะพบหน้าแรกของเว็บไซต์นี้ ดังภาพ



วันที่ ๒ กรกฎาคม

จากขั้นที่ 1 เมื่อได้พบกับหน้าแรกของแบบสอบถามแล้วนักวิจัยให้นักเรียนเข้าสู่ระบบคือ ให้นักเรียนคลิกที่ **แบบสอบถามสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2** ระบบก็จะนำเข้าสู่หน้าที่ 2 คือการเข้าสู่ระบบ โดยนักเรียนต้องกรอกรหัสหรือ Token ที่ได้รับจากนักวิจัย โดย Token ที่นักเรียนกรอกนั้นประกอบด้วยเลข และ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์เล็ก)ทั้งสิ้น 15 หลัก โดยรหัสหรือ Token ที่นักเรียนกรอกนี้หากกรอกผิดหรือกรอกซ้ำกับ Token ที่ได้ตอบแบบสอบถามไปแล้ว ระบบจะให้นักเรียนกลับมาใส่ให้ถูกต้องอีกครั้ง โดย Token นี้ นักวิจัยเตรียมสำรองไว้เพื่อให้นักเรียนได้ตอบแบบสอบถามครบตามจำนวน หลังจากที่นักเรียนกรอก Token แล้ว คลิก **ดำเนินการต่อ**

แบบสอบถามด้านสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

คำถามมีทั้งหมด 59 ข้อ (41 ข้อใหญ่) ซึ่งเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัว

คำตอบนี้เป็นจริงของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการศึกษาวิจัยนี้

ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศ

ขอรับรองว่าคำตอบที่ได้จะไม่มีการนำไปเปิดเผยเป็นรายบุคคลโดยเด็ดขาด

This is a controlled survey. You need a valid token to participate.

If you have been issued with a token, please enter it in the box below and click continue.

Token

วันที่ ๖ กิจกรรมทบทวนความรู้และทบทวนทักษะ

หลังจากคลิก **ดำเนินการต่อ** ในหน้าที่ 2 จะพบกับหน้าเว็บที่แสดงรายละเอียดของแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย จำนวนข้อวัตถุประสงค์ของการสำรวจ คำชี้แจง และชื่อหน่วยงานที่ดำเนินการ ซึ่งนักวิจัยจะเป็นผู้อธิบายรายละเอียดเหล่านี้ เมื่ออธิบายเสร็จให้นักเรียนคลิก **ถัดไป**

แบบสอบถามด้านสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

คำถามทั้งหมด 59 ข้อ (41 ข้อใหญ่) ซึ่งเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัว

คำตอบที่ป็นจริงของบ้านจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศ

ขอรับรองว่าคำตอบที่ได้จะไม่มีการนำไปเปิดเผยเป็นรายบุคคลใดๆทั้งสิ้น

กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามในทุกข้อ และตอบตามความเป็นจริง
 ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อชีวิตของคนกรุงเทพฯ ที่ปลอดภัย
 จากโรคเอดส์

ขอให้ความมั่นใจว่าคำตอบของท่านจะเป็นความลับ และขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม

1. ไม่ต้องระบุ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่
2. แบบสอบถามนี้มีจำนวน 59 ข้อ (41 ข้อใหญ่) ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
 - ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากร
 - ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
 - ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรม
3. เลือกการตอบที่ต้องการ หรือ เติมข้อความสั้นๆ

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ

ส่วนงานวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 25/5 พุทธรณีสถูล 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 0-2441-9040-3 ต่อ 45, 54 หรือ 0-2441-9870
 โทรสาร 0-2441-9044

หรือ กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ 0-2860-8751-6 ต่อ 502 หรือ 507

There are 61 questions in this survey.

A Note On Privacy
 This survey is anonymous.
 The record kept of your survey responses does not contain any identifying information about you unless a specific question in the survey has asked for this. If you have responded to a survey that used an identifying token to allow you to access the survey, you can rest assured that the identifying token is not kept with your responses. It is managed in a separate database, and will only be updated to indicate that you have (or haven't) completed this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses in this survey.

ถัดไป >>

[จบแบบสำรวจและล้างข้อมูล]

Load Unfinished Survey

วันที่ 4 การตอบแบบสอบถาม

เมื่อถึงหน้าแบบสอบถามหน้าแรกแล้ว
ให้นักเรียนเริ่มตอบแบบสอบถาม โดยต้องตอบ
ตามความจริงซึ่งแบบสอบถามจะมีแบบเลือก
ตอบ แบบเติมคำหรือตัวเลข และมีทั้งหมด 3
หน้า คำถามในแต่ละข้อจะมีคำอธิบายวิธีการ
ตอบไว้อย่างละเอียด เมื่อนักเรียนตอบหน้าที่หนึ่ง

และหน้าที่สองเสร็จคลิก **ถัดไป**

เมื่อตอบหน้าที่สามเสร็จคลิก **Submit** ซึ่ง
การตอบแบบสอบถามในแต่ละหน้า นักเรียนต้อง
ตอบครบทุกข้อถึงจะสามารถไปตอบคำถามใน
หน้าถัดไปได้

*กรุณารูปแบบของท่าน Choose one of the following answers ☐ เพศชาย ☐ เพศหญิง
*ท่านกำลังศึกษาอยู่ในระดับใด Choose one of the following answers ☐ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ☐ อาชีวศึกษาชั้นปีที่ 2 ? กรุณาระบุลักษณะของสถาบันและระดับการศึกษาของท่าน
*ข้อที่ 1) ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. ไດ Choose one of the following answers กรุณาเลือก.. v ? กรุณาระบุปีพ.ศ.ที่เกิด โดยการเลือกปีที่ท่านเกิดจากรายการที่มีอยู่
*ข้อที่ 2) ท่านอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลากี่ปี และ กี่เดือน Only numbers may be entered in these fields จำนวนปี จำนวนเดือน ? กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลขลงในช่องที่กำหนด ตัวอย่าง เช่น ท่านอยู่ในกรุงเทพฯ มาแล้ว 6 เดือน ให้กรอก จำนวนปี [0] จำนวนเดือน [6] ท่านอยู่ในกรุงเทพฯ มาแล้ว 4 ปี 3 เดือน ให้กรอก จำนวนปี [4] จำนวนเดือน [3]

ขั้นที่ ๓ การส่งข้อสอบกลับสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เมื่อคลิก **Submit** ในแบบสอบถาม ที่ตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วขึ้นหน้าเว็บนี้หรือไม่
 หน้าที่สามแล้ว หมายถึง การตอบแบบสอบถาม ถ้ามีหน้าเว็บนี้แล้วถึงจะสามารถปิด Window
 ของนักเรียนสมบูรณ์แล้ว จะปรากฏหน้าเว็บดัง และรับของที่ระลึกจากโครงการ ซึ่งเป็นการเสร็จ
 ภาพ ซึ่งหน้าเว็บนี้ต้องให้นักวิจัยตรวจว่านักเรียน สิ้นการตอบแบบสอบถาม



ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มนักเรียนตัวอย่างที่เข้ามาตอบ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียน
 แบบสอบถามในครั้งนี้ มีสัดส่วนของนักเรียน อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนใกล้เคียง
 หญิงมากกว่านักเรียนชาย สำหรับสัดส่วนของ กัน

ตาราง 5.1	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษา			
ข้อมูลทั่วไป	ระดับการศึกษา			
	มัธยมศึกษาปีที่ 5 (n = 1,183)		อาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 1 (n = 1,158)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หญิง	672	56.8	645	55.7
ชาย	511	43.2	513	44.3

อายุโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง อายุที่สูงที่สุดเท่ากับ 22 ปี เมื่อเปรียบเทียบอายุประมาณ 16.8 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักเรียน จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษาเท่ากับ 0.9 อายุที่น้อยที่สุดเท่ากับ 15 ปี และ แล้วไม่มีความแตกต่างกันมากนัก

ตาราง 5.2		อายุเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ							
ข้อมูลทั่วไป	มัธยมศึกษาปีที่ 5			อาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2			รวม		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
ค่าเฉลี่ย	16.7	16.6	16.7	16.9	16.8	16.8	16.8	16.7	16.8
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	.84	.80	.82	1.06	.83	.97	.96	.82	.90
อายุต่ำสุด	15	15	15	15	15	15	15	15	15
อายุสูงสุด	22	22	22	22	22	22	22	22	22

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ระดับปวช. ปี 2 เด็กน้อย นักเรียนชายมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 13.4 ปี นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร มากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา นักเรียนหญิงเด็กน้อย

ตาราง 5.3	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2			
ลักษณะประชากร*	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	น้อยที่สุด	มากที่สุด
หญิง	13.3	5.26	1	22
ชาย	14.3	4.26	1	20
มัธยมศึกษาปีที่ 5	14.1	4.44	1	19
อาชีวศึกษาชั้นปีที่ 2	13.4	5.26	1	22
รวม	13.7	4.87	1	22

หมายเหตุ: * ไม่รวมนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในบริเวณเขต คือ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี

ลักษณะการพักอาศัยของนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 80) มีการพักอาศัยอยู่กับบิดา และ/หรือมารดา รองลงมาประมาณร้อยละ 14 อาศัยอยู่กับญาติพี่น้องที่เหลืออาศัยอยู่กับพี่ๆ น้องๆ อยู่กับเพื่อน และอยู่เพียงลำพังคนเดียว ซึ่งมีสัดส่วนที่น้อยมาก

นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนของการพักอาศัยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา และ/หรือมารดามากกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชายมีสัดส่วนของการอาศัยอยู่กับบิดา และ/หรือมารดามากกว่านักเรียนหญิง

ตาราง 5.4	ลักษณะการพักอาศัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ									
บุคคลที่พักอาศัย	รวม		มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2			
			หญิง (n = 672)		ชาย (n = 509)		หญิง (n = 645)		ชาย (n = 513)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดา และ/หรือมารดา	1,936	82.8	563	83.8	445	87.4	505	78.3	423	82.5
ผู้ปกครอง/ญาติ (ลุง, ป้า, น้า, อา)	329	14.1	89	13.2	49	9.6	112	17.4	79	15.4
พี่น้อง/ลูกพี่ลูกน้อง	46	2.0	14	2.1	7	1.4	18	2.8	7	1.4
คนรู้จัก	1	0.0	0	0	1	0.2	0	0	0	0
อยู่คนเดียว	9	0.4	1	0.1	3	0.6	2	0.3	3	0.6
อยู่กับเพื่อน	9	0.4	1	0.1	0	0	7	1.1	1	0.2
อื่นๆ เช่น ครู, วัด, พี่เลี้ยง, คูรัก, สถานสงเคราะห์ เป็นต้น	9	0.4	4	0.6	4	0.8	1	0.2	0	0

หมายเหตุ: * ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยถ้าอาศัยอยู่กับหลายบุคคล เช่น อาศัยอยู่กับมารดา และพี่น้อง ให้ลำดับความสำคัญกับมารดา

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (เกรดเฉลี่ย) ในปีการศึกษาที่ผ่านมาของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในรอบปี พ.ศ. 2551 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลางจนถึงดีมาก นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างอ่อน หรือมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2 มีเพียงร้อยละ 10 และในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน เป็นนักเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงมาก คือ มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.5 ขึ้นไป เมื่อวิเคราะห์กลุ่มนักเรียนตัวอย่างในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 แล้วพบว่า นักเรียนครึ่งหนึ่งมีผลการเรียนในระดับกลางๆ คือ มีเกรดเฉลี่ยประมาณ 2.00 – 3.00 ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ตาราง 5.5

ระดับการศึกษาของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
และนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ระดับการศึกษา	รวม (n = 2,341)		มัธยมศึกษาปีที่ 5 (n = 1,183)		อาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2 (n = 1,158)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
≤ 1.5	36	1.5	17	1.4	19	1.6
1.51 – 2.00	192	8.2	86	7.3	106	9.2
2.01 2.50	465	19.9	221	18.7	244	21.1
2.51 – 3.00	726	31.0	395	33.4	331	28.6
3.01 – 3.50	684	29.2	364	30.8	320	27.6
> 3.50 ขึ้นไป	238	10.2	100	8.5	138	11.9

การมีคูรักรหรือแฟนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีคูรักรหรือแฟน นักเรียนมากกว่า 1 ใน 3 ที่มีคูรักรหรือแฟน นักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2 สัดส่วนของการมีคูรักรหรือแฟนมากกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการมีคูรักรหรือแฟนมากกว่านักเรียนชาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคูรักรหรือแฟนร้อยละ 31 นักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการมีคูรักรหรือแฟนมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย

นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีคูรักรหรือแฟนร้อยละ 43 นักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการมีคูรักรหรือแฟนมากกว่านักเรียนชาย

ตาราง 5.6		การมีคูรักรหรือแฟนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ									
การมีคูรักร		มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
		หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยังไม่มีคูรักร		460	68.5	355	69.5	346	53.6	318	62.0	1,479	63.2
มีคูรักร		212	31.5	156	30.5	299	46.4	195	38.0	862	36.8

ลักษณะการใช้เวลาว่างของกลุ่มนักเรียนในภาพรวม พบว่ามีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประมาณ 1 ใน 3 ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการดูภาพยนตร์/โทรทัศน์/ฟังเพลง หรืออ่านหนังสือ มีนักเรียนประมาณ 1 ใน 4 ใช้เวลาว่างไปกับการเล่นกีฬา เล่นดนตรี และการออกกำลังกาย ร้อยละ 14 ใช้เวลาว่างกับการเล่นเกมส์/Internet

ใช้เวลาว่างที่แตกต่างกัน โดยที่นักเรียนหญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42) ใช้เวลาว่างกับการดูภาพยนตร์/โทรทัศน์/ฟังเพลง หรืออ่านหนังสือ สำหรับนักเรียนชายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43) ใช้เวลาว่างกับการเล่นกีฬา เล่นดนตรี และการออกกำลังกาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะของการใช้เวลาว่างไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักกับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.

นักเรียนหญิง และนักเรียนชายมีการ ปี 2

ตาราง 5.7											การใช้เวลาว่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2										
การใช้เวลาว่าง		เพศ				ระดับการศึกษา				รวม (n = 2,341)											
		หญิง (n = 1,317)		ชาย (n = 1,024)		ม. 5 (n = 1,183)		ปวช.2 (n = 1,158)													
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ										
ไม่ตอบ		3	0.2	1	0.1	3	0.3	1	0.1	4	0.2										
เล่นกีฬา/เล่นดนตรี/ออกกำลังกาย		104	7.9	437	42.7	315	26.6	226	19.5	541	23.1										
เรียนพิเศษ		59	4.5	31	3.0	79	6.7	11	0.9	90	3.8										
ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/เสพสารเสพติด		2	0.2	19	1.9	4	0.3	17	1.5	21	0.9										
เล่นการพนัน		2	0.2	7	0.7	6	0.5	3	0.3	9	0.4										
เดินตามศูนย์การค้า/Shopping		23	1.7	14	1.4	20	1.7	17	1.5	37	1.6										
เล่นเกมส์/Internet		126	9.6	191	18.7	143	12.1	174	15.0	317	13.5										
ทำงานเพื่อหารายได้พิเศษ		46	3.5	33	3.2	18	1.5	61	5.1	79	3.4										
คุยโทรศัพท์		101	7.7	22	2.1	56	4.7	67	5.8	123	5.3										

ตาราง 5.7

การใช้เวลาว่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ต่อ)

การใช้เวลาว่าง	เพศ				ระดับการศึกษา				รวม (n = 2,341)	
	หญิง (n = 1,317)		ชาย (n = 1,024)		ม. 5 (n = 1,183)		ปวช.2 (n = 1,158)			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทำงานบ้าน/ช่วยเหลือครอบครัว ทำงาน	98	7.4	25	2.4	56	4.7	67	5.8	123	5.3
เที่ยวตามสถานบันเทิง	2	0.2	5	0.5	3	0.3	4	0.3	7	0.3
ทำการบ้าน/อ่านหนังสือ	80	6.1	20	2.0	57	4.8	43	3.7	100	4.3
สังสรรค์กับเพื่อนๆ	33	2.5	16	1.6	12	1.0	37	3.2	49	2.1
ดูภาพยนตร์/โทรทัศน์/ฟังเพลง/ อ่านหนังสือทั่วไป	559	42.4	180	17.6	365	30.9	374	32.3	739	31.6
นอนหลับ	79	6.0	22	2.1	46	3.9	55	4.7	101	4.3
ท่องเที่ยว	0	0	1	0.1	0	0	1	0.1	1	0.1

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

การสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์มีจำนวน 7 ข้อ พบว่านักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันเอดส์ได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 90 รองลงมานักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับ “การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไว้ใจโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยสามารถติดเชื้อเอดส์ได้” ร้อยละ 71 สำหรับความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส นักเรียนสามารถตอบได้ถูกต้องในสัดส่วนที่น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 30 เท่านั้น

ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนหญิง และนักเรียนชายมีสัดส่วนของการตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ทั้ง 7 ข้อ ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยที่ความรู้เกี่ยวกับ “คนที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ได้” “กินอาหารร่วมกันติดเชื้อเอดส์ได้” และ “การร่วมเพศกับคนรักที่น่าไว้ใจ โดยไม่ใช้

ถุงยางอนามัยสามารถติดเชื้อเอดส์ได้” นักเรียนหญิงตอบคำถามได้ถูกต้องในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนชาย ส่วนความรู้เรื่องอื่นๆ นักเรียนชายสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องในสัดส่วนที่สูงกว่านักเรียนหญิง

ส่วนนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ในภาพรวมแล้ว พบว่านักเรียนชายสามารถตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้มากกว่านักเรียนหญิงเล็กน้อย โดยที่นักเรียนหญิงสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับ “คนที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ได้” “การร่วมเพศกับคนรักที่น่าไว้ใจโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยสามารถติดเชื้อเอดส์ได้” และ “มียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอดส์ได้” ได้มากกว่านักเรียนชาย ส่วนความรู้อื่นๆ นักเรียนชายสามารถตอบได้ถูกต้องในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนหญิง

ตาราง 5.8

ร้อยละการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

ข้อ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 5		อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2		รวม	
		หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	จำนวน	ร้อยละ
1	การใช้ถุงยางอนามัยป้องกันเอดส์ได้	90.9	93.2	86.7	92.0	2,118	90.5
2	การมีคู่นอนคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์ สามารถป้องกันเอดส์ได้	69.2	73.8	59.1	67.8	1,571	67.1
3	คนที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่ติดเชื้อ เอดส์ได้	74.6	71.2	63.9	61.8	1,594	68.1
4	ยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอดส์ได้	51.2	53.0	42.6	49.7	1,145	48.9
5	กินอาหารร่วมกันติดเชื้อเอดส์ได้	52.1	50.1	42.3	44.8	1,109	47.4
6	การร่วมเพศกับคนรักที่นำใจไว้วางใจโดยไม่ ใช้ถุงยางอนามัยสามารถติดเชื้อเอดส์ได้	76.8	72.6	69.1	63.7	1,660	70.9
7	มียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอดส์ได้	29.0	31.9	31.0	26.7	695	29.7

สำหรับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตาม
ตัวชี้วัดของ UNGASS ข้อที่ 1-5 พบว่ามีนักเรียน
ตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อ (ข้อ 1-5) ร้อยละ 13
นักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการตอบคำถาม ข้อที่
1-5 ได้ทุกข้อน้อยกว่านักเรียนชาย นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนของการตอบคำถาม
ได้ถูกทั้ง 5 ข้อมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ
ปวช. ปี 2

เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มนักเรียนมัธยม-
ศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนหญิง และนักเรียน
ชายมีสัดส่วนการตอบคำถาม ข้อที่ 1-5 ได้ถูกทุก
ข้อใกล้เคียงกันส่วนในนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ
ปวช. ปี 2 นักเรียนชายมีสัดส่วนของการตอบ

คำถามข้อที่ 1-5 ได้ถูกทุกข้อมากกว่านักเรียน
หญิง

การตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูก
ทั้งหมด (ข้อที่ 1-7) พบว่ามีนักเรียนเพียงร้อยละ
3 เท่านั้นที่ตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ นักเรียนหญิง
และนักเรียนชายมีสัดส่วนของการตอบคำถามได้
ถูกทุกข้อเท่าๆ กัน ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
มีสัดส่วนการตอบคำถามได้ถูกทุกข้อมากกว่า
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี
2 พบว่านักเรียนหญิง และนักเรียนชาย มีสัดส่วน
การตอบคำถามได้ถูกทุกข้อเท่าๆ กัน

ตาราง 5.9 การตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด UNGASS ได้ถูกต้องของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2										
ความรู้	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ตอบข้อที่ 1 – 5 ได้ถูกต้อง (ตามตัวชี้วัด UNGASS)	134	19.9	99	19.4	69	10.7	81	15.8	150	13.0
ตอบข้อที่ 1-7 ได้ถูกต้อง	39	5.8	30	5.9	19	2.9	16	3.1	35	3.0

พฤติกรรมการใช้ Internet

การสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีนักเรียนจำนวน 59 ราย หรือร้อยละ 3 ที่ไม่เคยใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนหญิง-นักเรียนชายมีสัดส่วนของการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกัน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 เล็กน้อย ในกลุ่มนักเรียนที่เคยใช้ Internet ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีระยะเวลาที่ใช้ Internet ในแต่ละวันประมาณ 3 ชั่วโมง

สถานที่ที่ใช้ Internet เป็นประจำ คือ ที่บ้าน ที่ร้าน Internet และที่โรงเรียน โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนหญิงจะใช้ Internet เป็นประจำที่บ้าน กับที่โรงเรียน ส่วนในนักเรียนชายจะใช้ Internet เป็นประจำที่บ้าน กับที่ร้าน Internet

การมีคูรักรหรือแฟนทาง Internet พบว่านักเรียนประมาณ 1 ใน 4 ที่มีคูรักรหรือแฟนทาง Internet นักเรียนชายมีสัดส่วนของการมีคูรักรหรือแฟนทาง Internet มากกว่านักเรียนหญิง และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนของการมีคูรักรหรือแฟนทาง Internet มากกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตาราง 5.10		พฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2									
พฤติกรรมการใช้ Internet		มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
		หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เคย		665	99.0	499	97.7	616	95.5	502	97.9	1,118	96.5
2. ระยะเวลา (นาที)		150		180		180		180		180	
(มัธยฐาน)		(2.5 ช.ม.)		(3 ช.ม.)		(3 ช.ม.)		(3 ช.ม.)		(3 ช.ม.)	

ตาราง 5.10		พฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (ต่อ)									
พฤติกรรมการใช้ Internet		มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
		หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3. สถานที่											
บ้าน		417	62.7	350	70.1	253	41.1	258	51.5	1,278	56.0
ร้าน Internet		122	18.3	109	21.8	166	26.9	185	36.9	582	25.5
โรงเรียน		108	16.2	29	5.8	178	28.9	45	9.0	360	15.8
หอพัก		1	0.2	3	0.6	1	0.2	1	0.2	6	0.3
ศูนย์การค้า		0	0	1	0.2	0	0	0	0	1	0.0
บ้านเพื่อน		17	2.6	7	1.4	18	2.9	10	2.0	52	2.3
ไม่ตอบ		0	0	0	0	0	0	2	0.4	2	0.1
4. มีคูรัก/แฟน		100	15.0	103	20.6	127	20.6	175	34.9	505	22.1

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

นักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปี พ.ศ. 2551 มีประมาณร้อยละ 21 นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์จะเป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

การวิเคราะห์พฤติกรรมทางเพศของนักเรียน จะวิเคราะห์เฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน (n = 482)

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นการสมัครใจมีเพศสัมพันธ์ มีนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยการถูกบังคับ ร้อยละ 15 โดยนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยการถูกบังคับมากกว่านักเรียนชายค่อนข้างชัดเจน ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ

นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกใกล้เคียงกัน

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนพบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 88 มีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกกับคูรักหรือแฟน มีร้อยละ 6 มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน และมีประมาณ 1-2 ที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน และบุคคลที่ขายบริการทางเพศ ตามลำดับ สำหรับนักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนมากกว่านักเรียนชาย ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนไม่แตกต่างกันมากนัก

การใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์

ในครั้งแรก พบว่านักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งที่ใช้นักเรียนหญิง-นักเรียนชาย และกลุ่มนักเรียน
ถุงยางอนามัยในครั้งแรก สัดส่วนของการใช้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ
ถุงยางอนามัยไม่แตกต่างกันมากนัก ในกลุ่ม ปวช. ปี 2

ตาราง 5.11 เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เคยมีประสบการณ์ทางเพศ	45	6.7	75	14.7	174	27.0	188	36.6	482	20.6
2. เพศสัมพันธ์ครั้งแรก*										
ถูกบังคับ	9	20.0	7	9.3	42	24.1	12	6.4	70	14.5
สมัครใจ	36	80.0	68	90.7	132	75.9	176	93.6	412	85.5
3. คู่่อนครั้งแรก*										
คูรัก/แฟน	43	95.6	59	78.7	159	91.4	162	86.2	423	87.8
คนที่รู้จักกันคุ้นเคย	2	4.4	8	10.7	9	5.2	9	4.8	28	5.8
คนที่รู้จักกันผิวเผิน	0	0	3	4.0	2	1.1	4	2.1	9	1.9
คนขายบริการทางเพศ	0	0	0	0	0	0	8	4.3	8	1.7
เพศเดียวกัน	0	0	5	6.7	4	2.3	5	2.7	14	2.9
4. การใช้ถุงยางอนามัย*	24	53.3	35	46.7	83	48.0	93	49.5	235	48.9

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน

อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ประมาณ 15 ปี อายุที่น้อยที่สุดของนักเรียนที่มี เพศสัมพันธ์ครั้งแรก เท่ากับ 8 ปี ถ้าวิเคราะห์ดู นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยกว่า 15 ปี มีประมาณร้อยละ 17

เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มนักเรียน จำแนก ตามเพศ และระดับการศึกษา พบว่าอายุโดย เฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ไม่แตกต่างกัน

ระหว่างนักเรียนหญิง-นักเรียนชาย และนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปี 2 กลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อายุน้อยกว่า 15 ปี สัดส่วนของนักเรียนชายมี มากกว่านักเรียนหญิงในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ส่วนกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกอายุน้อยกว่า 15 ปี มากกว่านักเรียนชาย

ตาราง 5.12	อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2
------------	---

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก*	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
8 – 14 ปี	9	20.5	12	16.2	21	12.1	41	21.8	83	17.3
15 ปี	21	47.7	35	47.3	71	40.8	73	38.8	200	41.7
16 ปี	7	15.9	19	25.7	55	31.6	53	28.2	134	27.9
17 – 25 ปี	7	15.9	8	10.8	27	15.5	21	11.2	63	13.1
ค่าเฉลี่ย	15.3		15.3		15.5		15.2		15.3	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.0		1.7		1.1		1.4		1.2	
อายุน้อยที่สุด	13		10		12		8		12	8
อายุมากที่สุด	17		25		18		20		18	25

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ในกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก มีเหตุผลของแต่ละบุคคลที่ หลากหลายดังต่อไปนี้

เพศสัมพันธ์เร็วแรก (นศ.๖)

ก็ดูจากที่รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณไม่น่าจะจะมีอะไรเกิดขึ้น, กลัว, กระทั่งหื่น ไม่สนใจ, เขาไม่ใช้, เขาไม่บอกใคร, ชู้ใจ, ชู้ใจเขาว่าปลอดภัย, ชู้ใจไม่ทัน, โดนขืนใจ, ตอบไม่ถูก, ถูกขืนใจ, ถูกขืนใจแล้วไม่คิดถึงผลที่ตามมาด้วย, ไม่รู้ว่าควรทำสิ่งใด, ซึ่งไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีมันเป็นเพราะอารมณ์พาไปเองแต่คุณต้องการหลีกเลี่ยง, คนรักเป็นเพศเดียวกัน, คบกับแฟนมาเป็นปีแล้วไม่มีคนอื่น, รู้จักกันดีแต่ไม่รู้วิธี, ไปมาหาสู่กันบ่อย, มันใจในตัวเองมากจึงยอมมีอะไรด้วย, คู่รักไม่ใส่ใจ, ตีกันมีแฟนเป็นผู้หญิงเหมือนกัน, ตอนนั้นไม่มีถุงยางและมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่ทันคิดถึงข้อเสียของการไม่ใช้, ถูกคนรักขืนใจและเขาไม่ยอมใส่ถุงยาง, มันไม่มัน, เมาส์ราเลอไม่รู้ตัว, ไม่กลัวว่าจะมีโรคเอดส์, เป็นวัยที่เพิ่งได้กอด ซึ่งไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับถุงยางอนามัยมากนักจึงทำให้ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เลย, มีอาการเมามากแล้วหลับ และไม่ทราบว่าจะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพอตื่นมาก็อยู่ที่บ้านเขาและรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัว, ไม่เคยใช้, ไม่ได้คิดที่ตั้งใจจะมี, ไม่ได้คิดว่าจะมี, ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า, ไม่ทันได้ตั้งตัว, ไม่มี, ไม่รู้เรื่อง, ตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาที่จะทำอะไรไม่รู้เรื่องถุงยางอนามัย, ไม่อยากใช้, รู้เท่าไม่ถึงการณ์, เต็มใจจะไม่ถึงใจ, ว่าแฟนเขาบอกว่ามีเพศสัมพันธ์ตอนนั้น และเขาซึ่งบอกว่าต่างคนก็คนแรกคงไม่มีปัญหา, มันไม่ทันตั้งตัวมีโดยไม่ได้คิดมาก่อน, ไม่กลัวและไม่สิ้น, แฟนไม่ใช้, ตอนนั้นไม่รู้ตัว, ตอนนั้นหลับอยู่, เพศเดียวกันไม่รู้จะใช้ทำไม, แฟนหาไม่ทันรอไม่ไหวแล้ว, ไม่กล้าซื้อ, มันกระทั้งหื่น, มันใจว่าแฟนเขาไม่มีคนอื่น ถ้ารู้ว่ามันก็เลิกกันไป หรือไม่ก็ใช้ถุงยาง แต่ตอนนี้บางครั้งก็ใช้บางครั้งก็ไม่ใช้, มันไม่สิ้น และจะรู้สึกเจ็บ, ไม่รู้, มีกับเพศเดียวกัน(ทอม), ไม่กล้าเข้าไปซื้อ, ไม่กล้าซื้อ, ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีอะไรกัน, ไม่คิดว่าจะมี, ไม่คิดว่าจะมีอะไรกัน, ไม่เคยซื้อ, ไม่ชอบมันไม่มัน, ไม่ได้ซื้อ, ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่ได้ตั้งใจแต่อารมณ์พาไป, ไม่ได้ตั้งตัว, ไม่ได้เตรียมตัวมา, ไม่ได้เตรียมมา, ไม่ได้เตรียมไว้, ไม่ได้มีการเตรียมพร้อม, ไม่ได้รู้ล่วงหน้า, ไม่ทราบ, ไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีเพศสัมพันธ์ เหตุเพราะฝ่ายชายขืนใจ, ไม่ทันคิด, ไม่ทันใช้, ไม่ทันตั้งตัว, กระทั่งหื่น ทำอะไรไม่ถูก, ไม่รู้ฝ่ายชาย, ไม่รู้เพราะไม่เป็น, ไม่รู้ไม่เคยมี, ไม่รู้ล่วงหน้า, ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ในการมีเพศสัมพันธ์, ไม่รู้ว่าจะมี, ไม่สามารถหาซื้อได้, ไม่อยากใช้, ไม่อยากใช้, เพิ่งได้กอดซึ่งไม่ค่อยรู้, เพิ่งได้รู้จักการใช้, เขาไม่คิดว่าเขาจะเจอแบบนี้กับตัวเองโดยไม่ได้ตั้งตัว, ลืมซื้อ, ไม้ใจ, ไม้ใจจากใจเขา, อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีความพร้อม, อาจไม่กล้าซื้อ



บทสัมภาษณ์ครูแว่น (พี่ข)

ฉันใจว่าไม่ชัด, ไม่ได้ซื้อครับ, กระทั่งหันไม่ทันได้เซรียม, ชี้ก็ยังไม่, จะได้สบาย, ช่วงฉุกเฉิน, เซอใจกัน, ใช้ไม่เป็น, ใช้แล้วไม่มัน, เซอใจดูรกว่าไม่มีเชื้อเอชไอวี, ซื้อไม่ทัน, เดี่ยวเสียครู, อู้งายหมด, ตอนนั้นยังเด็กและมีเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนจึงไม่มีเวลาใช้, บรรยายภาพไป, ปล่อยนอก, เบสิองเงิน, เทยยังบริสุทธิ์, ไปซื้อไม่ทันอารมณ์มันมาแล้ว, ผมมันใจในตัวของแฟนผม, ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีเพศสัมพันธ์เลยไม่ได้เซรียม, ไม่ได้เซรียมมาล่วงหน้า, ไม่ได้ตั้งใจ, ยังไม่รู้วิธีป้องกัน, ยังรู้เท่าไม่ถึงการตอนนั้นอายุ 12 ปี (ม.1), เรารัก, ไม่ได้คิดล่วงหน้าว่าจะมีเพศสัมพันธ์, ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ทั้งคู่เลยไม่ได้ใช้ถุงยาง, แฟนไม่ชอบ, มันกว่า, มันใจ, มันใจในตัวเอง, มันใจว่าคนที่คบอยู่ปลอดภัย, มันใจว่าไม่มีเอดส์, มันดีแล้ว, มันเป็นระยะปลอดภัย, มันเสียเงินนะ, ฝ่ายมีเงินซื้อ, เมา, ไม่กล้าซื้อ, ไม่คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กัน, ไม่เคยใช้, ไม่จำเป็น, ไม่ได้เซรียมการและไม่คิดว่าจะมี พอมีโอกาสก็...กันเลย, ไม่ได้ซื้อ, ไม่ได้ซื้อติดตัว, ไม่ได้คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์เลยไม่ได้เซรียม, ไม่ได้เซรียมไว้, ไม่ได้เซรียมมา แล้วจะเอาที่ไหนใช้ หรือไม่ได้ใส่ใจป้องกัน, ยุ่งยากลำบากในการมีเพศสัมพันธ์และ หนูเป็นเพศที่สามคงจะไม่ต้องใส่ ควรจะให้คนที่มีความสัมพันธ์กับหนูใส่, ไม่ทราบ, ไม่ทันคิด, ลืม, ไม่ทราบว่าโรคเอดส์ติดต่อกันได้, ไม่ทัน, ไม่มัน, ไม่มี, ไม่มีเงินซื้อ, ไม่มีถุงยาง, ไม่มีเวลาไปซื้อ, ไม่มีเวลาใส่, เหงาตัว, อยากลอง, อารมณ์พาไป, คิดว่ามันไม่มีโรคติดช่ออยู่แล้ว, ไม่รู้, ไม่รู้ว่าจะมี, ไม่สามารถขอได้, ไม่อยากใช้, ไม่อยากใช้ไม่ชอบ, ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์, ลืม, อยากรู้ใจร้อน, เวลากระชั้นชิด, ไวใจ, ไวใจกัน, ไวใจแฟน, ไววางใจ, ไววางใจในตัวของแฟนเพราะยังไม่ค่อยรู้อะไรมาก, เสียเวลาและหาถุงยางยากเพราะยังเด็กอยู่, หาซื้อยาก, หาไม่ได้, ไม่กล้าไปซื้อ, หาไม่ทัน,



เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์มีร้อยละ 74 หรือประมาณ 3 ใน 4 มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้นข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา คิดสัดส่วนเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา เท่านั้น ไม่นับรวมนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทของคู่นอนของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ในส่วนนี้คิดสัดส่วนในแต่ละประเภทของคู่นอน โดยแยกวิเคราะห์กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาของกลุ่มนักเรียน โดยส่วนใหญ่แล้วมีเพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟน รองลงมาคือ บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน

บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย บุคคลที่มีเพศเดียวกัน ตามลำดับ นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ขายบริการทางเพศมีสัดส่วนที่น้อยมาก คือ ประมาณร้อยละ 5 เท่านั้น

ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคูรักหรือแฟน ในสัดส่วนที่น้อยกว่านักเรียนชาย ส่วนในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 นักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟน ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

นักเรียนที่มีคู่นอนมากกว่า 1 ประเภท ในรอบปีที่ผ่านมา มีประมาณ 1 ใน 4 เป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง ส่วนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษามีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

ตาราง 5.13 ประเภทคู่นอน และการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ในรอบปี*	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง (n = 44)		ชาย (n = 74)		หญิง (n = 174)		ชาย (n = 188)		(n = 480)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เคยมีเพศสัมพันธ์	29	65.9	43	58.1	141	81.0	142	75.5	355	74.0
2. ประเภทคู่นอน*										
คูรัก/แฟน	27	93.1	35	83.3	134	95.0	132	93.0	328	92.7
คนที่รู้จักกันคุ้นเคย	2	6.9	14	32.6	14	10.0	43	30.3	73	20.6
คนที่รู้จักกันผิวเผิน	2	6.9	9	20.9	10	7.1	16	11.3	37	10.4
คนขายบริการทางเพศ	0	0	1	2.3	5	3.5	10	7.0	16	4.5
เพศเดียวกัน	2	6.9	4	9.3	14	9.9	15	10.6	35	9.8
3. จำนวนคู่นอน (ประเภท)*										
1 ประเภท	23	79.3	28	65.1	117	83.0	88	62.0	256	72.1
มากกว่า 1 ประเภท	6	20.7	15	34.9	24	17.0	54	38.0	99	27.9

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนเฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

การใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทต่างๆ พบว่ากลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ขายบริการทางเพศ มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ กลุ่มนักเรียนที่มีคู่นอนเป็นคูรักหรือแฟนมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยที่สุด คือ ประมาณร้อยละ 20

เมื่อเปรียบเทียบการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟน จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษาแล้วพบว่านักเรียนหญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักหรือแฟนมากกว่านักเรียนชาย และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรักมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ตาราง 5.14 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

การใช้ถุงยางอนามัย*	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คูรัก/แฟน (n = 328)	9	33.0	5	14.3	25	18.7	26	19.7	65	19.8
คนที่รู้จักกันคุ้นเคย (n = 73)	2	100.0	6	42.9	5	35.7	15	34.9	28	38.4
คนที่รู้จักกันผิวเผิน (n = 37)	1	50.0	5	55.6	1	10.0	9	56.3	16	43.2
คนขายบริการทางเพศ (n = 16)	0	0	1	100.0	2	40.0	7	70.0	10	62.5
เพศเดียวกัน (n = 35)	1	50.0	1	25.0	2	14.3	5	33.3	9	25.7

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนในแต่ละประเภท

จำนวนคู่นอน (คน) ของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 มีคู่นอนเพียงคนเดียวในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวิเคราะห์จำนวนคู่นอนโดยเฉลี่ยแล้ว พบว่านักเรียนมีคู่นอนเฉลี่ยใน

รอบปีที่ผ่านมา ประมาณ 2 คนนักเรียนชายมีจำนวนคู่นอนโดยเฉลี่ยมากกว่านักเรียนหญิง และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวนคู่นอนโดยเฉลี่ยมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ตาราง 5.15 จำนวนคู่นอน (คน) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

จำนวนคู่นอน	มัธยมศึกษาปีที่ 5		อาชีวศึกษาระดับปวช.ปี 2		รวม
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	
ค่าเฉลี่ย	1.59	2.14	1.75	2.56	2.11
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.45	2.32	2.28	3.24	2.68
น้อยที่สุด	1	1	1	1	1
มากที่สุด	7	11	21	20	21

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 มีเพศสัมพันธ์กับคูรักหรือแฟน มีร้อยละ 4 ที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักกันคุ้นเคย อีกร้อยละ 2 มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน และอีกประมาณร้อยละ 1 มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับบุคคลที่ขายบริการทางเพศมีเพียง 2 รายเท่านั้น

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัย พบว่านักเรียนครึ่งหนึ่งใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด นักเรียนชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่านักเรียนหญิง และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้ถุงยางอนามัยในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ตาราง 5.16 เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด และการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด*	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม (n = 355)	
	หญิง (n = 29)		ชาย (n = 43)		หญิง (n = 141)		ชาย (n = 142)		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1. ประเภทคู่นอน										
คูรัก/แฟน	29	100.0	35	81.4	137	97.2	128	90.1	329	92.7
คนที่รู้จักกันคุ้นเคย	0	0	5	11.6	1	0.7	7	4.9	13	3.7
คนที่รู้จักกันผิวเผิน	0	0	2	4.7	2	1.4	3	2.1	7	2.0
คนขายบริการทางเพศ	0	0	0	0	0	0	2	1.4	2	0.6
เพศเดียวกัน	0	0	1	2.3	1	0.7	2	1.4	4	1.1
2. การใช้ถุงยางอนามัย										
ใช้	15	53.6	26	65.0	61	44.2	77	55.8	179	50.4
ไม่ใช้	13	46.4	14	35.0	77	55.8	61	44.2	176	49.6

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

เหตุผลของนักเรียนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายสุด มีดังต่อไปนี้

บทสัมภาษณ์ครั้งล่าสุด (น.๖๖)

ก็ไม่ได้คิดว่าจะมี, กลัวมันแตก, เบาไม่ไหว, เบาไม่ยอมใส่, เชื้ออะไร, ชี้อะไรกัน, ตั๋งใจ, ไม่ได้พก,
มีเพศสัมพันธ์เพียงแค่คนเดียว ไม่พกกับใคร, เบายังไม่เคยผ่านใคร, มันใจ, ไม่เคยใช้,
คุณต้องการทานยาคุมกำเนิด, ดิฉันมีแฟนเป็นผู้หญิงเหมือนกัน, ไม่ชอบ, ไม่ได้เตรียมไว้,
ตอนนั้นไม่มีถุงยางและมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว, มีเพศสัมพันธ์กันเป็นประจำ และทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้,
ไม่ถนัด, ไม่น่าจะอะไร, ไม่มีถุงยาง, รู้เท่าไม่ถึงการณ์, มีเพศสัมพันธ์หลังประจำเดือนวันสุดท้าย,
ไม่ถนัดและไม่สิ้น, เราไม่รู้ว่าจะผลที่ตามมาจะร้ายแรงสักแค่ไหน, เวลาแล้ว, มันไม่ชินในการใช้,
อยู่ด้วยกันแล้วและกินยาคุมตลอด, เพศเดียวกันไม่รู้จะใช้ทำไม, เพศเดียวกัน(ทอม),
แพ้ถุงยางอนามัย, แฟนปลอมขี้ขลาดแล้วไม่เคยพลาด, มันใจกับคู่รัก, มันไม่ได้ใจ,
ไม่คิดถึงชู้, มันใจในคนรัก เพราะคบกันมา 5 ปีแล้ว, ไม่รู้,
มีการป้องกันอย่างอื่น โดยการปลอมขี้ขลาด, ไม่กลัวว่าจะมีไร, ไม่กล้าชู้, ไม่คิดว่าเขาจะเอา, ไม่ชอบ,
ไม่ชอบใส่, ไม่ได้คิดจะทำ, ไม่ได้ชู้, ไม่ได้เตรียม, ไม่ได้เตรียมตัวมา, ไม่ได้เตรียมไว้, ไม่ได้อารมณ์,
ไม่ทราบ, ไม่ทราบเหมือนกัน, ไม่ทำใจ, ไม่มันใจ, ไม่มี, ไม่มีเงินชู้, ไม่รู้เพราะอะไร,
ไม่รู้เหมือนกัน, ไม่สามารถหาชู้ได้, ไม่อยากใช้, ลืม, ลืมชู้เพราะว่าไม่คิดว่าจะต้องทางเพศ,
ไวใจ, ไวใจเพราะอยาก, อาจไม่กล้าชู้



บทสัมภาษณ์รายสัปดาห์ (๗๗)

ก็เคยแค่ครั้งเดียวหลังจากครั้งแรกก็ยังไม่เคย, ก็ผมไม่มีเซ็กซ์ครับ, ไม่มัน, ซี้เกียจ, คบกันมานานแล้วแล้วไม่ได้โดนใคร, คิดว่าผู้หญิงไม่ปล่อยตัวไม่กลัวผู้ชายเลยไม่สวพยุ่งยาก, คิดว่าไม่จำเป็น, ฉุกเฉิน, เซ็กส์กัน ใช้เป็นบางครั้งหลังๆ ไม่ค่อยได้ใช้เลย, แฟนบอกว่าไม่ชอบให้ใส่ถุงยาง(ไม่รู้เพราะอะไร), ไม่กล้าซื้อ, ขอที่ รพ. ตอนนี้ไม่ได้ขอแล้ว, ใช้ไม่เป็น, ดูไม่จริงใจ, ปลอญนอก, พอใจ, เป็นช่วงนี้ระยะปลอดภัย, มีคู่นอนเพียงคนเดียว, ไม่ได้คิดล่วงหน้าว่าจะมีเพศสัมพันธ์, รู้สึกไม่สบายตัวครับ, อาจจะไปซื้อและก็สามารถช่วยในการมีเพศสัมพันธ์ มันไม่มัน ถ้าไม่ใส่ก็จะไม่มีเพศสัมพันธ์ได้ง่าย, มันใจอีกรอบ, คงไม่คิดหอรอกครั้งแรกมัน, มันกระตือรือร้น, มันกว่า, มันใจกับคู่รัก, มันใจในตัวของคู่รักว่าไม่มีเชื้อเอชไอวี, มันใจแฟน, มันใจว่าไม่ได้เป็นเอชไอวี, มันเป็นระยะปลอดภัย, มันแพง, มันไม่ได้เซ็กซี่ไว้, ไม่พร้อม, ไม่กลัวเพราะมันใจ, ไม่กล้าซื้อ, ไม่ชอบผิด, ไม่ได้ซื้อเซ็กซี่ไว้, ไม่ทราบ, ไม่ทัน, มีเพศสัมพันธ์บ่อยจะทำให้เป็นการสิ้นเปลืองเงินในการซื้อถุงยางอนามัย, ไม่ได้ซื้อ, ไม่มี, ไม่รู้, ไม่มีความชอบส่วนตัวคิดว่ามันใจในคู่นอน, ไม่สนุกเท่าไม่ใส่ถุงยาง, ไม่มีให้ใส่, ไม่รู้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนพอมีก็เลย...กันเลย ไม่อยาก, ไม่อยากใช้, ลืม...จำ, ไม่ได้ตั้งใจ, ลืมตัว, ลืมนึก, เวลากระชั้นชิด, ไวใจ, ไวใจกัน, ไวทางใจ, เสียเวลา, หาไม่ได้, เหนื่อยวัน, อารมณ์พาไป



เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน พบว่ามีประมาณร้อยละ 3 เท่านั้น นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่านักเรียนหญิง ส่วนในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนใกล้เคียงกัน

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง มีร้อยละ 33 หรือประมาณ 1 ใน 3 ที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง นักเรียนหญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่านักเรียนชาย และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ตาราง 5.17 สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

เพศสัมพันธ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม (n = 355)	
	หญิง (n = 29)		ชาย (n = 43)		หญิง (n = 141)		ชาย (n = 142)		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1. แลกสิ่งของ/เงิน*										
เคย	0	0	2	4.7	2	1.4	3	3.5	9	2.5
ไม่เคย	29	100.0	41	95.3	139	98.6	137	96.5	346	97.5
2. ใช้ถุงยางอนามัย**										
ใช้ทุกครั้ง	na	na	1	50.0	2	100.0	0	0	3	33.3
บางครั้ง	na	na	0	0	0	0	4	80.0	4	44.4
ไม่ใช้เลย	na	na	1	50.0	0	0	1	20.0	2	22.2

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

** คิดสัดส่วนเฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

การวินิจฉัยที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์จากกลุ่มนักเรียนทั้งหมด พบว่ากลุ่มนักเรียนที่มีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 4 เท่านั้น นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนน้อยกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

การปฏิบัติตนของกลุ่มนักเรียนที่มีอาการผิดปกติ พบว่าร้อยละ 24 มีการปฏิบัติตน

เมื่อพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติโดยการปรึกษากับผู้ปกครอง ปรึกษากับเพื่อน และไม่ทำอะไรเลย ในสัดส่วนที่เท่ากัน มีประมาณร้อยละ 10 ปรึกษากับคูรักหรือแฟน และไปรักษาที่สถานพยาบาล และอีกร้อยละ 7 ซ้ำถามารับประทานเอง

การปฏิบัติตนเมื่อสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันมากนัก ระหว่างนักเรียนหญิง-นักเรียนชาย และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ตาราง 5.18

การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

อาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม (n = 2,338)	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เคยมีอาการ	47	3.6	41	4.0	31	2.6	57	4.9	88	3.8
ไม่เคยมีอาการ	1,268	96.4	982	96.0	1,149	97.4	1,101	95.1	2,250	96.2
การปฏิบัติตน*										
ปรึกษาเพื่อน	1	10.0	6	30.0	6	16.2	8	40.0	21	23.9
ปรึกษาผู้ปกครอง/ญาติพี่น้อง	3	30.0	8	40.0	7	18.9	3	15.0	21	23.9
ปรึกษาแฟน/คูรัก	1	10.0	3	15.0	4	10.8	1	5.0	9	10.2
ซื้อยามากินเอง	2	20.0	0	0	4	10.8	0	0	6	6.8
ไปรักษาที่สถานพยาบาล	0	0	0	0	6	16.2	3	15.0	9	10.2
ไม่ได้ทำอะไรเลย	3	30.0	3	15.0	10	27.0	5	25.0	21	23.9

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปัญหาเรื่องเพศ

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในกลุ่มนักเรียนพบว่านักเรียนที่เคยมีปัญหาเรื่องเพศในรอบปีที่ผ่านมาไม่มากนัก ประมาณร้อยละ 4 นักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการมีปัญหาเรื่องเพศน้อยกว่านักเรียนชายเล็กน้อย (ร้อยละ 4 และ 5 ตามลำดับ) และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีปัญหาในเรื่องเพศในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 เล็กน้อยเช่นกัน

การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาลักษณะเรื่องเพศ เป็นการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เคยมีปัญหาลักษณะเรื่องเพศเท่านั้น พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ปรึกษากับครอบครัวเมื่อมีปัญหาลักษณะเรื่องเพศมากที่สุด รองลงมาปรึกษากับเพื่อน และปรึกษากับคู่อุปการะตามลำดับ มีนักเรียนประมาณ 10 ราย ที่มีปัญหาลักษณะเรื่องเพศแล้วเก็บไว้คนเดียว และไม่ทราบว่าจะปรึกษากับใคร

ตาราง 5.19 การปฏิบัติตนเมื่อมีปัญหาลักษณะเรื่องเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

ปัญหาเรื่องเพศ	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม (n = 2,338)	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1. เคยมี	17	2.5	26	5.1	32	5.0	23	4.5	98	4.2
2. การปฏิบัติตน*										
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ญาติพี่น้อง	2	11.8	12	46.2	13	40.6	13	56.5	40	40.8
เพื่อน	3	17.6	7	26.9	9	28.1	7	30.4	26	26.5
ครู/อาจารย์	0	0	1	3.8	0	0	0	0	1	1.0
แฟน/คู่อุปการะ	8	47.1	1	3.8	7	21.9	2	8.7	18	18.4
หาหนังสืออ่านเอง	1	5.9	0	0	0	0	0	0	1	1.0
ศูนย์ Hotline	0	0	1	3.8	0	0	0	0	1	1.0
เก็บไว้คนเดียว	3	17.6	3	11.5	3	9.4	0	0	9	9.2
ไม่ทราบจะปรึกษาใคร	0	0	1	3.8	0	0	1	4.3	2	2.0

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยมีปัญหาลักษณะเรื่องเพศ

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนประมาณร้อยละ 8 หรือมีจำนวน 180 ราย ไปตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนชายมีส่วนของการไปตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่านักเรียนหญิง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีส่วนของการไปตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา น้อยกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

สำหรับกลุ่มนักเรียนที่เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี พบว่ามีนักเรียนเกือบ 1 ใน 4 ที่ไม่ทราบผลการตรวจเลือด ในกลุ่มนักเรียนหญิงที่ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี มีส่วนของการไม่ทราบผลการตรวจเลือดมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อย สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีส่วนการไม่ทราบผลการตรวจเลือดมากกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตาราง 5.20

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

การตรวจเลือด เพื่อหาเชื้อเอชไอวี	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ตรวจเลือด										
ตรวจ	21	3.1	32	6.3	48	7.4	79	15.4	180	7.7
ไม่ตรวจ	651	96.9	478	93.7	597	92.6	433	84.6	2,159	92.3
2. ทราบผลการตรวจ*										
ทราบ	19	90.5	30	93.8	33	68.8	56	70.9	138	76.7
ไม่ทราบ	2	9.5	2	6.3	15	31.3	23	29.1	42	23.3

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

สัดส่วนของนักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่านักเรียนเกือบครึ่งหนึ่งเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ในกลุ่มนักเรียนชายมีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิง และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มากกว่ากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่แล้วเกือบร้อยละ 90 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นบางครั้งบางคราว มีนักเรียนร้อยละ 3 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน มีนักเรียนประมาณร้อยละ 9 ดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ค่อนข้างบ่อย นักเรียนชายมีสัดส่วนของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ และทุกวันมากกว่านักเรียนหญิง ส่วนนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำและทุกวันในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

สำหรับปริมาณของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในกลุ่มนักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกวัน พบว่านักเรียนกลุ่มนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนในการกรอกตัวเลขบ้าง เพราะว่ามีผู้ตอบว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์วันละ 18, 30 หรือ 36 แก้ว ซึ่งเป็นตัวเลขที่นอกเหนือจากค่าปกติ เมื่อตัดทั้ง 3 คำตอบออกไป พบว่านักเรียนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยวันละ 6 แก้ว/กระป๋อง (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.1)

ตาราง 5.21 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ										
การดื่มเครื่องดื่ม* ที่มีแอลกอฮอล์	มัธยมศึกษาปีที่ 5 (n = 514)				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 (n = 634)				รวม (n = 1,148)	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1. เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	243	36.2	271	53.0	307	47.6	327	63.7	1,148	49.0
2. ความถี่										
ทุกวัน	1	0.4	10	3.7	1	0.3	17	5.2	29	2.5
2-3 ครั้ง/สัปดาห์	3	1.2	15	5.5	19	6.2	30	9.2	67	5.8
สัปดาห์ละครั้ง	3	1.2	13	4.8	3	1.0	18	5.5	37	3.2
แล้วแต่โอกาส	107	44.0	126	46.5	150	48.9	137	41.9	520	45.3
นานๆ ครั้ง	129	53.1	107	39.5	134	43.6	125	38.2	495	43.1

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด

พฤติกรรมการใช้สารเสพติดที่เป็นประเภติดึกขุมหาย เช่น กัญชา/ยาบ้า/เฮโรอีน/โคเคน หรืออื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนประมาณร้อยละ 8 เคยเสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนชายมีส่วนการเสพสารเสพติดมากกว่านักเรียนหญิง และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีส่วนการเสพสารเสพติดมากกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

ความถี่ของการเสพสารเสพติดของกลุ่มนักเรียนที่เคยเสพสารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นการทดลองเสพยาเสพติด ประมาณ 1 ใน 4 เสพสารเสพติดแล้วแต่โอกาส มีประมาณร้อยละ 7 ที่

เสพสารเสพติดทุกวัน สำหรับการเสพสารเสพติดโดยวิธีการฉีดเข้าเส้นโลหิตดำมีไม่ถึง 1% ของนักเรียนทั้งหมด และในกลุ่มนักเรียนที่เคยใช้เข็มฉีดยาเกือบครึ่งหนึ่งใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น

อายุโดยเฉลี่ยที่นักเรียนเริ่มใช้เข็มฉีดยาเพื่อเสพสารเสพติด พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 14 ปี อายุน้อยที่สุดที่เริ่มใช้เข็มฉีดยาเพื่อเสพสารเสพติดเท่ากับ 10 ปี และอายุที่มากที่สุดเท่ากับ 17 ปี ส่วนการทำความสะอาดอุปกรณ์ในกลุ่มนักเรียนที่เคยใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น พบว่านักเรียนทั้งหมด ($n = 5$ ราย) มีการทำความสะอาดอุปกรณ์เป็นบางครั้งบางคราว และบางคนไม่มีการทำความสะอาดจึงเป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอย่างมาก

ตาราง 5.22

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และความถี่ในการใช้สารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ

พฤติกรรม การใช้สารเสพติด	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เคยเสพสารเสพติด	11	1.6	44	8.6	50	7.8	90	17.5	195	8.3
2. ความถี่*										
ทุกวัน	0	0	5	11.4	4	8.0	4	4.4	13	6.7
แล้วแต่โอกาส	4	36.4	9	20.5	9	18.0	30	33.3	52	26.7
ทดลองเสพ	7	63.6	30	68.2	37	74.0	56	62.2	130	66.7
3. เคยเสพสารเสพติด โดยใช้เข็มฉีดยา**	0	0	7	1.4	2	0.3	2	0.4	11	0.5

ตาราง 5.22 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และความถี่ในการใช้สารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 จำแนกตามเพศ (ต่อ)

พฤติกรรม การใช้สารเสพติด	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4. อายุเริ่มแรกใช้ เข็มฉีดยา***										
ค่าเฉลี่ย	na		14.0		12.5		14.5		13.8	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	na		3.1		3.5		0.7		2.7	
5. ใช้อุปกรณ์ร่วมกับ บุคคลอื่น***	0	0	2	28.6	2	100.0	1	50.0	5	45.5
6. การทำความสะอาด****										
ทุกครั้ง	na	na	0	0	0	0	0	0	0	0
บางครั้ง	na	na	0	0	1	50.0	1	100.0	2	40.0
ไม่ได้ทำความสะอาด	na	na	2	100.0	1	50.0	0	0	3	60.0

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยเสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา

** คิดสัดส่วนในกลุ่มนักเรียนทั้งหมด

*** เฉพาะนักเรียนที่เคยใช้เข็มฉีดยา

**** เฉพาะนักเรียนที่เคยใช้อุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น

เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และใช้สารเสพติด

เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67 หรือประมาณ 1 ใน 3 ไม่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่มากนัก คือ ร้อยละ 18 เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง จำแนกตามเพศแล้ว พบว่านักเรียนหญิงมีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยกว่า

นักเรียนชาย ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งใกล้เคียงกัน

เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่านักเรียนมีเพศสัมพันธ์หลังการเสพยาเสพติดไม่มากนัก ประมาณร้อยละ 20 สัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนชาย-นักเรียนหญิงไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่านักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ในกลุ่มนักเรียนที่มี

เพศสัมพันธ์หลังการเสพยาเสพติดมีสัดส่วนของ การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งร้อยละ 22 เมื่อ วิเคราะห์สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่มนักเรียนหญิง-นักเรียนชาย นักเรียนหญิง มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่า นักเรียนชาย ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่แตกต่างกันมากนัก

ตาราง 5.23 การมีเพศสัมพันธ์หลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และหลังเสพยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2

เพศสัมพันธ์	มัธยมศึกษาปีที่ 5				อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2				รวม	
	หญิง		ชาย		หญิง		ชาย			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เคยมีเพศสัมพันธ์ หลังดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์* (n = 256)	3	17.6	8	24.2	35	35.7	39	36.1	85	33.2
2. การใช้ถุงยาง อนามัย**										
ทุกครั้ง	1	33.3	1	12.5	4	11.4	9	23.1	15	17.6
บางครั้ง	1	33.3	3	37.5	12	34.3	20	51.3	36	42.4
ไม่ใช้เลย	1	33.3	4	50.0	19	54.3	10	25.6	34	40.0
3. เคยมีเพศสัมพันธ์หลัง เสพสารเสพติด*** (n = 92)	1	9.1	3	23.1	5	17.9	9	18.0	18	19.6
4. การใช้ถุงยาง อนามัย****										
ทุกครั้ง	1	100.0	0	0	1	20.0	2	22.2	4	22.2
บางครั้ง	0	0	1	33.3	0	0	4	44.4	5	27.8
ไม่ใช้เลย	0	0	2	66.7	4	80.0	3	33.3	9	50.0

หมายเหตุ: * เฉพาะนักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 1 เดือนที่ผ่านมา และเคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา


** เฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

*** เฉพาะนักเรียนที่เคยเสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา และเคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

**** เฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด

6

અનુકૂળતા નોંધ



6

บทสรุป/ผลการสำรวจ

การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการ (พ.ศ. 2551 เป็นการสำรวจครั้งที่ 7) ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สถาบัน มีจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 30,292 ราย พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัย โดยดำเนินการสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการ มหิดล ได้ร่วมกับกองควบคุมโรคเอดส์ สำนัก ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มตัวอย่างต่างๆ จำนวน 11 อนามัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการมาเป็น กลุ่ม ดังรายละเอียดในตาราง 6.1 เวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน

ตาราง 6.1

จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ในปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2551

กลุ่มตัวอย่าง	ปี พ.ศ.						
	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5	747	846	1,125	1,065	1,019	1,071	1,183
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปี 2	763	844	1,209	1,041	906	1,041	1,158
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2	-	-	-	-	-	1,220	1,250
คนงาน (2545-2546) / พนักงานในโรงงาน (2547) / คนงานในสถานประกอบการ (2549, 2551)	681	711	1,009	-	1,011	-	1,022
ชายที่มารับการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร	354	354	518	-	-	-	-
หญิงบริการทางเพศ	346	359	-	501	-	500	-
แม่บ้าน	346	353	508	-	-	-	-
ผู้ติดยาเสพติด	373	356	-	376	-	314	-
แรงงานต่างด้าว	-	-	-	552	-	527	-
ชายรักชาย	-	-	-	498	-	-	-
ประชากรทั่วไป	-	-	-	-	1,089	-	1,146
รวม	3,610	3,823	4,369	4,033	4,025	4,673	5,759

ผลสรุปของการสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในปี พ.ศ. 2551 มีด้วยกัน 5 กลุ่ม จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 5,759 ราย เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงมีจำนวนมากกว่าเพศชาย

ตาราง 6.2		จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังในปี พ.ศ. 2551 จำแนกตามเพศ		
กลุ่มที่	กลุ่มตัวอย่าง	หญิง	ชาย	รวม
1	นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2	603	647	1,250
2	นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5	672	511	1,183
3	นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	645	513	1,158
4	คนงานในสถานประกอบการ	510	512	1,022
5	ประชากรทั่วไป	589	557	1,146
	รวมทั้งหมด	3,019	2,740	5,759

กลุ่มตัวอย่างเมื่อจำแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ส่วนกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป มีอายุเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มนักเรียนอย่างชัดเจน

ดังนั้นในการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี จึงต้องคำนึงถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายด้วยว่า แต่ละกลุ่มเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่รุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อให้การนำเสนอได้เห็นข้อแตกต่างจะเป็นการนำเสนอผลการสำรวจแยกในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง และจำแนกตามเพศด้วย

ตาราง 6.3		อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2551			
กลุ่มที่	กลุ่มตัวอย่าง	อายุเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	อายุน้อยที่สุด	อายุมากที่สุด
1	นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2	13.8	0.6	12	17
2	นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5	16.7	0.8	15	22
3	นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	16.8	1.0	15	22
4	คนงานในสถานประกอบการ	29.5	8.1	15	49
5	ประชากรทั่วไป	31.5	10.2	15	49

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ พบว่ากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างชัดเจนในทุกข้อ รองลงมา คือ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป ตามลำดับ

ความรู้เกี่ยวกับพาหะนำเชื้อเอชไอวีสู่คน โดยยุง และการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติด

เชื้อเอชไอวีสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้ ซึ่งเป็นเรื่องของช่องทางการติดต่อโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ยังมีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างน้อย ส่วนในเรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ให้ปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัย การมีคู่นอนคนเดียว และคนที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วยังสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงได้เป็นเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ค่อนข้างดี

ตาราง 6.4 ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง ในภาพรวม

ข้อที่	ข้อความ	มัธยมศึกษาปีที่ 2	มัธยมศึกษาปีที่ 5	อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	คนงานในสถานประกอบการ	ประชากรทั่วไป
1	การใช้ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้	83.8	91.9	89.0	92.5	90.1
2	การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่ใช่เอชไอวี และคู่นอนนั้นไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	61.0	71.2	63.0	79.1	81.6
3	บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้	43.0	73.1	63.0	73.0	74.3
4	ยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้	45.0	52.0	45.8	58.2	65.0
5	กินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	34.1	51.2	43.4	77.3	72.6

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เมื่อจำแนกในกลุ่มผู้หญิง พบว่าในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้สามารถตอบได้ถูกต้องระหว่างร้อยละ 80 – 91 การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี และคู่นอนนั้นไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 60 – 83 บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้ ร้อยละ 50 – 78 ยุ้งเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้ ร้อยละ 43 – 66 และการกินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้ ร้อยละ 35 – 79

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เมื่อจำแนกในกลุ่มผู้ชาย พบว่าในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้สามารถตอบได้ถูกต้องระหว่างร้อยละ 84 - 95 การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี และคู่นอนนั้นไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 59 - 80 บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้ ร้อยละ 36 - 71 ยุ้งเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้ ร้อยละ 46 - 64 และการกินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้ ร้อยละ 33 – 76

ตาราง 6.5

ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง
จำแนกตามเพศ


ข้อที่	ข้อความ	มัธยมศึกษา ปีที่ 2		มัธยมศึกษา ปีที่ 5		อาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2		คนงาน ในสถาน ประกอบการ		ประชากร ทั่วไป	
		หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
1	การใช้ถุงยางอนามัยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้	83.3	84.4	90.9	93.2	86.7	92.0	80.4	94.5	89.5	90.8
2	การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีและคู่นอนนั้นไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	63.0	59.2	69.2	73.8	59.1	67.8	80.8	77.3	83.4	79.7
3	บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีได้	50.2	36.3	74.6	71.2	63.9	61.8	74.9	71.1	78.4	70.0
4	ยุ้งเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีได้	43.6	46.2	51.2	53.0	42.6	49.7	54.3	62.1	66.0	63.9
5	กินอาหารร่วมกันสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	35.0	33.2	52.1	50.1	42.3	44.8	78.8	75.8	73.7	71.5

ความสามารถของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ (ตอบถูกข้อ 1 – 5) พบว่า กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ

ค่อนข้างชัดเจนรองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไปตามลำดับ

แผนภาพ 6.1

ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ
ในภาพรวม




ในกลุ่มผู้หญิง พบว่าสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อ (ข้อที่ 1 – 5) อยู่ระหว่างร้อยละ 8 – 41 กลุ่มนักเรียนหญิงสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อน้อยกว่าในกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และประชากรทั่วไปอย่างชัดเจน

ส่วนในกลุ่มผู้ชาย พบว่าสามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อ อยู่ระหว่างร้อยละ 6 – 37 กลุ่มประชากรทั่วไป และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อมากกว่ากลุ่มนักเรียนอย่างชัดเจน

แผนภาพ 6.2

ร้อยละของผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อ
จำแนกตามเพศ




เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

การมีประสบการณ์ทางเพศในแต่ละกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 มีประสบ-

การณ์ทางเพศประมาณ 1 ใน 3 ส่วนในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศร้อยละ 10 และกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีร้อยละ 6 ที่เคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์แล้ว

แผนภาพ 6.3

ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในภาพรวม




เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มผู้ชายมีประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มผู้หญิงในทุกกลุ่มตัวอย่าง ในกลุ่มนักเรียนชาย เคยมีประสบการณ์ทางเพศมากกว่านักเรียนหญิง

ประมาณ 2 เท่า กลุ่มประชากรทั่วไปเพศหญิง - เพศชายมีประสิทธิภาพทางเพศไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ เพศหญิงมีประสิทธิภาพทางเพศน้อยกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศชายเล็กน้อย

แผนภาพ 6.4

ประสิทธิภาพการมีเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ



อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ากลุ่มนักเรียน มีอายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไปค่อนข้างชัดเจน แต่ในภาพรวมแล้ว อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของตัวอย่างทั้งหมดน้อยกว่า

20 ปี กลุ่มตัวอย่างมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยที่สุดประมาณ 8 - 9 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามควรคำนึงถึงอายุของกลุ่มนักเรียนกับกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไปมีความแตกต่างกันมากด้วย

ตาราง 6.6

อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในภาพรวม

กลุ่มที่	กลุ่มตัวอย่าง	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	อายุน้อยที่สุด	อายุมากที่สุด
1	นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2	12.8	1.2	8	15
2	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	15.2	1.5	9	25
3	นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	15.3	1.3	8	20
4	คนงานในสถานประกอบการ	19.2	3.5	9	45
5	ประชากรทั่วไป	19.3	4.2	9	40


กลุ่มตัวอย่างที่เคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี พบว่ามีสัดส่วนระหว่างร้อยละ 1 – 21 สำหรับกลุ่มผู้หญิง และร้อยละ 8 – 22 ในกลุ่มผู้ชาย ไม่นับรวมกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีอยู่แล้ว ในกลุ่มคนงานในสถานประกอบการและกลุ่มประชากรทั่วไป มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี น้อยกว่าในกลุ่มนักเรียน

ค่อนข้างชัดเจน

โดยสรุปแล้ว ผู้ชายจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี ในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มผู้หญิง ยกเว้นในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้หญิงมีสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี มากกว่าผู้ชาย

แผนภาพ 6.5

การมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี จำแนกตามเพศ



คู่เพศสัมพันธ์ในครั้งแรก พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรัก/แฟนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 91 – 97 รองลงมาคือ ผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคย ร้อยละ 2 – 5 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่มีคู่นอนครั้งแรกที่เป็นผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผิน และผู้ชายบริการทางเพศ ส่วนคู่นอนครั้งแรกที่เป็นเพศเดียวกัน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

สำหรับกลุ่มผู้ชายพบว่ามีคู่นอนครั้งแรกที่เป็นคูรักหรือแฟน ร้อยละ 67 – 86 ผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคย ร้อยละ 5 – 20 ผู้หญิงที่รู้จักกัน

ผิวเผิน ร้อยละ 1 – 6 หญิงบริการทางเพศ ร้อยละ 2 – 10 ยกเว้นกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่มีคู่นอนเป็นหญิงบริการทางเพศในครั้งแรก และผู้ชายด้วยกันร้อยละ 1 – 9

โดยสรุปแล้ว พบว่ากลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกกับคูรักหรือแฟน ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากลุ่มผู้หญิงค่อนข้างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามประสพการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของผู้ชายก็ยังเป็นคูรักหรือแฟนมากกว่าผู้หญิงคนอื่นๆ หรือว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศ ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยมาก

ตาราง 6.7

การมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก จำแนกตามเพศ

กลุ่ม ครั้งแรก	มัธยมศึกษา ปีที่ 2		มัธยมศึกษา ปีที่ 5		อาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2		คนงานในสถาน ประกอบการ		ประชากร ทั่วไป	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	90.5	67.3	95.6	78.7	91.4	86.2	95.6	72.5	97.3	67.9
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	4.8	20.0	4.4	10.7	5.2	4.8	2.6	15.0	1.5	16.6
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	0	1.8	0	4.0	1.1	2.1	1.3	5.6	0.8	4.7
ผู้ชายบริการทางเพศ	0	1.8	0	0	0	4.3	0.3	6.3	0	9.5
เพศเดียวกัน	4.8	9.1	0	6.7	2.3	2.7	0.3	0.2	0.4	1.1


การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อยู่ระหว่างร้อยละ 29 – 53 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มประชากรทั่วไป กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 และกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มผู้ชายพบว่า มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ระหว่างร้อยละ 38 – 49 กลุ่มประชากรทั่วไปมี

สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งแรกน้อยที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเท่ากัน ส่วนกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากที่สุด

โดยสรุปแล้วผู้ชายมีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกมากกว่าในกลุ่มผู้หญิง ยกเว้นในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้หญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่าในกลุ่มผู้ชาย

แผนภาพ 6.6

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก
จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทคู่นอนของกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีคู่นอนเป็นคู่อริหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 93 - 99 มีคู่นอนเป็นผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคยร้อยละ 2 - 11 มีคู่นอนเป็นผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผิน ร้อยละ 1 - 10 และมีคู่นอนเป็นผู้หญิงด้วยกันร้อยละ 1 - 16

สำหรับกลุ่มผู้ชาย พบว่ามีคู่นอนในรอบปีเป็นคู่อริหรือแฟน ร้อยละ 73 - 93 เป็นผู้หญิงที่

รู้จักกันคุ้นเคยร้อยละ 15 - 41 เป็นผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน ร้อยละ 6 - 22 เป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศ ร้อยละ 2 - 11 และเป็นผู้ชายด้วยกัน ร้อยละ 0.2 - 20

โดยสรุปแล้วผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่นอนที่ไม่ใช่คู่อริหรือแฟนในสัดส่วนมากกว่ากลุ่มผู้หญิง และผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่นอนหลายๆ ประเภทมากกว่ากลุ่มผู้หญิงค่อนข้างชัดเจน

ตาราง 6.8

ประเภทของคู่นอนสำหรับเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

ประเภทคู่นอน	คู่อริ/แฟน		บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย		บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน		ผู้ชายบริการทางเพศ		เพศเดียวกัน	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2	94.7	84.8	10.5	41.3	10.5	21.7	0	8.7	15.8	19.6
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5	93.1	83.3	6.9	32.6	6.9	20.9	0	2.3	6.9	9.3
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	95.0	93.0	10.0	30.3	7.1	11.3	3.5	7.0	9.9	10.6
คนงานในสถานประกอบการ	95.6	72.5	2.6	15.0	1.3	5.6	0.3	6.3	0.3	0.2
ประชากรทั่วไป	98.9	91.3	2.1	24.3	1.6	14.5	0.5	10.8	0.9	3.6

การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะนำเสนอในส่วนที่มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง กับคู่นอนประเภทต่างๆ เท่านั้น

ในกลุ่มผู้หญิง พบว่ามีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อริ/แฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 11 - 39 กับผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคย ร้อยละ 26 - 100 กับผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผิน ร้อยละ 0 - 57 และกับผู้หญิงด้วยกัน ร้อยละ 0 - 50 กลุ่ม

คนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยกว่ากลุ่มนักเรียนค่อนข้างชัดเจน และมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อริหรือแฟนน้อยกว่าคู่นอนคนอื่นๆ

ในกลุ่มผู้ชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อริหรือแฟน ร้อยละ 14 - 26 กับผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคย ร้อยละ 35 - 56 กับผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน ร้อยละ 50 - 57 กับผู้หญิง

ชายบริการทางเพศร้อยละ 70 – 100 กับผู้ชายด้วยกัน ร้อยละ 11 – 53 สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคูรัก/แฟนน้อยกว่าคู่นอนคนอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน

โดยสรุปแล้วผู้หญิงมีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์ในรอบปี

น้อยกว่าผู้ชาย กลุ่มนักเรียนมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่าในกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป นอกจากนี้มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทคูรัก/แฟนน้อยกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ อย่างชัดเจน

ตาราง 6.9

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ

ประเภทคู่นอน	คูรัก/แฟน		บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย		บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน		ผู้ชายบริการทางเพศ		เพศเดียวกัน	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2	38.9	25.6	50.0	36.8	0	50.0	na	75.0	0	22.2
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5	33.0	14.3	100.0	42.9	50.0	55.6	0	100.0	50.0	25.0
นักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2	18.7	19.7	35.7	34.9	10.0	56.3	40.0	70.0	14.3	33.3
คนงานในสถานประกอบการ	10.8	20.3	26.1	54.5	50.0	52.9	0	83.8	0	11.1
ประชากรทั่วไป	12.2	19.0	33.3	56.4	57.1	56.7	50.0	80.0	25.0	53.3

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

คู่นอนครั้งล่าสุดในกลุ่มผู้หญิง พบว่าผู้หญิงเกือบทั้งหมดมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟน ส่วนคู่นอนคนอื่น ๆ มีสัดส่วนที่น้อยมาก สำหรับในกลุ่มผู้ชายพบว่า มีคู่นอนครั้งล่าสุดเป็นคูรักหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 74 – 90 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คูรักหรือแฟนมาก

ที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มประชากรทั่วไป กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ตามลำดับ สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับผู้หญิงชายบริการทางเพศมีสัดส่วนที่น้อยมาก

ตาราง 6.10


ประเภทของคู่นอนสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด จำแนกตามเพศ

ประเภทคู่นอน	คู่รัก/แฟน		บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย		บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน		ผู้ขายบริการทางเพศ		เพศเดียวกัน	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2	94.7	73.9	0	15.2	0	2.2	0	0	5.3	8.7
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5	100.0	81.4	0	11.6	0	4.7	0	0	0	2.3
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	97.2	90.1	0.7	4.9	1.4	2.1	0	1.4	0.7	1.4
คนงานในสถานประกอบการ	98.6	88.9	0	7.2	0	2.3	0.3	1.4	1.1	0.2
ประชากรทั่วไป	98.9	86.5	0.2	7.0	0	1.9	0.2	3.4	0.7	1.2

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป ที่เป็นผู้หญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดน้อยที่สุด และกลุ่มนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดมากที่สุด ในภาพรวมแล้วมีสัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุด อยู่ระหว่างร้อยละ

21 – 65 ในกลุ่มผู้หญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุด อยู่ระหว่างร้อยละ 21 – 63 และในกลุ่มผู้ชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 33 – 65 กลุ่มผู้ชายมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดมากกว่ากลุ่มผู้หญิง ยกเว้นในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนหญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดมากกว่านักเรียนชาย

แผนภาพ 6.7

สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด
จำแนกตามเพศ

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาเท่านั้น พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนร้อยละ 1 – 3 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน


สำหรับกลุ่มผู้ชายพบว่ามีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน ร้อยละ 2 – 13 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 กลุ่ม

ประชากรทั่วไป และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการตามลำดับ

โดยสรุปแล้วผู้ชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน มากกว่ากลุ่มผู้หญิง กลุ่มนักเรียนมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป เฉพาะกลุ่มผู้ชายเท่านั้น ส่วนกลุ่มผู้หญิง กลุ่มคนงานในสถานประกอบการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่ากลุ่มนักเรียน อย่างไรก็ตามการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมีสัดส่วนไม่มากนัก คือ ประมาณร้อยละ 1 – 13 เท่านั้น

แผนภาพ 6.8

สัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน
จำแนกตามเพศ




สัดส่วนของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน คิดเฉพาะในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนเท่านั้น พบว่ามี

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งอยู่ระหว่างร้อยละ 20 – 100 ผู้หญิงมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่ากลุ่มผู้ชายเล็กน้อย ยกเว้นกลุ่มประชากรทั่วไป

แผนภาพ 6.9

สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง จำแนกตามเพศ



การตีความ/อภิปรายว่านี่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา คิดสัดส่วนกับกลุ่มตัวอย่างทุกคน (ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีเพศสัมพันธ์เท่านั้น) พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ระหว่างร้อยละ 0.2 – 7 โดยที่กลุ่มคนงานในสถานประกอบการมีสัดส่วนของอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มประชากรทั่วไป กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 และกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามลำดับ


สำหรับกลุ่มผู้ชายพบว่ามีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่

ระหว่างร้อยละ 1 – 5 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มประชากรทั่วไป ส่วนกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้อยมาก

โดยภาพรวมแล้ว กลุ่มผู้ชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่ากลุ่มผู้หญิง และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ

แผนภาพ 6.10

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำแนกตามเพศ



การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี


การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีอยู่ระหว่างร้อยละ 2 – 36 และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป มีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มนักเรียนอย่างชัดเจน

และกลุ่มผู้ชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มผู้หญิง

กลุ่มผู้หญิงมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมาระหว่างร้อยละ 2 – 30 ส่วนในกลุ่มผู้ชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีระหว่างร้อยละ 5 - 36

แผนภาพ 6.11

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ



พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 29 – 52 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการมีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมามากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2 กลุ่มประชากรทั่วไป กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามลำดับ


กลุ่มผู้ชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาอยู่ระหว่าง

ร้อยละ 35 – 81 โดยที่กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ มีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมามากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มประชากรทั่วไป กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาระดับปวช. ปี 2 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามลำดับ

โดยสรุปแล้วกลุ่มผู้ชายมีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มากกว่ากลุ่มผู้หญิงอย่างชัดเจน กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ และกลุ่มประชากรทั่วไป มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มากกว่ากลุ่มนักเรียน

แผนภาพ 6.12

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
จำแนกตามเพศ



พฤติกรรมการเสพยาเสพติด

พฤติกรรมการเสพยาเสพติด หมายถึง การเสพยาเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาบ้า เฮโรอีน โคเคน กัญชา เป็นต้น ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 1 – 19 กลุ่มผู้ชาย มีการเสพยาเสพติดมากกว่ากลุ่มผู้หญิง


กลุ่มผู้หญิงมีการเสพยาเสพติดร้อยละ 1 – 8 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 เป็นกลุ่มที่มีการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มประชากรทั่วไป

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มผู้ชายพบว่าการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8 – 19 กลุ่มประชากรทั่วไป มีการเสพยาเสพติดมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามลำดับ

แผนภาพ 6.13

พฤติกรรมการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ



วิธีการเสพยาเสพติดโดยการฉีดสารเสพติดเข้าเส้นโลหิตดำ คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่เคยเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีประมาณ 1% ที่เสพยาเสพติดโดยการฉีด กลุ่มผู้ชายมีการเสพยาเสพติดโดยวิธีการฉีดมากกว่าในกลุ่มผู้หญิง

การใช้อุปกรณ์การเสพยาเสพติด ได้แก่ กระบอกฉีดยา และเข็มฉีดยาร่วมกับบุคคลอื่น

พบว่ากลุ่มนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 มีการเสพยาเสพติดโดยใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับบุคคลอื่นมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

กลุ่มที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับบุคคลอื่นมีประมาณครึ่งหนึ่งที่มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนำมาใช้ต่อ จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการสำรวจในรอบปี พ.ศ. 2551 มีผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการเสพยาเสพติด จำนวน

9 รายเท่านั้น

โดยสรุปแล้วความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีโดยการเสพสารเสพติด มีสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงด้าน

พฤติกรรมทางเพศ ซึ่งผลการเฝ้าระวังในทุกๆ ปีชี้ชัดว่าการติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าร้อยละ 80 จากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย (ไม่ใช่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง)

ตาราง 6.11

วิธีการเสพสารเสพติด ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

กลุ่มตัวอย่าง	เสพโดยใช้เข็ม		ร่วมกับบุคคลอื่น*		ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้ง**	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2	0	0.9	na	33.3	na	50.0
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5	0	1.4	na	28.6	na	0
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2	0.3	0.4	100.0	50.0	0	0
คนงานในสถานประกอบการ	0.4	1.6	50.0	50.0	0	50.0
ประชากรทั่วไป	0	1.4	na	62.5	na	40.2

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนเฉพาะกลุ่มที่เคยเสพสารเสพติดโดยการฉีดเท่านั้น

** คิดสัดส่วนเฉพาะกลุ่มที่เคยใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับบุคคลอื่น

กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 18 – 49 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ รองลงมาคือ กลุ่มประชากรทั่วไป กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 มีสัดส่วนเท่ากัน ส่วนกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยที่สุด

สำหรับกลุ่มผู้ชาย พบว่ามีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณร้อยละ 24 – 64 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาก

ที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มประชากรทั่วไป กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช.ปี 2 และกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามลำดับ ในภาพรวมกลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าในกลุ่มผู้หญิง และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ชัดเจน

เพศสัมพันธ์หลังเสพสารเสพติด ในกลุ่มผู้หญิงประมาณร้อยละ 18 – 100 ยกเว้นในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่มีนักเรียนที่เสพสารเสพติดแล้วมีเพศสัมพันธ์ กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์หลังเสพสารเสพติดร้อยละ 18 – 41 ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนมากนักว่า กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์

หลังเสพยาเสพติดมากกว่ากลุ่มผู้หญิง

สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มผู้หญิง ยกเว้นกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่านักเรียนชาย และสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดอยู่ระหว่างร้อยละ 14-

33 ยกเว้นกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง 100% และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการไม่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเลย

โดยภาพรวมแล้ว เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และหลังเสพยาเสพติด มีสัดส่วนไม่สูงมากนัก และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมีสัดส่วนไม่สูงมากนักเช่นกัน

ตาราง 6.12 การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และหลังเสพยาเสพติด


กลุ่มตัวอย่าง	เพศสัมพันธ์				ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง			
	หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์*		หลังเสพยาเสพติด**		เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์		เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2	35.7	52.6	0	21.4	20.0	30.0	na	33.3
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5	17.6	24.2	100.0	23.1	33.3	12.5	100.0	0
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปี 2	35.7	36.1	17.9	18.0	11.4	23.1	20.0	22.2
คนงานในสถานประกอบการ	48.5	64.0	20.0	40.6	11.5	18.1	0	14.3
ประชากรทั่วไป	38.7	53.4	46.4	36.2	11.9	24.8	23.1	23.7

หมายเหตุ: * คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

** คิดสัดส่วนเฉพาะในกลุ่มที่มีการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

๗

แนวโน้มนวัตกรรม ที่สัมพันธ์กับการศึกษาของไอวี่



๗

แนวโน้มพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี

ในบทนี้เป็นการติดตามแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 คนงานในสถานประกอบการ และประชากรทั่วไป ของกรุงเทพมหานคร

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ได้ติดตามแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และเฝ้าติดตามต่อเนื่องเป็นรอบที่ 7 ส่วนในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เริ่มติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ

การติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และเฝ้าติดตามต่อเนื่องเป็นรอบที่ 2 สำหรับกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ เริ่มติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และเฝ้าติดตามต่อเนื่องมาอีก 3 ปี จนปี พ.ศ. 2548 ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการทุก 2 ปี กลุ่มประชากรทั่วไป ได้เริ่มติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และเฝ้าติดตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีทุก 2 ปี

แนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มคนงานในสถานประกอบการในรอบ 5 ปี

อายุของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการในแต่ละปีมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547 ได้กำหนดอายุผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วง 15 – 29 ปี ส่วนในปี

พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2551 ได้ขยายกลุ่มอายุจาก 15 – 29 ปี เป็น 15 – 49 ปี ดังนั้นอายุเฉลี่ยของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการจึงมีความแตกต่างกัน

ตาราง 7.1

อายุเฉลี่ยของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่สำรวจในแต่ละปี

อายุ	พ.ศ. 2545	พ.ศ. 2546	พ.ศ. 2547	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2551
อายุเฉลี่ย	24.2	24.4	22.9	28.1	29.5
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	3.1	2.9	3.2	7.2	8.1
อายุน้อยที่สุด	15	18	15	15	15
อายุมากที่สุด	29	29	29	49	49

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

กลุ่มคนงานในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์มาก่อน พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงมีแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้ชายที่เป็นคู่อริหรือแฟนในปี พ.ศ. 2551 ลดลงเล็กน้อย แต่สัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่อริหรือแฟนไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละปี กล่าวคือ อยู่ในระหว่างร้อยละ 95 – 100 (ในปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2547 ไม่ได้ถามคู่คนที่เคยเป็นบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย) ส่วนกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่อริหรือแฟน เพิ่ม

ขึ้น เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายกับคู่อริหรือแฟน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่างร้อยละ 68 – 79 เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่อริหรือแฟนของคนงานในสถานประกอบการหญิงมีสัดส่วนมากกว่าคนงานในสถานประกอบการชาย

สำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของคนงานในสถานประกอบการชายกับหญิงขายบริการทางเพศไม่มากนัก อยู่ระหว่างร้อยละ 4-8 เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันมีประมาณร้อยละ 1 ในรอบ 5 ปี

ตาราง 7.2

แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลประเภทต่างๆ

คู่เพศสัมพันธ์	พ.ศ. 2545		พ.ศ. 2546		พ.ศ. 2547		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คู่อริ/แฟน	95.1	72.6	99.6	75.8	97.9	78.6	97.4	68.1	95.6	72.5
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	na	na	na	na	na	na	1.2	16.9	2.6	15.0
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	1.0	17.4	0.4	15.9	1.2	16.4	0.5	7.6	1.3	5.6
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	1.5	0.7	na	na	0.9	1.0	0.9	1.2	0.3	0.2
ผู้ขายบริการ	na	8.2	na	5.9	na	3.9	na	6.3	na	6.3

การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยอยู่ระหว่างร้อยละ 21 – 30 ในปี พ.ศ. 2547 กับปี พ.ศ. 2551 มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกสูงที่สุด


สำหรับกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ระหว่างร้อยละ 37 – 46

ในปี พ.ศ. 2546 มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยที่สุด ส่วนในปีอื่นๆ มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกใกล้เคียงกัน

อย่างไรก็ตาม จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าคนงานในสถานประกอบการหญิง มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยกว่าคนงานในสถานประกอบการชาย ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

แผนภาพ 7.1

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก



เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

การสำรวจพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาในรอบ 3 ปีแรก (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547) ไม่ได้แยกประเภทคู่นอนที่เป็นบุคคลรู้จักกันคุ้นเคย จึงมีประเภทคู่นอนอยู่ 4 ประเภทเท่านั้น ส่วนในปี พ.ศ. 2549 กับปี พ.ศ. 2551 มีประเภทคู่นอน 5 ประเภท ดังนั้นในการวิเคราะห์แนวโน้มจะเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2549 กับปี พ.ศ. 2551 เป็นส่วนใหญ่

กลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมากับผู้รักหรือแฟนอยู่

ระหว่าง ร้อยละ 86 – 100 มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคยสูงขึ้นเล็กน้อย

กลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย พบว่ามีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมากับผู้รักหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 89 – 99 กับผู้ชายด้วยกัน ร้อยละ 2 – 3 และกับผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศอยู่ระหว่าง ร้อยละ 9 – 13 ในปี พ.ศ. 2551 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายมีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมากับผู้หญิงขายบริการลดลงเล็กน้อย

ในรอบ 5 ปีที่สำรวจพฤติกรรมทางเพศ เพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่เป็นคู่อีกหรือแฟนน้อยกว่า
ในรอบปีนั้น คนงานในสถานประกอบการชายมี กลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงเล็กน้อย

ตาราง 7.3 แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ

คู่เพศสัมพันธ์	พ.ศ. 2545		พ.ศ. 2546		พ.ศ. 2547		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คู่อีก/แฟน	86.4	89.2	98.1	93.8	99.7	98.8	99.0	97.5	98.6	94.9
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	na	na	na	na	na	na	5.0	28.4	6.5	23.4
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	3.4	9.5	6.1	26.7	2.2	24.0	1.0	17.0	0.6	15.8
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	na	na	2.4	3.1	1.6	2.1	2.1	3.0	2.0	2.1
ผู้หญิงขายบริการ	na	10.4	na	12.8	na	9.3	na	10.1	na	8.6

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง กับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อีกหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ 4 – 11 กับผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคย (ปี พ.ศ. 2549 กับปี พ.ศ. 2551) มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเท่าเดิม คือ ร้อยละ 26 กับผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผินอยู่ระหว่างร้อยละ 17 – 50 ยกเว้นปี พ.ศ. 2547 ที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง 0% และกับผู้หญิงด้วยกันอยู่ระหว่างร้อยละ 2 – 40 ยกเว้นปี พ.ศ. 2551 ที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง 0%

สำหรับกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อีกหรือแฟนในรอบปีที่ผ่านมาสูงขึ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 11 – 20 มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง กับผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคยสูงขึ้น มีการใช้

ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผินอยู่ระหว่างร้อยละ 49 – 58 กลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งอยู่ระหว่างร้อยละ 3 – 33 ส่วนกับผู้หญิงขายบริการทางเพศมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งร้อยละ 70 – 96

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งระหว่างคนงานในสถานประกอบการชายและหญิงพบว่าคนงานในสถานประกอบการชาย มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่าคนงานหญิงในรอบ 5 ปี

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่ได้มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนในแต่ละกลุ่ม แต่พอที่จะประเมินได้ว่าคนงานในสถานประกอบการมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประจำ (คู่อีก/แฟน) น้อยกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ

ตาราง 7.4	แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง กับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา									
การใช้ถุงยาง- อนามัย(ทุกครั้ง)	พ.ศ. 2545		พ.ศ. 2546		พ.ศ. 2547		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรักร/แฟน	5.3	10.7	8.2	13.2	7.0	16.9	4.2	13.5	10.8	20.3
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	na	na	na	na	na	na	26.3	42.9	26.1	54.5
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	16.7	56.5	23.1	50.7	0	57.7	25.0	44.8	50.0	52.9
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	na	na	2.4	3.1	40.0	16.7	12.5	33.3	0	11.1
ผู้หญิงขายบริการ	na	96.0	na	69.7	na	90.0	na	82.5	na	83.8

เพศสัมพันธ์รั่วรั่ว

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของกลุ่มคนงาน
ในสถานประกอบการ ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา
พบว่าคู่นอนของกลุ่มคนงานในสถานประกอบการ
หญิงที่เป็นคูรักรหรือแฟนอยู่ระหว่างร้อยละ
89 – 98 สำหรับคู่นอนครั้งล่าสุดที่เป็นผู้ชายที่
รู้จักกันผิวเผิน ผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคย และผู้หญิง
ด้วยกัน มีเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1 – 2
เท่านั้น

ในกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย
พบว่าคู่นอนครั้งล่าสุดที่เป็นคูรักรหรือแฟนอยู่
ระหว่างร้อยละ 86 – 91 มีคู่นอนประเภทผู้หญิงที่
รู้จักกันคุ้นเคย ผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผินเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย คู่นอนที่เป็นผู้ชายด้วยกันมีประมาณ
ร้อยละ 1 ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา และคู่นอนครั้ง
ล่าสุดที่เป็นผู้หญิงขายบริการ อยู่ระหว่างร้อยละ
1 – 3


ตาราง 7.5	แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด กับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ							
ประเภทคู่นอน	พ.ศ. 2546		พ.ศ. 2547		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรักร/แฟน	96.2	86.4	98.4	91.3	97.9	89.4	98.6	88.9
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	na	na	na	na	1.8	6.1	0	7.2
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	0.5	7.0	0.6	5.7	0.3	1.5	0	2.3
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	2.4	0.8	0.9	0.9	0.3	1.0	1.1	0.2
ผู้หญิงขายบริการ	na	2.7	na	2.1	na	2.0	na	1.4

การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ครั้งล่าสุด พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการทั้งหญิงและชาย มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยสูงขึ้น คนงานในสถานประกอบการหญิง มีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ครั้งล่าสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 13 – 21 ส่วนกลุ่ม

คนงานในสถานประกอบการชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด อยู่ระหว่างร้อยละ 26 – 33 คนงานในสถานประกอบการชาย มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ครั้งล่าสุดมากกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงค่อนข้างชัดเจนในรอบ 4 ปี

แผนภาพ 7.2

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด




เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่างร้อยละ 1 – 3 และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน อยู่ระหว่างร้อยละ 2 – 5 ในปี พ.ศ. 2551

มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนสูงขึ้นเล็กน้อย กลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่าในกลุ่มผู้หญิง ยกเว้นในปี พ.ศ. 2551 ที่มีสัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน ทั้งกลุ่มผู้หญิงและผู้ชายสัดส่วนใกล้เคียงกัน

แผนภาพ 7.3

แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา



สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การมีปัสสาวะแสบขัด มีตุ่มหนองที่อวัยวะเพศ เป็นต้น พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6 – 15

ส่วนกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย มีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อยู่ระหว่างร้อยละ 4 – 10 ในปี พ.ศ. 2551 อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มลดลงทั้งในเพศหญิง และเพศชาย คนงานในสถานประกอบการเพศหญิงมีแนวโน้มอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการเพศชาย ในรอบ 4 ปี

แผนภาพ 7.4

แนวโน้มอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมา




การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่างร้อยละ 26 – 37 ส่วนกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีอยู่ระหว่างร้อยละ 28 – 36 ในปี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2549

คนงานในสถานประกอบการหญิงมีสัดส่วนการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย แต่ในปี พ.ศ. 2551 คนงานในสถานประกอบการชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิง

แผนภาพ 7.5

แนวโน้มการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา



พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงมีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้น ปี พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 2547 เป็นพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 65 – 66 ส่วนในปี พ.ศ. 2549 กับปี พ.ศ. 2550 เป็นพฤติกรรมของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 47 – 52

สำหรับกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย พบว่ามีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาเท่าเดิม การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของคนงานในสถานประกอบการชายในรอบ 4 ปี อยู่ระหว่างร้อยละ 81 – 88

กลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิง

แผนภาพ 7.6

แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรอบ 4 ปี




หมายเหตุ: พ.ศ. 2546 – 2547 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

พ.ศ. 2549 – 2551 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด

แผนภาพ 7.7

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในรอบ 3 ปี



ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิง มีการใช้สารเสพติดอยู่ระหว่างร้อยละ 1 – 3 ส่วนกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายอยู่ระหว่างร้อยละ 15 – 18 เพศหญิงมีการเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา น้อยกว่าเพศชายค่อนข้างชัดเจน

เพศสัมพันธ์กับตัวเมียตัวผู้ที่มีแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติด

เพศสัมพันธ์หลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นทั้งกลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิง และชายคนงานในสถานประกอบการหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 18 – 49 และกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายอยู่ระหว่างร้อยละ 45 – 64

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก กลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อยู่ระหว่างร้อยละ 3 – 11 สำหรับกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อยู่

ระหว่างร้อยละ 16 – 21 เพศชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มผู้หญิงในรอบ 4 ปี

เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ากลุ่มคนงานในสถานประกอบการหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดประมาณร้อยละ 13 – 32 ส่วนกลุ่มคนงานในสถานประกอบการชาย มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดร้อยละ 13 – 41 การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีสัดส่วนไม่มากนัก

สำหรับแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด และการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด อาจดูแนวโน้มไม่ชัดเจน เพราะจำนวนผู้ใช้สารเสพติดมีจำนวนไม่มากนัก ทำให้รูปแบบของพฤติกรรมไม่ชัดเจน

ตาราง 7.6

แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเสพยาเสพติด

พฤติกรรม	พ.ศ. 2546		พ.ศ. 2547		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์*	26.0	55.5	31.0	54.4	17.9	44.8	48.5	64.0
เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด*	21.1	23.3	32.3	20.2	12.5	12.8	20.0	40.6
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	4.9	16.1	11.1	21.3	3.3	17.1	11.5	18.1
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด	25.0	16.2	0	22.7	29.0	27.3	0	14.3

หมายเหตุ: * คัดสรรส่วนเฉพาะกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

แนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรอบ 2 ปี


จากการติดตามพฤติกรรมการใช้ Internet ในรอบปีที่ผ่านมาของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนหญิงมีสัดส่วนการใช้ Internet ลดลงเล็กน้อย แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนชาย ในภาพรวมกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีสัดส่วนการใช้ Internet ใกล้เคียงกันทั้ง 2 ปี คือประมาณร้อยละ 86

พฤติกรรมการใช้ Internet เพื่อหาคู่อรักหรือแฟน พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแนวโน้มการใช้ Internet เพื่อหาคู่อรักหรือแฟนลดลงทั้งนักเรียนหญิง-ชาย

พฤติกรรมการใช้ Internet เพื่อหาคู่อรักหรือแฟน พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแนวโน้มการใช้ Internet เพื่อหาคู่อรักหรือแฟนลดลงทั้งนักเรียนหญิง-ชาย

แผนภาพ 7.8

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ Internet และการใช้ Internet เพื่อหาคู่อรักหรือแฟนในรอบปีที่ผ่านมา



ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

การติดตามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าในภาพรวมแล้ว นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์มากขึ้นเล็กน้อย กล่าวคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องในรอบปีที่แล้วมากกว่าในรอบปี พ.ศ. 2551 ยกเว้นความรู้เกี่ยวกับคนที่มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ที่นักเรียนในปี พ.ศ. 2550 สามารถ

ตอบได้ถูกต้องในสัดส่วนที่มากกว่าปี พ.ศ. 2551 เล็กน้อย

เมื่อวิเคราะห์แยกนักเรียนหญิง-ชาย แล้ว พบว่านักเรียนหญิงมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เพิ่มขึ้นในทุกข้อ ยกเว้นความรู้เกี่ยวกับคนที่มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ มีสัดส่วนลดลง สำหรับกลุ่มนักเรียนชายพบผลเช่นเดียวกันกับกลุ่มนักเรียนหญิง


ตาราง 7.7		แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง จำแนกตามเพศ					
ข้อ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2551		
		หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
1	ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวี	66.9	73.1	70.0	83.3	84.4	83.8
2	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	47.4	43.4	45.4	63.0	59.2	61.0
3	คนที่มองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดี อาจเป็นคนที่ติดเชื้อเอชไอวี	53.4	44.2	48.9	50.2	36.3	43.0
4	ยุ่งสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีมาสู่คนได้	33.4	36.3	34.8	43.6	46.2	45.0
5	การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	33.6	28.2	30.9	35.0	33.2	34.1

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สามารถตอบได้ถูกต้องทุกข้อตามเกณฑ์ของ UNGASS พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ถูกต้องทั้ง 5 ข้อ ตามเกณฑ์

ของ UNGASS ในสัดส่วนที่สูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนักเรียนหญิง และชาย เมื่อวิเคราะห์ดูสัดส่วนของนักเรียนหญิง - ชาย แล้ว พบว่านักเรียนชายสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อน้อยกว่านักเรียนหญิง

แผนภาพ 7.9


แนวโน้มของการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อตามเกณฑ์ของ UNGASS ในรอบ 2 ปี



ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

แผนภาพ 7.10


แนวโน้มประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 2 ปี



ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีแนวโน้มลดลง ทั้งนักเรียนหญิง - นักเรียนชาย นักเรียนชายมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 2 ปี

แผนภาพ 7.11

แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก โดยความสมัครใจ ในรอบ 2 ปี



เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยความสมัครใจมากขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยความสมัครใจมากกว่านักเรียนหญิง

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนเท่ากันในรอบ 2 ปี มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคยมีแนวโน้มสูงขึ้น และมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน และกับบุคคลที่มีเพศเดียวกันลดลง

นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนมากขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะที่กลุ่มนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนลดลงอย่างชัดเจน นั้นหมายความว่านักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่่นอนประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่คูรักหรือแฟนมากขึ้นกว่าปี

พ.ศ. 2550

สำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ (เฉพาะในกลุ่มนักเรียนชาย) มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย

นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟน และผู้หญิงด้วยกันสูงขึ้น แต่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคย และผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผินน้อยลง ส่วนกลุ่มนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน ผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคย และผู้หญิงขายบริการทางเพศสูงขึ้น แต่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟน และผู้ชายด้วยกันลดลง


ตาราง 7.8

แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่่นอนประเภทต่างๆ ในรอบ 2 ปี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2551		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
คูรัก/แฟน	80.6	71.0	74.0	90.5	67.3	73.7
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	6.5	14.5	12.0	4.8	20.0	15.8
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	3.2	1.4	2.0	0	1.8	1.3
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	1.8	1.3	na	4.3	3.0
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	4.8	9.1	7.9	6.5	2.9	4.0

แผนภาพ 7.12

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ในรอบ 2 ปี



จากการติดตามการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย นักเรียนหญิงมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์สูงขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะที่นักเรียนชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกลดลงเล็กน้อย

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าในภาพรวมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคูรักรหรือแฟน และกับบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันสูงขึ้น กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน และผู้หญิงขายบริการทางเพศมีแนวโน้มลดลง

สำหรับกลุ่มนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคูรักร/แฟน กับผู้ชายที่รู้จักกัน

ผิวเผินและกับผู้หญิงด้วยกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคยลดลง ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคูรักร/แฟน และกับผู้ชายด้วยกัน มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย เพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคย กับผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน และกับผู้หญิงขายบริการทางเพศมีแนวโน้มลดลง

ตาราง 7.9

แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคู่ขนประเภทต่างๆ

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา	พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2551		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
คูรักร/แฟน	87.5	83.0	84.4	94.7	84.8	87.7
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	12.5	52.8	40.3	10.5	41.3	32.3
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	4.2	30.2	22.1	10.5	21.7	18.5
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	18.9	18.9	na	8.7	6.2
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	6.3	15.1	13.0	15.8	19.6	18.5

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ พบว่ากลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้น เมื่อมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคูรักรหรือแฟน และกับผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคย สำหรับกลุ่มนักเรียนชาย พบว่าแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัย

ทุกครั้งกับคูรักรหรือแฟนน้อยลง แต่มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคย ผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน และผู้หญิงขายบริการทางเพศมากขึ้น ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ชายด้วยกันมีแนวโน้มเท่าเดิม

ตาราง 7.10

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่เพศสัมพันธ์ประเภทต่างๆ

การใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง	พ.ศ. 2550		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรักร/แฟน	19.0	33.3	38.9	25.6
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	0	31.0	50.0	36.8
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	0	29.4	0	50.0
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	27.3	na	75.0
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	0	22.2	0	22.0

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด


ตาราง 7.11

แนวโน้มเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบ 2 ปี

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	พ.ศ. 2550		พ.ศ. 2551		เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่านักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟนสูงขึ้น นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักหรือแฟนมากกว่านักเรียนชาย
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	
คูรัก/แฟน	83.3	52.8	94.7	73.9	เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับบุคคลที่มีเพศเดียวกันมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	4.6	11.3	0	15.2	
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	0	1.9	0	2.2	
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	7.5	na	0	
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	4.2	3.8	5.3	8.7	

แผนภาพ 7.13

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด




แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดสูงขึ้น นักเรียนหญิง-ชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดสูงขึ้นประมาณร้อยละ 5 นักเรียนหญิงใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมากกว่านักเรียนชาย

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

แผนภาพ 7.14


แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน



แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มลดลง ไม่พบว่ามีนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน ในรอบปี พ.ศ. 2551 ส่วนกลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนลดลงเล็กน้อย นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 2 ปี

แผนภาพ 7.15

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน




การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสำหรับนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนนั้นไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งได้ เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทนน้อยมาก (ในปี พ.ศ. 2550 มีจำนวน 9 ราย และปี พ.ศ. 2551 มีจำนวน 6 ราย เท่านั้น)

การติดโรคที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แผนภาพ 7.16

แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบ 2 ปี




แนวโน้มของนักเรียนที่มีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มลดลงทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย นักเรียนชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิง

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

แผนภาพ 7.17

แนวโน้มของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในรอบ 2 ปี




ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มลดลง ทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย นักเรียนหญิงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศน้อยกว่านักเรียนชาย

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

แผนภาพ 7.18


แนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา



พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาลดลงเล็กน้อย ทั้งนักเรียนหญิง-นักเรียนชาย นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิง

แผนภาพ 7.19


แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์



หมายเหตุ: คัดสรรเฉพาะนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

แผนภาพ 7.20

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนหญิง แต่ลดลงเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนชาย นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิง

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด

แผนภาพ 7.21


แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมาย ในรอบ 2 ปี



พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมาประเภทผิดกฎหมาย เช่น ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน หรือโคเคน เป็นต้น พบว่ากลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มการเสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมาสูงขึ้น ส่วนนักเรียนหญิงมีแนวโน้มการเสพยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมาเท่าเดิม นักเรียนชายมีการเสพยาเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมายมากกว่านักเรียนหญิง

แผนภาพ 7.22


แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา ในรอบ 2 ปี



การเสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยาเข้าเส้นโลหิต พบว่ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย นักเรียนชายมีการเสพยาเสพติดชนิดฉีดยามากกว่านักเรียนหญิง

แผนภาพ 7.23


แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ในรอบ 2 ปี



เพศสัมพันธ์หลังจากเสพยาเสพติด พบว่ามีแนวโน้มลดลง ทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิง-นักเรียนชาย นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่านักเรียนหญิง อย่างไรก็ตาม จำนวนของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ และมีการใช้สารเสพติดด้วยมีจำนวนน้อยมาก จึงอาจทำให้มองเห็นแนวโน้มไม่ชัดเจนมากนัก

แผนภาพ 7.24

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด
ในรอบ 2 ปี



การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ากลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มลดลง ส่วนกลุ่มนักเรียนหญิงนั้นมีจำนวนน้อยมากจนไม่สามารถเห็นแนวโน้มได้ชัดเจนมากนัก

แนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรอบ 5 ปี

การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และดำเนินการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมทุกๆ ปี รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี ในแต่ละปีได้มีการปรับเปลี่ยนข้อคำถามบ้างเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้ง

ปรับเปลี่ยนวิธีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (paper based survey) เป็นการตอบแบบสอบถามแบบหน้าเว็บ (web-based survey)

การนำเสนอแนวโน้มพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีนี้ จะนำเสนอในรอบ 5 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2551 เท่านั้น

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 เริ่มสอบถามในปี พ.ศ. 2550 พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนในทุกๆ ข้อ ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย

เป็นที่น่าสังเกตว่า นักเรียนหญิง และนักเรียนชาย จะมีสัดส่วนการตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในแต่ละปีใกล้เคียงกัน ดังนั้น

จึงน่าจะชัดเจนว่าในปี พ.ศ. 2551 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคำตอบของแต่ละคำถามมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก “ไม่แน่ใจ” เป็น “ไม่ทราบ” ซึ่งทั้ง 2 คำตอบจะไม่ได้คะแนน ส่วนคำตอบ “ใช่” “ไม่ใช่” ยังคงคำตอบเดิม

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สามารถตอบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อตามตัวชี้วัดของ UNGASS พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้ง

ในกลุ่มนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย ในปี พ.ศ. 2551 ทั้งนักเรียนหญิง-ชายมีสัดส่วนของ 2550 นักเรียนชายสามารถตอบคำถามได้ถูกทุก การตอบคำถามได้ถูกทุกข้อใกล้เคียงกัน ข้อ มากกว่านักเรียนหญิงค่อนข้างชัดเจน แต่ในปี


ตาราง 7.12		แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง			
ข้อที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	พ.ศ. 2550		พ.ศ. 2551	
		หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
1	ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวี	47.5	61.9	90.9	93.2
2	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	46.0	52.7	69.2	73.8
3	คนที่มองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีอาจเป็นคนที่ติดเชื้อเอชไอวี	54.2	57.3	74.6	71.2
4	ยุงสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีมาสู่คนได้	37.1	41.3	51.2	53.0
5	การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	37.1	42.7	52.1	50.1
ตอบถูกทุกข้อ (UNGASS)		8.7	14.4	19.9	19.4

ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์สูงขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1 นักเรียนหญิงมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์อยู่ระหว่างร้อยละ 7 – 9 ส่วนนักเรียนชายมีประสบ-

การณ์การมีเพศสัมพันธ์อยู่ระหว่างร้อยละ 9 – 17 นักเรียนชายมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิงค่อนข้างชัดเจน ยกเว้นในปี พ.ศ. 2550 ที่นักเรียนทั้งผู้หญิง และผู้ชายมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน

แผนภาพ 7.25 แนวโน้มของการมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก



สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่านักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนสูงขึ้น โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนร้อยละ 81 – 96 ส่วนนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนร้อยละ 77 – 79 ซึ่งจะเห็นว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่

นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับ

คูรักหรือแฟนมากกว่ากลุ่มนักเรียนชาย

นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขายบริการทางเพศน้อยมาก และใน 2 ปีหลังมานี้ไม่มีนักเรียนชายคนใดมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่านักเรียนชายไม่นิยมมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ


ตาราง 7.13

แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ในรอบ 4 ปี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	พ.ศ. 2548		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2550		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	85.5	76.5	80.6	77.8	85.1	78.7	95.6	78.7
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	1.8	11.1	0	4.8	8.5	6.4	4.4	10.7
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	0	4.9	2.8	3.2	2.1	4.3	0	4.0
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	2.5	na	1.6	na	0	na	0
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	10.9	2.5	16.7	12.7	4.3	10.6	0	6.7

แผนภาพ 7.26

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก




การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งในกลุ่มนักเรียนหญิงและชาย กลุ่มนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ 44 – 66 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 46 – 62 นักเรียนหญิง และนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในแต่ละปี

พฤติกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

แผนภาพ 7.27


แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่อีกหรือแฟน



กลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่อีกหรือแฟนในรอบปีที่ผ่านมา มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนหญิง แต่ลดลงในกลุ่มนักเรียนชาย นักเรียนหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่อีกหรือแฟนมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งร้อยละ 6 - 33 ส่วนนักเรียนชายใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 9 - 25

แผนภาพ 7.28


แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย



นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคยในรอบปีที่ผ่านมา นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากขึ้น ส่วนนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งลดลง นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่สม่ำเสมอในแต่ละปี กล่าวคือมีการใช้ถุงยางอนามัย 100% จนถึงไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยเลย อย่างไรก็ตามจำนวนของนักเรียนหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคยไม่มากนัก สำหรับนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งร้อยละ 40 - 53

แผนภาพ 7.29


แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน



นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผินในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก กลุ่มนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งอยู่ระหว่างร้อยละ 40 - 57 ส่วนกลุ่มนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งร้อยละ 33 - 100

แผนภาพ 7.30


แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน



กลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพศเดียวกันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยมากขึ้น นักเรียนหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกันมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่ากลุ่มนักเรียนชาย อย่างไรก็ตามนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเพศเดียวกันจำนวนไม่มากนัก

แผนภาพ 7.31

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการทางเพศ




กลุ่มนักเรียนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งอยู่ระหว่างร้อยละ 50 - 100

เพศสัมพันธ์รั่วค่าคู่

แผนภาพ 7.32

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด




การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย กลุ่มนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดร้อยละ 29 - 54 ส่วนกลุ่มนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดอยู่ระหว่างร้อยละ 41 - 62 นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดน้อยกว่านักเรียนชาย ในรอบ 5 ปี

พฤติกรรมเพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

แผนภาพ 7.33


แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน



เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่ามีแนวโน้มลดลง นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนร้อยละ 0 – 6 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายมีร้อยละ 2 – 11 นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 5 ปี

แผนภาพ 7.34

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน




การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่า มีแนวโน้มไม่ชัดเจน เนื่องจากมีนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนในแต่ละปีมีจำนวนน้อย

หมายเหตุ: na = ไม่เข้าข่าย

การวินิจฉัยที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แผนภาพ 7.35

แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์




นักเรียนที่มีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นักเรียนหญิงมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ระหว่างร้อยละ 1 – 11 ส่วนนักเรียนชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ระหว่างร้อยละ 0 – 11 นักเรียนหญิงและชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในรอบ 5

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

แผนภาพ 7.36

แนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา




การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย นักเรียนหญิงมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1 – 3 นักเรียนชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 3 – 7 นักเรียนชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 5 ปี

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

แผนภาพ 7.37

แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือน พบว่านักเรียนมีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้น นักเรียนหญิงมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างร้อยละ 35 – 36 ส่วนนักเรียนชายอยู่ระหว่างร้อยละ 40 – 53 นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 3 ปี

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด

แผนภาพ 7.38

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในรอบปีที่ผ่านมา




พฤติกรรมการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย นักเรียนหญิงมีการใช้สารเสพติดร้อยละ 2 – 5 นักเรียนชายมีการใช้สารเสพติดร้อยละ 7 – 11 นักเรียนชายมีการใช้สารเสพติดมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 4 ปี

พฤติกรรมเสี่ยงฉีดยาเสพติดที่มีแอลกอฮอล์

แผนภาพ 7.39

แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




หมายเหตุ: คิดสัดส่วนในกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

การมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่าเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในกลุ่มนักเรียนหญิง แต่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนชาย นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 18 – 37 นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 20 – 42 นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิง

แผนภาพ 7.40

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




หมายเหตุ: คิดสัดส่วนในกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และหลังเสพยาเสพติด

นักเรียนมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มผู้หญิง แต่ลดลงในกลุ่มผู้ชาย นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 8 – 33 ส่วนนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 15 – 47 นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยกว่านักเรียนชาย ยกเว้นในปี พ.ศ.2551 ที่นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนชาย

พหุสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์

แผนภาพ 7.41


แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด



การมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีจำนวนน้อยมาก จึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นแนวโน้มได้อย่างชัดเจนมากนัก นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่านักเรียนหญิง นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ร้อยละ 2 - 23

แผนภาพ 7.42

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด



การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีจำนวนน้อยมาก ซึ่งไม่สามารถเห็นแนวโน้มได้ ในปี พ.ศ. 2551 มีนักเรียนหญิงเพียง 1 คนเท่านั้นที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

หมายเหตุ: จำนวนของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีจำนวนน้อยมากเพียง 1 - 2 รายเท่านั้น

แนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียนชายวัยศึกษา ระดับปวช. ปี 2 ในรอบ 5 ปี

การนำเสนอแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปี พ.ศ. 2551 เป็นการนำเสนอ

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ พบว่ากลุ่มนักเรียนหญิงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องมากขึ้น ยกเว้นความรู้เกี่ยวกับการมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันโรคเอดส์ได้ และความรู้เกี่ยวกับยุงเป็นพาหะนำเชื้อโรคเอดส์มาสู่คน ที่นักเรียนหญิงตอบคำถามได้ถูกต้องน้อยลง

สำหรับกลุ่มนักเรียนชายสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องมากขึ้น ยกเว้นความรู้เกี่ยวกับยุงสามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรคเอดส์มาสู่คนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องน้อยลง

ความรู้เกี่ยวกับยุงเป็นพาหะนำเชื้อโรคเอดส์มาสู่คน เป็นประเด็นความรู้ที่นักเรียนสามารถตอบคำถามนี้ได้ลดลง ทั้งนักเรียนหญิงและชาย ทั้งๆ ที่มีการรณรงค์ไปอย่างกว้างขวางแล้วว่ายุงไม่ใช่พาหะนำเชื้อเอชไอวีสู่คน แต่นักเรียนส่วนใหญ่ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งตอบคำถามนี้ไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม คำตอบในปี พ.ศ. 2550 กับปี พ.ศ. 2551 มีความแตกต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2550 คำตอบ “ไม่แน่ใจ” ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นคำตอบว่า “ไม่ทราบ” ซึ่งคำตอบนี้จะไม่ได้คะแนน


ตาราง 7.14

แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้อง
จำแนกตามเพศ

ข้อที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	พ.ศ. 2550		พ.ศ. 2551	
		หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
1	ยุงยอนามัยสามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวี	41.4	51.3	86.7	92.0
2	การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	64.6	55.8	59.1	67.8
3	คนที่มองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดี อาจเป็นคนที่ติดเชื้อเอชไอวี	41.2	44.8	63.9	61.8
4	ยุงสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอชไอวีมาสู่คนได้	69.7	64.5	42.6	49.7
5	การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถติดเชื้อเอชไอวีได้	32.8	39.6	42.3	44.8

แผนภาพ 7.43

แนวโน้มของการตอบข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องทุกข้อตามตัวชี้วัด UNGASS



นักเรียนที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้โรคเอดส์ได้ถูกต้องทั้ง 5 ข้อ พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนักเรียนหญิง - ชาย นักเรียนชายสามารถตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกทุกข้อมากกว่านักเรียนหญิง


ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ พบว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นค่อนข้างมาก ในภาพรวม นักเรียนมีประสบการณ์ทางเพศประมาณร้อยละ 21 - 43 นักเรียนหญิงมีประสบการณ์ทางเพศอยู่ระหว่างร้อยละ 16 - 37 ส่วนนักเรียนชายมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้วร้อยละ 26 - 51 นักเรียนชายมีประสบการณ์ทางเพศมากกว่า

นักเรียนหญิง ทั้งนี้อาจเป็นที่สังเกตได้ว่า ในปี พ.ศ. 2549 กับปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธี web-based survey โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจมีผลกระทบกับข้อมูลอยู่บ้าง ส่วนในปี พ.ศ. 2551 นักวิจัยจากสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง

แผนภาพ 7.44

แนวโน้มของประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 5 ปี



เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับปวช. ปี 2 พบว่านักเรียนหญิงมีคู่นอนครั้งแรกที่เป็นคูรักหรือแฟน ร้อยละ 88 – 93 เป็นผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคย ร้อยละ 3 – 5 ยกเว้น ในปี พ.ศ. 2549 – 2550 ไม่มีคู่นอนครั้งแรกที่เป็นผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคย มีคู่นอนครั้งแรกกับผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผิน ร้อยละ 1 – 5 กับผู้หญิงด้วยกัน ร้อยละ 2 – 7

กลุ่มนักเรียนชาย พบว่ามีคู่นอนครั้งแรกที่เป็นคูรักหรือแฟน ร้อยละ 75 – 86 กับ

ผู้หญิงที่รู้จักกันคุ้นเคย ร้อยละ 5 – 12 กับผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน ร้อยละ 2 – 7 กับผู้หญิงขายบริการทางเพศ ร้อยละ 1 – 4 และกับผู้ชายด้วยกัน ร้อยละ 3 – 4

นักเรียนชายมีคู่นอนครั้งแรกเป็นผู้หญิงที่เป็นคูรักหรือแฟนน้อยกว่านักเรียนหญิง อย่างไรก็ตามนักเรียนชายมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงที่เป็นคูรักหรือแฟนมากขึ้นในทุกๆ ปี ขณะที่ในกลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก


ตาราง 7.15

แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก กับบุคคลประเภทต่างๆ

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	พ.ศ. 2548		พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2550		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	91.0	75.0	92.9	81.6	87.7	84.4	91.4	86.2
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	3.2	12.1	0	7.5	0	9.4	5.2	4.8
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	2.1	7.4	1.0	6.0	4.9	1.6	1.1	2.1
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	2.0	na	1.5	na	0.8	na	4.3
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	3.2	3.1	6.1	3.5	7.4	3.9	2.3	2.7

แผนภาพ 7.45

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก




การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยลดลงทั้งนักเรียนหญิงและชาย นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกใกล้เคียงกันกับนักเรียนชายในรอบ 5 ปี สำหรับกลุ่มนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร้อยละ 35 -56 ส่วนนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ 29 - 56

พฤติกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

แผนภาพ 7.46


แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่อริหรือแฟน



แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งลดลง นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งร้อยละ 9 – 19 ส่วนนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่อริหรือแฟนร้อยละ 15 – 30 นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่อริหรือแฟนมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 5 ปี

แผนภาพ 7.47

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย




การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคยในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งลดลงทั้งนักเรียนหญิงและชาย นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่านักเรียนหญิง ยกเว้นในปี พ.ศ. 2551 ที่นักเรียนหญิง - ชาย มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งใกล้เคียงกัน นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 20 – 40 ส่วนกลุ่มนักเรียนชายใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 35 –

53

แผนภาพ 7.48


แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับ
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน



นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกันผิวเผินมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นแนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง จึงมีลักษณะไม่สม่ำเสมอ นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผินแตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละปี กล่าวคือ ตั้งแต่ร้อยละ 10 จนถึง 100 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผิน ร้อยละ 49 – 67 นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่รู้จักกันผิวเผินมากกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิง

แผนภาพ 7.49


แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับ
บุคคลเพศเดียวกัน



การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกัน มีแนวโน้มลดลง นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิง นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 3 – 43 ส่วนนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 0 – 25

แผนภาพ 7.50

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ




สำหรับนักเรียนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนน้อยเหมือนกันในทุกๆ ปี ดังนั้นแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งอาจไม่ชัดเจนนัก ในปี พ.ศ. 2551 มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับผู้หญิงขายบริการทางเพศสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย

เพศสัมพันธ์รั่วค่าสูง

แผนภาพ 7.51

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด




เพศสัมพันธ์ในครั้งล่าสุดมีแนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยลดลงทั้งนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย นักเรียนชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 5 ปี สำหรับนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ร้อยละ 25 – 57 ส่วนในกลุ่มนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ร้อยละ 38 – 66

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

แผนภาพ 7.52


แนวโน้มของเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน



เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนมากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิงเล็กน้อยทุกปี นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน ร้อยละ 1 – 4 ส่วนนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน ร้อยละ 3 – 6

แผนภาพ 7.53

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน




การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน นั้นมีแนวโน้มที่ขึ้นๆ ลงๆ ไม่มีรูปแบบชัดเจนเนื่องจากจำนวนนักเรียนที่มี เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนมีจำนวนน้อยมาก

การผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แผนภาพ 7.54

แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์




อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย นักเรียนหญิงมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 1 – 14 ส่วนกลุ่มนักเรียนชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 2 – 12

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

แผนภาพ 7.55

แนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบ 5 ปี




การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นทั้งนักเรียนหญิง – ชาย นักเรียนชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 5 ปี นักเรียนหญิงมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 2 – 7 ส่วนนักเรียนชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 2 – 19

พฤติกรรมการฉีควัคซีนที่มีแอลกอฮอล์

แผนภาพ 7.56

แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งนักเรียนหญิงและชาย นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 59 – 64 ส่วนนักเรียนหญิงมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 42 – 48 นักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิงในรอบ 3 ปี

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด

แผนภาพ 7.57

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติด




การใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มการเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายลดลงในกลุ่มนักเรียนชาย ส่วนกลุ่มนักเรียนหญิงมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง นักเรียนชายมีการใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา มากกว่านักเรียนหญิงในรอบ 4 ปี นักเรียนหญิงมีการใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1 – 10 ส่วนนักเรียนชายมีการใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4 – 34

พฤติกรรมเสี่ยงฉีดยาเสพติดที่มีแอลกอฮอล์

แผนภาพ 7.58


แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์



การมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 18 – 36 ส่วนนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 28 – 36 นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มากกว่านักเรียนชาย

แผนภาพ 7.59

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




ในกลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งลดลงในกลุ่มนักเรียนหญิง ส่วนกลุ่มนักเรียนชายมีแนวโน้มคงที่ นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10 – 29 ส่วนนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 23 - 26 นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มากกว่านักเรียนหญิง ยกเว้นในปี พ.ศ. 2550 ที่นักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่านักเรียนชาย

พหุสัมพันธ์ของเพศสัมพันธ์

แผนภาพ 7.60


แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด



การมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งกลุ่มนักเรียนหญิง และ นักเรียนชาย นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ร้อยละ 2 – 18 ยกเว้นในปี พ.ศ. 2550 ส่วนนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด ร้อยละ 3 – 18 นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิงในรอบ 4 ปี

แผนภาพ 7.61

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด



การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่ากลุ่มนักเรียนหญิงในรอบ 4 ปี

แนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชากรทั่วไปในรอบ 2 ปี

การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มประชากรทั่วไปในครั้งนี้เป็นรอบที่ 2 โดยครั้งแรกได้ทำการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2549

ในการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้

กำหนดอายุผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุระหว่าง 15- 29 ปี ส่วนในปี พ.ศ. 2551 ได้ขยายกลุ่มอายุของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 15 - 49 ปี ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2551 จึงมีอายุเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2549 ประมาณ 10 ปี

ตาราง 7.16 อายุของกลุ่มประชากรทั่วไป ในรอบ 2 ปี				
ลักษณะประชากร	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
จำนวน	548	541	589	557
อายุเฉลี่ย	20.6	20.5	32.4	30.4
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	4.3	4.4	10.2	10.2
อายุต่ำสุด - อายุสูงสุด	15 - 29		15 - 49	

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก

กลุ่มประชากรทั่วไปที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้ว พบว่ากลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนมากขึ้น กับคู่นอนประเภทอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง ส่วนกลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับ คูรักหรือแฟนกัน

เท่าเดิม แต่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงที่รู้จักคุ้นเคย และผู้หญิงขายบริการทางเพศสูงขึ้นเล็กน้อย

กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคูรักหรือแฟนน้อยกว่าในกลุ่มผู้หญิงอย่างชัดเจน

ตาราง 7.17 แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก				
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรัก/แฟน	93.1	67.2	97.3	67.9
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	3.1	13.2	1.5	16.6
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	1.4	10.0	0.8	4.7
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	4.1	na	9.5
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	2.4	5.3	0.4	1.1

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนทั้งกลุ่มผู้หญิง และกลุ่มของผู้ชาย กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี น้อยกว่ากลุ่มผู้ชาย

อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในกลุ่มผู้หญิง และผู้ชาย ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่ากลุ่มผู้ชาย อย่างไรก็ตามฐานอายุของกลุ่มประชากรทั่วไปในรอบ 2 ปีมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก


ตาราง 7.18

แนวโน้มอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
9 – 14 ปี	6.9	17.0	3.7	7.9
15 – 19 ปี	65.3	71.4	45.0	60.0
20 ปีขึ้นไป	27.8	11.6	51.3	32.1
อายุเฉลี่ย	18.2	17.3	20.2	18.4
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2.7	2.5	4.4	3.7

แผนภาพ 7.62

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก



การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่ามีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยลดลง ทั้งกลุ่มผู้หญิง และผู้ชาย กลุ่มผู้ชายมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากกว่ากลุ่มผู้หญิงเล็กน้อย

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับ คู่รักหรือแฟนสูงขึ้นเล็กน้อย แต่มีเพศสัมพันธ์กับ บุคคลอื่นๆ น้อยลง

กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักหรือ แฟนในรอบปีที่ผ่านมา น้อยกว่า ในกลุ่มผู้หญิง

แต่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับคนที่รู้จักกัน คู่ที่เคย คนที่รู้จักกันผิวเผิน และกับคนที่เป็เพศ เดียวกันสูงกว่าในกลุ่มผู้หญิง เพศสัมพันธ์ใน รอบปีที่ผ่านมา กับผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศมี แนวโน้มลดลงเล็กน้อย

ตาราง 7.19

แนวโน้มเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา กับบุคคลประเภทต่างๆ

เพศสัมพันธ์ ในรอบปีที่ผ่านมา	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คู่รัก/แฟน	95.1	86.5	98.9	91.3
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	8.5	41.6	2.1	24.3
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	3.9	35.6	1.6	14.5
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	18.0	na	10.8
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	6.0	11.7	0.9	3.6

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมี เพศสัมพันธ์กับบุคคลประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก หรือแฟน กับผู้ชายที่รู้จักกันคุ้นเคยมีการใช้ ถุงยางอนามัยทุกครั้งลดลง แต่การมีเพศสัมพันธ์ กับผู้ชายที่รู้จักกันผิวเผิน และผู้หญิงด้วยกันมีการ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้น ส่วนกลุ่มผู้ชาย

มีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้นกับคู่ นอนทุกประเภท

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่คนที่ เป็นคู่รักหรือแฟนมีสัดส่วนน้อยกว่าคู่นอนประเภท อื่นๆ ผู้ชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมากกว่า กลุ่มผู้หญิง

ตาราง 7.20

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อเพศสัมพันธ์ กับบุคคลประเภทต่างๆ

การใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คู่รัก/แฟน	13.8	15.9	12.2	19.0
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	50.0	43.9	33.3	56.4
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	45.5	42.0	57.1	56.7
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	58.3	na	80.0
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	0	28.2	20.0	53.3

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด


เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่ากลุ่มประชากรทั่วไปมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคูรักรหรือแฟนสูงขึ้น กับคู่นอนประเภทอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์

ครั้งล่าสุดกับคูรักรหรือแฟนมากกว่ากลุ่มผู้ชาย ค่อนข้างชัดเจน สำหรับกลุ่มผู้ชายเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ พบว่ามีแนวโน้มลดลงมาก

ตาราง 7.21 แนวโน้มเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด กับคู่นอนประเภทต่างๆ

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	พ.ศ. 2549		พ.ศ. 2551	
	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
คูรักร/แฟน	95.1	75.1	98.9	86.5
บุคคลที่รู้จักกันคุ้นเคย	0.7	9.6	0.2	7.0
บุคคลที่รู้จักกันผิวเผิน	1.1	7.2	0	1.9
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ	na	30.0	na	3.4
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน	3.2	5.1	0.7	1.2

แผนภาพ 7.63 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด




การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งกลุ่มผู้หญิงและผู้ชาย กลุ่มผู้ชายมีการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมากกว่ากลุ่มผู้หญิงประมาณ 2 เท่า

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน

แผนภาพ 7.64


แนวโน้มของเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน



เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งในกลุ่มผู้หญิงและผู้ชาย กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทนมากกว่ากลุ่มผู้หญิง

แผนภาพ 7.65

แนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของหรือเงินตอบแทน




การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ หรือเงินตอบแทน พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งลดลงในกลุ่มผู้หญิง แต่มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มผู้ชาย

การผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แผนภาพ 7.66

แนวโน้มการมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์




อาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่ามีแนวโน้มน้อยลงทั้งในกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย ในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผู้หญิงมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้อยกว่ากลุ่มผู้ชาย ส่วนในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มผู้หญิง และกลุ่มผู้ชายมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่ากัน

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

แผนภาพ 7.67

แนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ในรอบปีที่ผ่านมา




การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย กลุ่มผู้หญิงมีแนวโน้มของการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีสูงขึ้นประมาณ 10% ส่วนกลุ่มผู้ชายมีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

แผนภาพ 7.68

แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย กลุ่มผู้ชายมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มผู้หญิงประมาณ 1 เท่าตัว

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด

แผนภาพ 7.69

แนวโน้มพฤติกรรมการใช้สารเสพติด




การใช้สารเสพติดประเภทที่ผิดกฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ กัญชา/กระท่อม ยาบ้า เฮโรอีน โคเคน ยาอี ทินเนอร์/กาว เป็นต้น พบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย กลุ่มผู้หญิงมีการเสพยาเสพติดน้อยกว่ากลุ่มผู้ชายค่อนข้างชัดเจนในรอบ 2 ปี

พฤติกรรมเสี่ยงฉีดยาเสพติดที่มีแอลกอฮอล์

แผนภาพ 7.70

แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




เพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชาย กลุ่มผู้ชายมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มผู้หญิงอย่างชัดเจน

หมายเหตุ: คัดสรรเฉพาะคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

แผนภาพ 7.71

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์




การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งกลุ่มผู้หญิง และกลุ่มผู้ชาย กลุ่มผู้ชายมีแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งสูงกว่ากลุ่มผู้หญิง

เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด

แผนภาพ 7.72

แนวโน้มเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด




หมายเหตุ: คัดสรรเฉพาะคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และเคยเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

เพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในกลุ่มผู้หญิง และกลุ่มผู้ชาย ในปี พ.ศ. 2551 กลุ่มผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่าในกลุ่มผู้ชาย

แผนภาพ 7.73

แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด



การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติด พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มผู้ชาย แต่ลดลงเล็กน้อยในกลุ่มผู้หญิง ในปี พ.ศ.2551 ทั้งกลุ่มผู้หญิง และกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ในขณะที่ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผู้หญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลังเสพยาเสพติดมากกว่ากลุ่มผู้ชาย

บรรณานุกรม

กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย. (2551). **สรุปสถานการณ์เอดส์กรุงเทพมหานครปี 2551**

สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2551 จาก http://www.bma.go.th/bma_aids/

คำนวน อึ้งชูศักดิ์ (มปท). **หลักวิชาและการประยุกต์ระบาดวิทยาสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข.**

นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน

สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (2545). **การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อ**

การติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 7 กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี

2545. นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน

“_____” (2546). **การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 7 กลุ่ม**

เป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2546. นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการ

สาธารณสุขอาเซียน

“_____” (2547). **การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 5 กลุ่ม**

เป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2547. นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการ

สาธารณสุขอาเซียน

“_____” (2548). **การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 5 กลุ่ม**

เป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2548. นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการ

สาธารณสุขอาเซียน

“_____” (2549). **การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์การติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 4 กลุ่ม**

เป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2549. นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการ

สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล.

“_____” (2550). **การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์การติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร 6 กลุ่ม**

เป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2550. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2551). **จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตาม**

กลุ่มอายุและเพศ. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2551 จาก [http://203.157.15.4/index.](http://203.157.15.4/index.php?page=5061)

[php?page=5061](http://203.157.15.4/index.php?page=5061)

UNAIDS (2008). 2008 Report on the global AIDS epidemic. Retrieved 19 September, 2008,

from <http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/>

[Global_report.asp](http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/Global_report.asp)

The Behavioral Surveillance Survey of 5 Target Groups in Bangkok, 2008



สำนักวิจัยและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02 441 9040-3 ต่อ 45, 54
โทรสาร 02 441 9044
E-mail tepyc@mahidol.ac.th